

Ghanan lintumatka 12.4.–23.4.2014



Abyssinian Roller, Mole National Park.

Teksti ja kuvat: Juha Honkala


"Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty" kuuluu vanha viisaus ja se pitää paikkansa, ainakin jos meiltä kysyy. Aloitimme nimittäin tämän matkan suunnittelemisen noin vuonna 2000 Erkki "Eki" Virolaisen kanssa ja nyt vihdoinkin pääsimme matkaan! Mukanamme reissussa olivat kokeneet lintumatkailijat Aulikki Alanen ja Jari Siven. Matkamme sujui erinomaisesti ilman minkäänlaisia hankaluuksia ja toivelajimme löytyivät miltei sataprosenttisesti.

Länsiafrikkalainen Ghana sijoittuu Ylä-Guinean endeemisyyssalueelle (Upper-Guinea forest), joka ulottuu Guineasta Sierra Leoneen, Liberiaan, Norsunluurannikolle ja edelleen Ghanaan. Ylä-Guinean endeemisyyssalueella tavataan 21 endeemiä tai lähes endeemiä lintulajia joiden lisäksi Ghanassa on hyvät mahdollisuudet nähdä runsaasti hieman laajemmalle levinneitä afrikkalaisia lajeja. Edellä mainituista maista Ghana on tällä hetkellä ehdottomasti turvallisim ja maasta löytyy kohtalaisesti lintumatkailijan kaipaamia majoituspalveluita.

Ghanan lintulajien ykkönen on kaikilla mittareilla mitattuna keltapäälajukas. Kaljukas on tietenkin Ylä-Guinean endeemi, se on harvinainen ja uhanalainen ja se on erikoisen näköinen. Sen voi nähdä vain pesäpaikalla, jonne pääsy on mutkikasta ja erikseen organisoitava. Kaljukas ei tule vastaan sattumalta. Kaiken kaikkiaan: kaljukas on pakko nähdä! Meillä kaljukas pyöri mielissä kaikkina päivinä ennen kaljukasta (mitä jos olosuhteet ovat meitä vastaan?) ja kaljukkaan jälkeen (oli se outo ja hieno, ja luoja kiitos, me näimme sen!).

Valmistelimme matkaamme lukemalla Cloudbirders-palvelusta löytyviä matkakertomuksia <http://www.cloudbirders.com/tripreport> ja hahmottelimme toivekohteitamme vastaan tulleen

tiedon pohjalta. Äänitteitä haalimme käyttöömmme Xeno-canto-palvelusta <http://www.xeno-canto.org/>. Hyödyllinen oli myös äänitekokoelma "Bird Song of the Gambia & Senegal (3CD): An Aid to Identification". Oivalliseksi lintukirjaksi osoittautui Nik Borrow'n ja Ron Demey'n "Birds of Ghana", jonka kanssa emme juuri joutuneet määritysongelmiin. Joidenkin lajien levinneisyyskartat teoksessa ovat tosin vanhentuneita ja puutteellisia, mutta se on täysin ymmärrettävää, sillä kyseessä on ennen kyseisen teoksen ilmestymistä vähän retkeilty Afrikan maa.



Ghanassa meitä opasti paikallinen lintuopas Kalu Afasi ja vuokra-autoa (mukava, ilmastoitu Hyundai minibussi) kuljetti Jonathan. Jonathanin ja Kalun kanssa hommat toimivat loistavasti ja olemme heille erittäin kiitollisia onnistuneesta matkastamme.


Matkamme ajoittui kuivan talvikauden loppuun. Tänä nimenomaisena vuonna "sää oli sekaisin" ja sateet saapuivat kuukauden verran etuajassa maaliskuun lopulla. Näin ollen joinakin matkapäivinäimme satoi jonkin verran. Useimmiten iltaan ajoittuvat sateet häittäsivät retkeilyä onneksemme vähän, mutta ennenaikaisesti viheriöinyt maasto etenkin Molen kansallispuistossa saattoi hieman vaikeuttaa lintujen näkemistä. Päivälämpötilat kohosivat noin + 32 asteeseen ja useimmiten yölläkin oli hyvin lämmintä, mutta hotellihuoneissa ilmastointilaitteet olivat onneksi vakiovarusteina.

Ennen matkaa hankimme Ghanan viisumin passiimme. Passi ja viisumihakemus piti lähettää kirjattuna kirjeenä lähimpään Ghanan konsulaattiin, joka sattuu olemaan Tanskassa. Passin viisumeineen saimme takaisin parissa viikossa. Lisäksi oli huolehdittava rokotesuoja keltakuumeelta vastaan kuntoon ja saatava rokotteesta leima kansainväliseen keltaiseen rokotuskorttiin. Tätä muuten kysyttiin Ghanaan tultaessa. Malarian torjumiseksi söimme Lariamia. Ghanassa emme tainneet nähdä ensimmäistäkään moskiittoa. Niitä on kuulemma runsaasti sadekauden päättyessä loka-joulukuussa, mutta talven kuivuus oli tehnyt tehtävänsä meidän eduksemme.

Luottokortit osoittautuivat täysin tarpeettomiksi, sillä kaikki maksuliikenne hoidettiin käteisellä. Paikallista valuuttaa ostimme euroilla rahanvaihtopisteistä.



Kuvassa on ensimmäisen yön majapaikkamme Accrassa ja luotettava ja mukava ajoneuvomme Hyundai.



Matkakohteemme: 1. Shai Hills, 2. Winneba Lagoon ja Winneba Plains, 3. Kakum National Park, 4. Brenu Beach road, 5. Kakum NP, Antiwkwaa 6. Kakum NP Aboabo, 7. New Edusiabe, 8. Bobiri Butterfly Sanctuary (Bobiri forest), 9. Oporo forest, 10. Mole National Park, 11. White Volta-joki ja rantaniityt, 12. Atewa forest range.

Ohjelmamme päivä päivältä

12.4.2014 Saavuimme Accraan illalla. Lentokenttämuodollisuudet veivät yli tunnin, sillä passintarkastuksen jonot vetivät hitaasti. Yhteyshenkilömme Kalu ja Jonathan olivat meitä sovitusti vastassa lentokentän tuloaulassa. Ajelimme halki Accran ensimmäisen yön majapaikkaamme Hotel Crowne Plazaan, joka oli siisti ja asiallinen. Nautimme maahantulo-oluet ja purimme varusteet retkikuntoon huomista varten.

13.4.2014 Herätys klo 5.15 ja aamiainen klo 5.30. Klo 5.57 olimme kaikkine matkatavaroinemme autossa matkalla ensimmäiseen kohteeseen, joka oli Shai Hills Nature Reserve kaupungin itäpuolella. Saavuimme perille 50 minuutin ajon jälkeen. Shai Hills on 51 km² laajuinen suojelualue. Maasto on kumpuilevaa ruohosavannia ja pieniä metsiköitä. Paikoin maastosta nousee jyrkkiä kallioita, joiden rinteillä on puustoa. Suojelualueella risteilee pieniä teitä siellä täällä. Brittien siirtomaavallan aikaan alue on ollut varattuna sotilasharjoitusalueeksi. Alkuperäisväestö Shai people on pakkosiirretty alueelta pois jo kauan sitten. Kävelimme hitaasti teitä myöten puoliavoimessa maastossa ja lajeja tuli vastaan hengästyttävään tahtiin. Koetimme keskittyä tärkeisiin lajeihin ja onnistumme ainakin jotenkin. Mm. Black-bellied Bustard, Violet Turaco, Flappet Lark, Red-shouldered Cuckoo-Shrike, Mocking Cliff Chat tulivat havaituiksi aamupäivän aikana. Puolilta päivin ajoimme vesisateessa Accran läpi länteen kohti Winnebaa ja lounastimme matkalla. Kävimme Winneba Lagoonilla meren tuntumassa, mutta oli laskuveden aika ja laguunin linnuista suurin osa oli melko kaukana. Lajilistaan kertyi vauhdilla joukko kahlaajia ym. peruslajeja. Noin puolessa tunnissa tärkeimmät oli nähty ja suuntasimme Winneba Plainsille, joka on pensaikkoista savannimaata. Huomattava osa parhaasta alueesta oli aivan juuri raivattu jättimäisen logistiikkakeskuksen alta pois. Alueen lintuja olivat mm. Red-faced Cisticola, African Moustached Warbler ja Yellow-Mantled Widowbird. Klo 17.15 nousimme autoon ja ajoimme reilun tunnin verran Hans Cottage Botel-nimiseen majataloon, Kakumin kansallispuiston eteläpuolelle. Ensimmäisen iltahuudon mukaan päivän lajimäärä oli 84.



Shai Hillsin portilla saimme hedelmäkojasta purtavaa pahimpaan nälkään.

14.4.2014 Kakumin kansallispuisto. Herätys klo 4.45, aamiainen 5.00 ja klo 5.30 istuimme jo autossa menossa kohti Kakumin kansallispuistoa (pinta-ala noin 375 km²), jonne saavuimme puolta tuntia myöhemmin hämärissä. Lähdimme kapuamaan polkua myöten kohti Canopy Walkwayta. Polun varressa kuului ensin White-tailed Alethe ja heti perään Rufous-sided Broadbill, joka myös löytyi istumasta aivan polun vierestä. Mainio laji ja hyvin nähty! Kavuttuamme vielä ylöspäin tulimme Canopy walkway-nimiselle puiden varaan rakennetulle köysi- ja lankkupalulle. Tämä turvaverkoin varustettu polku kulkee jättipuulta toiselle ja sen avulla on mahdollista päästä hieman lähemmäs kaukana ylhäällä huojuvaa puiden latvusta. Puiden korkeus tällä alueella on noin 60 m ja Canopy walkway on rakennettu noin puiden puoliväliin. Vietimme ensimmäisillä ”puuasemilla” eli

jättirunkojen ympärille rakennetuilla laitureilla muutaman tunnin ja tähystimme etupäässä ylöspäin. Uusia lajeja tuli vastaan miltei taukoamatta, mutta kohtalaisista etäisyyksistä johtuen mahdollisuudet valokuvaukseen olivat vähissä. Siitä huolimatta olimme hyvin tyytyväisiä oloomme. Aamupäivän lajeja olivat mm. Grey Parrot, Piping Hornbill, Black-casqued Hornbill, Naked-faced Barbet, Little Green Woodpecker, Rufous-crowned Eremomela, Violet-backed Hyliota ja Red-headed Malimbe. Ajelimme lounaalle majataloomme ja vasta nyt huomasimme asuvamme lintulähiön naapurissa. Hans Cottage Botelin tontilla sijaitsevan lampareen saarella pesii ja asuu useampi sata lehmähaikara sekä iso joukko Village Weavereita ja Viellot's Black Weavereita. Lammen rantamalla köllötteli lisäksi pari isonpuoleista krokotiilieläintä, jotka vaikuttivat melko säyseiltä. Katseltavaa siis riitti! Iltapäivällä klo 15.30 suuntasimme takaisin Kakumiin Canopy walkwaylle, mutta uusia lajeja ei juuri tullut. Päivän päätteeksi kävelimme pimeässä polkua myöten Tree Houselle yrittämään Akun Eagle Owlia. Tätä vähälukuista pöllöä emme havainneet, mutta balsamia haavoihin toi African Wood Owl, joka äänteli aktiivisesti lähellämme. Klo 20 aikoihin saavuimme Hans Cottage Botelin naapuriravintolaan, jossa odotimme illallista to-del-la pitkään. Sähkökatkosta johtuen söimme kynttilänvalossa ehkäpä koko matkamme parhaan illallisen. Iltahuuto HCB:n suojissa paljasti päivän lajimääräksi 83, retken lajimäärä 152.



Kakum National Park ja Canopy Walkway eli köysi- ja lankkusilta.

15.4.2014 heräsimme klo 5.10, söimme aamiaista klo 5.30 ja klo 6.00 suuntasimme kohti Kakumin kansallispuistoa. Hieman ennen porttia käännymme lännen puolelle pienelle kylätielle, joka kulki halki pensaikko- ja maatalousmaiseman ja edelleen metsään, jonne etenimme polkua pitkin. Tällä alueella vietimme koko aamupäivän. Aamupäivän hyviä lajeja olivat mm. metsästä löytynyt Fraser's Eagle Owl, Red-billed Dwarf Hornbill, Olive Long-tailed Cuckoo, Black Bee-eater, Melancholy (Gabon) Woodpecker, Forest Robin, Simple Leaflove, Red-winged Warbler, Puvel's Illadopsis, Brown Illadopsis, Buff-throated Sunbird, Sooty Boubou, Copper-tailed Starling ja Red-vented Malimbe. Iltapäivällä ajoimme suoraan etelään kohti merta ja saavuimme Brenu Beach roadille klo 16 jälkeen. Tallustelimme savannimaista pensaikkomatkaa halkovaa tietä myöten hitaanpuoleisesti pari kilometriä ja kirjasimme muistiin mm. Preuss's Cliff Swallow (vähintään pari sataa tuli yöpymään tien alittavaan siltarumpuun), Grey Kestrel, Whistling Cisticola, Marsh Tschagra ja Orange Weaver. Illan pimetessä kiipesimme pienelle kukkulalle ja katselimme kun Long-tailed Nightjarit lentelivät ympärillämme. Päivän lajit 115, retken lajit 196.

16.4.2014 söimme viimeisen aamiaistemme Hans Cottage Botelissa ja suuntasimme kohti Antiwikwaan kylää, jonne saavuimme klo 6.30. Kuljeskelimme klo 9.30 asti kylän liepeellä metsä-pensaikko- ja maatalousmaisemassa. Lintuja tuli vastaan taas mukavan monipuolisesti. Erään purouoman liepeillä näimme White-spotted Flufftailin ja kuuntelimme hyvin läheltä Black-throated Coucalin ällistyttävän matalaa ja syvän täyteläistä ääntelyä. Viisi Red-fronted Parrotia lensi ylitsemme, Forest Wood Hoopoe näyttäytyi ja Red-rumped Tinkerbird oli hetken näkyvillä. Muita mukavia lajeja olivat Hairy-breasted Barbet, Buff-spotted Woodpecker, Yellow-whiskered Greenbul, Fraser's Forest Flycatcher ja Dusky-blue Flycatcher. Tämän jälkeen ajelimme Twifon kaupunkiin. Laitoimme auton parkkiin ja kävelimme Pra-joen sillalle. Kiikaroimme joelle ja näimme yhteensä yhdeksän Rock Pratincolea ja kaksi White-throated Blue Swallowta. Tämän täsmäiskun jälkeen ajaa rytyytimme äärimmäisen huonokuntoista tietä Assin Fosson kaupunkiin ja asetuimme Babewan Lodgeen.

Lounastauon jälkeen ohjelmassa oli ehkä koko matkan tärkein juttu: White-necked Picathartes eli kaljukasyritys. Jostain syystä jokaiselle lintumatkalle valmistauduttaessa esiin nousee joku tietty laji, joka olisi ehdottoman hienoa nähdä. Ghanan reissulla tuo laji oli meillä kaikilla sama, eli kaljukas! Se on pakko nähdä! No, ajaa rytyytimme jälleen hirveän huonokuntoista tietä New Edusiaben kaupunkiin ja edelleen Pongron kylään. Sää näytti hyvältä, sade ei ilmeisesti tulisi pilaamaan tätä yritystä. Kylään tultua lähdimme kävelemään metsään. Kylästä lähti mukaamme paikallisopas Sampson ja kaksi apuopasta. Oppaat kulkivat puolijuoksua edellämme ja me hikoilimme perässä, ylämäkeen totta kai. Noin puolta tuntia myöhemmin, klo 17 aikoihin, olimme perillä metsän peittämän mäen lakialueella, suuren kalliopaaden varjossa. Meidät istutettiin matalalle penkille riviin ja käskettiin olemaan hiljaa. Koetimme noudattaa komentoa ja eipä montaa minuuttia ehtinyt kulumaan, kun keltapääljukas vilahti puiden takana. Jari sai linnun putkeen sen istuessa epäluuloisena oksalla ja kuittasimme lajin. Huh, mikä helpotus! Tämän jälkeen istuimme paikalla noin 45 minuutin ajan ja katselimme kahden kaljukkaan liikehdintää parinkymmenen metrin



päässä, ja lähempänäkin. Kaunis, mutta hyvin oudon näköinen lintu. Viimein poistuimme, jotta kaljukaspariskunta pääsisi rauhassa yöpymään kallion seinämään rakentamansa pesän tuntumaan. Kävelimme kevein askelin alamäkeen, kättelimme oppaitamme ja ajelimme tyytyväisinä takaisin Assin Fossoon.

17.4.2014 Aamiainen klo 5.00 ja klo 5.30 olimme autossa menossa kohti Kakum NP:n pohjoisosaa, Aboabo-nimisen kylän liepeille. Täällä kävelimme hitaanpuoleisesti hiljaisella tiellä, joka halkoi metsää ja puoliavointa maastoa. Aamun parhaita lajeja olivat mm. Congo Serpent-Eagle, Blue-throated Roller, White-crested Hornbill, African Piculet, Blue Cuckoo-Shrike, Tessman's Flycatcher ja Blue-headed Crested Flycatcher.

Iltapäivällä ajoimme Kumasin kaupungin lähistölle Bobiri Butterfly Sanctuary-nimiselle suojelualueelle. Alueen laajuus on noin 55 km² ja suurin osa siitä on korkeapuustoista sademetsää. Jostakin käsittämättömästä syystä johtuen saimme väistellä jättimäisiä tukkirekkoja, jotka hakivat runkoja suojelualueelta, mutta muutoin lintujen katselu sujui ongelmitta aivan pimeään asti. Parhaita lajeja Bobirissa: Ahanta Francolin, Blue-headed Wood-Dove, African Wood-Owl, Brown Nightjar, Sabine's Spinetail, Black Spinetail, Yellow-throated Tinkerbird ja Honeyguide Greenbul. Ajelimme yöksi Kumasiin siistiin "Treasure Land Hoteliin", jossa pidimme iltahuudon ja söimme illallisen. Nukkumaan päästiin klo 23 aikoihin. Päivän lajit 79, retken lajit 236.

18.4.2014 Herätys klo 4.45, aamiainen ja matkatavarat autoon. Suuntana pohjoinen. Reilun tunnin ajon jälkeen poikkesimme sivutielle, Kalun mukaan paikan nimi on River Pru-forest. Matkakertomuksissa käytetään myös nimeä Opuro-forest. Jälleen kerran käveleskelimme halki sekundäärimetsän, pensaikkomaa ja lopulta myös kunnollisessa metsässä. Ja jälleen kerran näimme ja kuulimme hyviä lajeja: heti kärkeen Western Bluebill ja Blue-billed Malimbe kähmyilivät samassa puskassa ja Black-bellied Seedcracker lensi ylitsemme. Pensaassa latvassa näyttäytyi Black and White Flycatcher ja Fiery-breasted Bushshrike piilottelivat tiheikössä. Metsässä näimme matkamme ainoan Forest Robinin ja kuulimme Red-fronted Antpeckerin, jota ei kuitenkaan saatu näkyviin. Parin



Mole airstrip iltavalossa, hetki ennen Standard-winged Nightjaria.

tunnin tehoiskun jälkeen jatkoimme kohti Mole National Parkia. Lounastimme Kintamossa ja pian tämän jälkeen maisema muuttui kuivemmaksi ja petolintujen määrä tienvarressa näytti lisääntyvän. Näimme mm. Grasshopper Buzzardeja, Lizard Buzzardeja, Red-necked Buzzardin ja Western Banded Snake-Eaglen. Saavuimme Mole National Parkiin klo 16.45 ukkoskuuron ropistessa niskaamme. Nopea check in, laukut huoneisiin ja vilkaisu taivaalle: kyllä, sade loppui! Nousimme taas autoon ja ajoimme Mole Airstripille, eli entiselle lentokentälle, joka on käyttämättömänä kasvamassa hitaasti umpeen. Illan hämärtyessä kuuntelimme White-throated Francolinien nenäsointista ääntelyä kun äkisti editsemme lensi Standard-winged Nightjar ja laskeutui eteemme kentälle. Olimme niin tohinoissamme linnusta, että se ei jäänyt meitä enempää tuijottelemaan vaan vaihtoi pikaisesti paikkaa. Näin ollen kunnolliset kuvat jäivät valitettavasti tällä kertaa ottamatta. Mutta olipa uskomattoman hieno lintu ihmeellisine kyynärsulkineen! Iltahuudon pidimme täpötäydessä kansallispuiston ravintolassa. Puistoon oli näköjään saapunut runsaasti ihmisiä pääsiäisen viettoon ja tästä johtuen saimme odottaa illallistamme poikkeuksellisen kauan. Juomahuolto sen sijaan pelasi mainiosti ja niinpä saimme riittävästi mm. paikallista Star-olutta. Päivän lajit 64, retken lajit 255.

19.4.2014 Koko päivä Mole National Parkissa. Aamiaisen jälkeen liikuimme puiston HQ:n etelä-lounais- ja länsipuolella ja listasimme vauhdilla savannin lajeja. Mukanamme oli puiston aseistettu vartija, joka piti huolen ettei kukaan joukostamme jää muista jälkeen villieläinten ruuaksi! Runsaan lintulajiston lisäksi näimme kaksi elefanttia sopivan välimatkan päästä ja runsaasti antiloopeja ja pahkasikoja. Lounastauon jälkeen ajoimme noin 15 km pohjoiseen, hyvin matalakasvuiselle "arolle", josta löytyi vaivatta Sun Lark. Hämärän tullessa menimme vesipaikalle ja näimme sivettikissan, African Scops Owl'in ja Gambaga Flycatcher'in, joita on tämän nimenomaisen lammen ympäristössä noin neljän reviiirin verran. Kaiken kaikkiaan mainio päivä taas aivan uusine lajeineen. Mielenkiintoisimpia olivat Forbes's Plover, African Cuckoo, Pearl-spotted Owlet, Striped Kingfisher, Green Wood Hoopoe, Greater Honeyguide, Yellow-breasted Apalis, Swamp Flycatcher, African Blue Flycatcher, Spotted Creeper ja Wilson's Indigobird. Päivän lajit 122, retken lajit 312.



Pääsiäisen aikaan Mole NP:ssa oli sekä paikallisia turisteja että kauempaa tulleita. Halukkaille oli tarjolla elämysajeluja maastoauton katolla.

20.4.2014 Mole National Parkissa koko päivä. Aamiaisen jälkeen ajoimme eiliselle aroalueelle pohjoiseen ja koetimme etsiä puuttuvia lajeja. Päivästä tuli varsin lämmin ja iltapäivällä saimme taktikoida ukkoskuurojen kanssa, mutta eipä sade tätäkään päivää päässyt liiemmältä pilamaan. Päivän mukavia lajeja olivat mm. Beaudouin's Snake Eagle, Greyish Eagle Owl (ihan majatalomme takana), sirkkukomppauksessa pusikosta päivälevalta yllätetty Standard-winged Nightjar (koiras), Lesser Honeyguide, Rufous-rumped Lark, White-breasted Cuckoo-Shrike, White-fronted Black Chat,

Lead-coloured Flycatcher, Red-winged Pytilia ja Brown-rumped Bunting. Päivän lajit 89, retken lajit 327.

21.4.2014 Varhaisaamiaisen jälkeen lastasimme matkatavarat autoon ja jätimme Molen kansallispuiston taaksemme, niin pian kuin tien tukkeena seisovilta norsuilta pääsimme!



Teimme vielä pikakäynnin Mole Airstripille ja näimme White-fronted Francofinin ihan vierestä sen ylittäessä lentokentän. Tyytyväisinä lähdimme kohti White Volta jokea. Tavoitteenamme oli tietty joen mutka parin tunnin ajomatkan päässä. Tie osoittautui varsin huonoksi, mutta etenimme kuitenkin. Pakollinen pysähdys tehtiin yhdentoista Abdim's Storkin ruokaillessa keskellä tietä ja seuraava pysähdys oli vasta pelipaikalla. Heti autosta noustessamme näimme kaukana joen penkalla kaksi Egyptian Ploveria! Porukkamme rantautui sen verran vauhdilla, että lähemmällä joen särkällä viihtyneet krokotiilinvartijat ottivat siivet alleen ennen kuin retkikuntamme virallinen kuvaaja ehti saada otukset asiallisesti hallintaan. Mutta näinhän se aina on, että kuvaaja ei ole koskaan tyytyväinen! Zoomailimme jokivarren elämää aikamme varsin tyytyväisinä näkemäämme ja suuntasimme kohti seuraavaa pysähdystä, White Voltan rantapeltoja hieman idempänä. Pellot osoittautuivat jonkinmoiseksi niittyalueeksi, jolla teimme puolen tunnin kävelylenkin. Mukavia lintuja: Black-backed Cisticola, Winding Cisticola, Zebra Waxbill ja Black-faced Quailfinch.

Iltapäivän viimeinen valoisa tunti vietettiin tulomatkalta tutussa River Pru-forestissa (Opuro-forest), josta löytyi uusia lajeja: Cassin's Spinetail, Capuchin Babbler, Grey-headed Bushshrike ja jo pois lähtiessämme kökötti keskellä tietä auton valoissa Plain Nightjar, jonka paikalliset metsästäjät harmiksemme säikäyttivät pois ennen kuin salamavallo ehti räpsähtää. Tyytyväisinä ajelimme Kumasiin ja tuttuun Treasure Land Hoteliin. Päivän lajit 82, retken lajit 342.

22.4.2014 Aamuhämärissä ajelimme puolen tunnin verran Bobiri Butterfly Sanctuaryyn, sillä edellinen käyntimme ajoittui iltaan ja nyt oli tarkoitus etsiä muutama, vielä puuttuva aamuaktiivisempi lintu. Ajelimme suojelualueen keskuksen tuntumaan ja vietimme reilun puolituntisen latvustoa tähyillen. Black Dwarf Hornbill ja Purple-throated Cuckoo-Shrike löytyivät melkoisen nopeasti, mutta kävelylenkki metsää halkovalla tiellä ei tuonut ihmeempiä uutuuksia. Palatessamme autolle löytyi keskuksen pihasta kaksi Least Honeyguidea, joka oli kova juttu, sillä laji on hyvin paikoittainen ja harvinainen Ghanassa. Tämän jälkeen ajoimme takaisin Kumasiin lounaalle ja vaihtamaan rahaa ennen kuin jatkoimme matkaa Atewaan. Atewa on kukkulainen metsäalue, jota

tähystellään joko tieltä tai vaihtoehtoisesti rämmittää umpeenkasvaneella metsäpolulla. Vietimme puolituntisen hiljaisella metsätiellä ennen kuin kaatosade keskeytti havainnoinnin klo 15.30 aikoihin. Taivas oli syvän harmaa ja oli selvää, että kyseessä ei ollut ohimenevä kuuro. Nousimme autoon ja ajoimme lähimpään säädylliseen majapaikkaan Hotel Royal Bleumichiin. Sateesta johtuen söimme illallisen poikkeuksellisen aikaisin ja pääsimme nukkumaan ennen iltayhdeksää! Retken lajit 352.

23.4.2014 Rankkasade päättyi yön aikana. Aamiaisen jälkeen ajoimme vajaan tunnin verran kohti Atewaa. Jätimme auton sivutien päähän ja tallustelimme ylämäkeen hitaasti mutta varmasti. Polku oli varsin umpeenkasvanut ja jyrkänpuoleinen ja olimme hetkessä märät sekä hiestä että pensaikkojen kosteudesta. Tiedossa oli reilun kuuden kilometrin pituinen nousu kohti Blue-headed Bee-eater paikkoja. Aamu ehti aamupäiväksi ennen kuin saavutimme lakialueen. Bee-eater oli kuitenkin hävinnyt. Pesivän parin toinen osapuoli ilmeisesti kuoli viime vuonna ja yksin jäänyt lintu lienee muuttanut tästä syystä muualle. Vedimme siis vesiperän! Mutta hyviä lajeja osui kuitenkin täälläkin kohdallemme, mm. Long-tailed Hawk, Chocolate-backed Kingfisher, Green-tailed Bristlebill, Forest Scrub Robin ja White-tailed Ant Thrush. Alkuiltapäivällä olimme palanneet takaisin hotelliimme, söimme viimeisen lounaan ja lähdimme ajelemaan kohti Accraa, jonne saavuimme paria tuntia myöhemmin, hyvissä ajoin ennen lentoamme kotiin. Retken lajit 362.

Retkemme lajilista

Lajilista noudattaa kutakuinkin maasto-oppaan taksonomiaa, järjestystä ja nimitystä.

Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>
Yleinen vesialueiden lintu joka ei nostanut tunteita pintaan.	
Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>
Näimme lajin kahtena päivänä.	
Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>
Yleinen ja paikoin runsas. Hans Cottage Botelin pihamaalla pesi ja asui noin 500 lintua.	
Striated Heron	<i>Butorides striata</i>
Kirjasimme matkan varrelta muistiin neljä yksilöä.	
Great Egret	<i>Ardea alba</i>
Paikoin siellä täällä pieniä määriä.	
Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>
Kirjasimme matkan varrelta muistiin kolme yksilöä.	
Western Reef Heron	<i>Egretta gularis</i>
Näimme yht. 7.	
Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>
Winneba, 1, matkan ainoa.	
Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>
Mole NP, 1.	
Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>
White Volta ja Mole NP, yht. 11.	
Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>
Näimme yht. 2.	
Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>
Näimme Mole NP:ssa yhteensä kolme yksilöä näitä hienoja haikaroita.	
Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>
Kirjasimme muistiin 6 yksilöä matkamme varrelta.	
Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>
White Volta-joen tuntumassa näimme 11 linnun parven ruokailemassa keskellä harvakseltaan liikennöityä tietä.	
Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>
Mole NP, yht. 9.	
Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>
Mole NP, yht. 7.	



Abdim's Stork, White Volta.

White-faced Whistling Duck

Dendrocygna viduata

Mole NP:ssa näimme noin 60 eläinten juomapaikalla.

Palm-nut Vulture

Gypohierax angolensis

Näimme rannikon tuntumassa kolmena päivänä yht. 4 yksilöä.

White-backed Vulture

Gyps africanus

Molen kansallispuistossa näimme laskujemme mukaan 17.

Hooded Vulture

Necrosyrtes monachus

Yleisin korppikotka, näimme lajin kuutena päivänä, mutta määrät pieniä, suurin päiväsusma 20.

White-headed Vulture

Trigonoceps occipitalis

Näimme 3 Mole NP:ssa. Alla yksi niistä.



African Harrier-Hawk

Polyboroides typus

Melko yleinen metsien ja pensaikkomaiden petolintu, havaintoja viitenä päivänä, 1-3 / päivä.

Bateleur

Terathopius ecaudatus

Näimme Mole NP:ssa yht. 4, kaikki nuoria tai esiaikuisia.

Black-winged Kite

Elanus caeruleus

Matkan ainoa oli White Voltan rantaniityillä 21.4.

Yellow-billed Kite

Milvus migrans aegyptius

Yleinen ja runsas kaikkialla.

Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Brenu Beach road, 15.4. näimme 2 lintua.

Beaudouin's Snake Eagle

Circaetus beaudouini

20.4. Molen kansallispuiston liepeillä näimme matkan ainoan.

Shikra

Accipiter badius

Havaitsimme yhteensä 3 eri puolilla maata.

Lizard Buzzard

Kaupifalco monogrammicus

Yhteensä kuusi lintua, enimmäkseen auton ikkunasta nähtyinä eri puolilla maata.

Dark Chanting Goshawk

Melierax metabates

Molen kansallispuistossa yht. 2 ja 1 ääntelevä White Voltan rantaniittyjen laidassa.

Congo Serpent Eagle*Circaetus spectabilis*

Matkan tähtilajeja! Kakumin kansallispuiston pohjoisreunalla, Antiwikwaan tiellä yksi ad. lintu nähtiin hetken puussa ja sitten lennossa. Tilanne oli lyhyt ja nopea, mutta onneksi linnusta saatiin lajimäärityksen varmistavat dokumenttikuvat.

Long-tailed Hawk*Urotriorchis macrourus*

Atewa Forest Rangen parhaita lajeja. Havaitsimme ilmeisesti pariskunnan, sillä toisen näimme lennossa samaan aikaan toisen huutaessa lähistöllä. Äänekäs laji.

Grasshopper Buzzard*Butastur rufipennis*

Sisämaassa näimme yhteensä seitsemän lintua, enimmäkseen kuivemmalla alueella pohjoisessa.

Red-necked Buzzard*Buteo auguralis*

Kolmena päivänä yhteensä kolme nähtyä.

European Honey Buzzard*Pernis apivorus*

Molen kansallispuistoon tullessamme näimme kaksi lintua, molemmat lennossa pohjoisen suuntaan, tosin matalalla.

Lanner Falcon*Falco biarmicus*

Yllättävän yleinen: näimme keltapäähaukan neljänä päivänä, yhteensä seitsemän yksilöä. Ensimmäinen Shai Hills, sitten Brenu Beach Roadilla ja Mole NP.

Common Kestrel*Falco tinnunculus*

Yksi märkä lintu istui sateessa Hotel Royal Bleumichin tv-antennissa palatessamme retkeltä Atewan metsästä.

Grey Kestrel*Falco ardosiaceus*

Retkemme saldo oli kuusi lintua neljänä päivänä eri puolilla.

African Hobby*Falco cuvierii*

White Volta, 1 lintu rantaniityillä lennossa.

Helmeted Guineafowl*Numida meleagris*

Helmikanoja näimme ainoastaan Molen kansallispuistossa, missä se on yleinen, mutta arka.

White-throated Francolin*Peliperdix albogularis*

Odotettu toivelaji! Molen kansallispuistossa kuulumme 18.4. kolmen linnun ääntelevän illan hämärtyessä hylätyllä lentokentällä. 19.4. myös Ä1, mutta 20.4. näimme loistavasti yhden, sen juostessa editsemme (alla).

**Ahanta Francolin***Pternistis achantensis*

15.4. kuulumme yhden linnun Brenu Beach roadilla ja 17.4. ainakin 3 Bobiri Butterfly Sanctuaryssa.

Double-spurred Francolin*Pternistis bicalcaratus*

Yleisin frankoliini, näimme yhteensä 48 kuutenä päivänä.

Stone Partridge*Ptilopachus petrosus*

Havaitsimme Shai Hillsillä 8 ja Molessa 7.

White-spotted Flufftail*Sarothrura pulchra*

Matkamme odotetuimpia lajeja, siitä huolimatta odotukset Flufftailin näkemiseen eivät kuitenkaan olleet ryhmässämme kovin suuret. Kaikkihan me tiedämme, kuinka vaikeaa on nähdä punatulkun kokoinen rantakana. No, Kakumin liepeillä, Aboabossa olosuhteet olivat kohdillaan. Synkän metsätilkun läpi virtaavan puron varressa oli Flufftailin reviiri. Metsän pohjakerroksessa ei ollut juurikaan kasvillisuutta, joten kun silmä onnistui löytämään linnun varjoista, pudonneiden oksien takaa, niin siinäpä silmää oli hyvä lepuuttaa! Hienosti nähty lintu. Salamavalo oli autossa, joten kuvat jäivät tällä kertaa ottamatta...

Lisäksi kuulumme 21.4. Opuro forestissa yhden.

Black Crake	<i>Amaurornis flavirostra</i>
Hans Cottage Botelin lammella oli 2 ja Molen kansallispuiston lampareilla 4.	
African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>
Yleinen erilaisilla kosteikoilla.	
Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>
Shai Hillsin savannilla näimme yhden linnun ja Winneba Plainsilla toisen.	
Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>
Melko yleinen, havaitsimme neljänä päivänä yht. 16.	
Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>
Winneba Lagoon, 4.	
Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>
Twifo Praso, Pra-joen silta, 9.	
Egyptian Plover	<i>Pluvianus aegyptianus</i>
Tästäkin lajista ryhmämme pinnakunkku Eki nappasi pinnan! Näimme White Volta-joella yhteensä 2+2.	



Forbes's Plover	<i>Charadrius forbesi</i>
19.4. näimme Molen kansallispuiston kuivimmalla "arolla" yhden ylilentävän, ääntelevän linnun.	
African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>
Melko yleinen, kirjasimme muistiin 16 eri puolilta.	
Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>
Näimme Molen kansallispuiston alueella yhteensä 4.	
Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>
Yksi lintu Winneba Lagoon.	
Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>
Winneba Lagoon, yht. 34.	
Sanderling	<i>Calidris alba</i>
Winneba lagoon, 2.	
Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>
Winneba lagoon, 11.	
Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>
Winneba lagoon, 2, Brenu Beach road, 9.	
Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>
Yhteensä kolme, eri puolilla.	
Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>
Winneba lagoon, 1.	
Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>
Winneba lagoon, 1.	
Royal Tern	<i>Thalasseus maximus</i>
Winneba lagoon, 6.	
Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>
Winneba lagoon, 1.	
Black-billed Wood Dove	<i>Turtur abyssinicus</i>
Mole NP, yht. 5.	
Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>
Shai Hills, yht. 3.	
Blue-headed Wood Dove	<i>Turtur brehmeri</i>
Bobiri Butterfly Sanctuary, yht. Ä3.	
Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>
Yleinen metsäkyhky, kuutena päivänä havaitsimme 1-6 / päivä.	
Rock Dove	<i>Columba livia</i>

Yleinen taajamissa.

Afep Pigeon

Columba unicincta

Afep Pigeonin laulu on vaimea ja matala, vaikeasti metsän kuorosta erottuva. Tiedon mukaan reagoi atrappiin lentämällä heti pois. Tämän tiedon kokemuksemme vahvistaa. Näimme sen pakolennossa Bobiri Butterfly metsässä, jossa yht. 2.

African Green Pigeon

Treron calvus

Yleinen, havaitsimme 8 päivänä, 1-30 / päivä.

Bruce's Green Pigeon

Treron waalia

Mole NP, kahtena päivänä yht. 5.

Laughing Dove

Spilopelia senegalensis

Havaitsimme retken jokaisena päivänä, 1-100 / päivä.

Red-eyed Dove

Streptopelia semitorquata

Yleinen, havaitsimme retken jokaisena päivänä, 1-20 / päivä.

Vinaceous Dove

Streptopelia vinacea

Yleinen, havaintoja viitenä päivänä.

Red-fronted Parrot

Poicephalus gulielmi

Havaintoja neljänä päivänä: Antiwikwaa, Pongro forest, Opuro forest, Bobiri.

Senegal Parrot

Poicephalus senegalus

Edellistä vähälukuisempi, Shai Hills, 2 ja Mole NP, 6.

Rose-ringed Parakeet

Psittacula krameri

Mole NP, 36.

Grey Parrot

Psittacus erithacus

Kakum NP, Canopy walkway 2-platform, 1 ylilentävä oli matkamme ainoa. Kuva alla, Eki on jo perillä 2-platformilla.



Western Plantain-eater

Crinifer piscator

Yleinen, havaitsimme lajin 7 päivänä.

Violet Turaco

Musophaga violacea

Shai Hills, 2, Mole NP, Ä ja White Volta 3.

Yellow-billed Turaco

Tauraco macrorhynchus

Havaitsimme lajin kolmena päivänä: Kakum NP, yht. 3 ja Opuro forest, Ä.

Green Turaco *Tauraco persa*
Havaitsimme lajin neljänä päivänä, 1-3 lintua / päivä.

Olive Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx olivinus*
Olimme tyytyväisiä kuultuamme tämän harvalukuisen käen Kakum NP:n sivutiellä 15.4.

Jacobin Cuckoo *Clamator jacobinus*
Havaintoja neljänä päivänä eri puolilta, yht. 4 yksilöä.

Levaillant's Cuckoo *Clamator levaillantii*
Kakum NP:n sivutiellä 15.4. Ä1.

Black Cuckoo *Cuculus clamosus*
Kakum NP, Antiwikwaa 2Ä ja Bobiri forest Ä2.

African Cuckoo *Cuculus gularis*
Näimme ja kuulimme yht. 3 Mole NP ja Opuro forest.

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*
Havaintoja viitenä päivänä.

Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius*
Kakum NP ja ympäristö, yht. 3. Bobiri, 1.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*
Opuro forest, Ä1.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*
Yleinen pensaikkomailla, havaitsimme 7 päivänä, 1-2 / päivä.

Black-throated Coucal *Centropus leucogaster*
Havaitsimme yht. 9 neljänä päivänä.

Senegal Coucal *Centropus senegalensis*
Edellistä yleisempi, havaintoja 7 päivänä.

Yellowbill *Ceuthmochares aereus*
Näimme ja kuulimme viitenä päivänä yht. 8.

Greyish Eagle-Owl *Bubo cinerascens*
Mole NP, yht. 2. Toisen näimme "pensaikossa" iltahämärissä, toisen majatalomme takana tolpan päässä, salamakuva alla.



Fraser's Eagle-Owl *Bubo poensis*
Kakum NP, 1. Lintu löytyi keskellä aamupäivää metsästä, varoitelevien pikkulintujen johdattaessa meidät paikalle.

African Wood Owl *Strix woodfordii*
14.4. Kakum NP, Ä1 ja 17.4. Bobiri, Ä1.

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*
Näimme yhteensä kolme Mole NP:n puustoisella savannialueella.

African Scops Owl *Otus senegalensis*
Mole NP, 1Ä + Ä. 19.4. iltahämärissä.

Northern White-faced Owl *Ptilopsis leucotis*
Mole NP, 1 majatalomme pihassa 18.4. iltahämärissä. Jari ainoana kuittasi tämän lajin.

Long-tailed Nightjar *Caprimulgus climacurus*
Yleisin kehrääjä, havaitsimme neljänä iltana yhteensä 27.

Brown Nightjar *Veles binotatus*
Bobiri forest, iltahämärissä 17.4. kuulimme yhden.

Plain Nightjar *Caprimulgus inornatus*
21.4. Opuro forest, 1.

Standard-winged Nightjar*Macrodipteryx longipennis*

Etukäteen odotetuimpia lajeja. 18.4. menimme iltahämärissä Mole Airstripille, hylätylle lentokentälle ja pariskunta laskeutui hetkeksi loistavasti eteemme. 20.4. säikäytimme koiraan päivälevolta Mole NP:n metsässä. Koiras on yksi lintumaailman ihmeistä lentäessään! Valitettavasti valokuvausyrityksemme olivat tuloksettomia.

Cassin's Spinetail*Neafrapus cassini*

Opuro forest, 2.

Sabine's Spinetail*Rhaphidura sabini*

Bobiri forest, 2.

Black Spinetail*Telacanthura melanopygia*

Bobiri forest, 7.

Mottled Spinetail*Telacanthura ussheri*

Kakum NP, 2, Mole NP, 6.

Little Swift*Apus affinis*

Paikoitellen yleinen, havaintoja lähes jokaisena matkapäivänä.

African Palm Swift*Cypsiurus parvus*

Yleinen etenkin etelässä, jossa päivittäin 2-10.

Common Swift*Apus apus*

Apuksien määrittäminen oli työlästä, Kakuminseudulla lajia ei enimmäkseen määritetty, mutta Apuksia näkyi pieniä määriä päivittäin. Molessa lajimmäritys onnistui, 3-100 / päivä.

Pallid Swift*Apus pallidus*

Laji määritettiin Mole NP:ssa valokuvista 20.4. jolloin näimme noin 10.

African Pygmy Kingfisher*Ceyx/Ispidina picta*

Winneba Plains, 1. Kakum NP ympäristö, yht. 6.

Malachite Kingfisher*Corythornis cristatus*

Winneba lagoon, 1 ja Brenu Beach road, 1.

Striped Kingfisher*Halcyon chelicuti*

Mole NP, yht. 3.

Pied Kingfisher*Ceryle rudis*

Winneba lagoon, 15 ja Mole NP, 1.

Chocolate-backed Kingfisher*Halcyon badia*

Odotettu Atewa forestin laji (alla), jonka näimme lopulta erinomaisesti, yht. 2 ja Ä1.

**Grey-headed Kingfisher***Halcyon leucocephala*

Mole NP, 2.

Blue-breasted Kingfisher*Halcyon malimbica*

Mole NP, 2.

Woodland Kingfisher*Halcyon senegalensis*

Yleinen, havaintoja kuutena päivänä.

Black Bee-eater*Merops gularis*

15.4. näimme Kakum NP:n lähistöllä yhteensä 5.

White-throated Bee-eater*Merops albicollis*

Yleisin bee-eater, lähes päivittäin 1-50.

Red-throated Bee-eater*Merops bulocki*

Yleinen ja runsas 19.4. Mole NP, jolloin noin 200, seuraavana päivänä 2, muina matkapäivinä emme nähneet ainuttakaan.

Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus*

20.4. Mole NP, 4.

Abyssinian Roller *Coracias abyssinicus*

Mole NP:nseudulla 1-10 päivittäin.

Blue-bellied Roller *Coracias cyanogaster*

Shai Hills, 6.

Rufous-crowned /Purple Roller *Coracias naevius*

Shai Hills, 1.

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*

Mole NP:ssa kolmena päivänä 1-10 / päivä.

Blue-throated Roller *Eurystomus gularis*

Kakum NP, Bobiri, Oपुरo forest – näissä 1-10 / päivä. Alla skouppikuva lajista.



Narina Trogon *Apaloderma narina*

Bobiri forest 1/ Ä.

White-headed Wood Hoopoe *Phoeniculus bollei*

Kakum NP ja ympäristö, 2-10 / päivä.

Forest Wood Hoopoe *Phoeniculus castaneiceps*

Antiwikwaa, 1 ja Bobiri forest, 2.

Green Wood Hoopoe *Phoeniculus purpureus*

Mole NP, 7.

Black Scimitarbill *Rhinopomastus aterrimus*

Mole NP, 2.

Red-billed Dwarf Hornbill *Tockus camurus*

Tämän vähälukuisen sarvinokan kuulumme Kakum NP:n sivutiellä 15. 4. jolloin Ä2.

Black Dwarf Hornbill *Tockus hartlaubi*

Myös vähälukuinen laji – näimme Bobirissa 2.

African Grey Hornbill *Tockus nasutus*

Melko yleinen, yhteensä neljänä päivänä kirjassimme havainnot kaikkiaan 25 yksilöstä.

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus*

Yleinen ja runsas. Kuutena päivänä yht. 91.

Northern Red-billed Hornbill *Tockus erythrohynchus*

Mole NP, 2.

Piping Hornbill *Bycanistes fistulator*

Kakum NP, 14.4. näimme kolme.

White-crested Hornbill *Tropicranus albocristatus*

17.4. Aboabo forest, 1Ä.

Black-casqued Hornbill *Ceratogymna atrata*

Kakum NP, 14.4. näimme pariskunnan Canopy walkwaylta.

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchaillui*

15.4. Kakum NP:n sivutiellä 1Ä ja Ä1.

Red-rumped Tinkerbird *Pogoniulus atroflavus*

16.4. Kakum NP, Antiwikwaa, 1.

Yellow-rumped Tinkerbird

Atewa forest, Ä.

*Pogoniulus bilineatus***Yellow-fronted Tinkerbird**

Shai Hills, 2, Mole NP, 3.

*Pogoniulus chrysoconus***Speckled Tinkerbird**

Havaintoja 4 päivänä Kakum NP ja Oपुरo forest.

*Pogoniulus scolopaceus***Yellow-throated Tinkerbird**

Näimme lajin kolmena päivänä.

*Pogoniulus subsulphureus***Hairy-breasted Barbet**

Antiwikwaa, 1, oli matkamme ainoa.

*Tricholaema hirsuta***Naked-faced Barbet**

Kakum NP, 2.

*Gymnobucco calvus***Bristle-nosed Barbet**

Kakum NP ja Oपुरo forest, yht. 20.

*Gymnobucco peli***Bearded Barbet**

Näimme Mole NP:ssa yht. 4.

*Lybius dubius***Veillot's Barbet**

Shai Hills, yht. 6.

*Lybius vieilloti***Least Honeyguide**

22.4. Bobiri Butterfly Sanctuary, 2 lintua ruokaili ja touhusi puiston HQ:n pihalla aamupäivällä. Ghanassa laji on varsin harvinainen.

*Indicator exilis***Cassin's Honeybird**

15.4 Kakum NP:n sivutie 1.

*Prodotiscus insignis***Greater Honeyguide**

19.4. Mole NP, 1 juv, oli matkan ainoa, kuva alla.

Indicator indicator**Lesser Honeyguide**

Mole NP, 20.4. näimme yhden.

*Indicator minor***Cardinal Woodpecker**

Mole NP, yht. 2.

*Dendropicos fuscescens***Brown-backed Woodpecker**

Mole NP, yht. 3.

*Dendropicos obsoletus***Little Green Woodpecker**

Kakum NP, /1.

*Campethera maculosa***Buff-spotted Woodpecker**

Kakum NP, Aboabo, yht 4.

*Campethera nivos***Melancholy (Gabon) Woodpecker**

Kakum NP, /1.

Dendropicos lugubris

15.4 Kakum NP:n sivutie 2.

Fire-bellied Woodpecker

Havaintoja viitenä päivänä eri puolilla, 1-3 / päivä.

*Dendropicos pyrrhogaster***African Piculet**

Kakum NP, Antiwikwaa, 1. Mukava yllätys, sillä tämä pieni tikka on harvalukuinen ja lisäksi vielä hankala nähdä.

Sasia africana

Rufous-sided Broadbill*Smithornis rufolateralis*

Kakum NP, 1Ä, Canopy Walkwaylle johtavan polun varrella. Tämä oli hieno alku uudelle päivälle!

Sun Lark*Galerida modesta*

19.4. näimme noin 20 Mole NP:n aromaisella alueella.

Flappet Lark*Mirafr rufocinnamomea*

Näimme ja kuulimme noin 5 lintua Shai Hillsin savannilla. Lajin suomenkielinen nimi on pärinäkiuru – oikein hyvä nimi tällä mielenkiintoiselle kiurulajille.

Rufous-rumped Lark*Pinarocorys erythropygia*

Mole NP:n yllätyslaji – näimme 3 lintua aivan auton vieressä – dokumenttikuvat saatiin, mutta ne eivät kauheasti kuvaajan mieltä lämmittä.

White-bibbed Swallow*Hirundo nigrita*

Twifo Praso, 16.4. näimme Pra-joen sillalta 2 lintua.

Square-tailed Saw-wing*Psalidoprocne nitens*

Atewa forest, 1.

Fanti Saw-wing*Psalidoprocne obscura*

Opuro forest, 2.

White-throated Blue Swallow*Hirundo nigrita*

Twifo Praso, 16.4. näimme Pra-joen sillalta 2 lintua.

Lesser Striped Swallow*Cecropis abyssinica*

Pääskyistä osa jäi vähälle huomiolle ja luvut siksi melko vaatimattomiksi. Määritimme Kakumin ja Opuron välimaastossa yht. 13 Lesser Striped Swallowta.

Mosque Swallow*Cecropis senegalensis*

Yhteensä 8 määritetty, havaintoja kolmena päivänä.

Common House Martin*Delichon urbicum*

Mole Np, yht. 8.

Preuss's Cliff Swallow*Petrochelidon preussi*

Brenu Beach road, noin 200 tuli yöpymään, ilmeisesti tien alittavaan rumpuputkeen.

Barn Swallow*Hirundo rustica*

Yleinen ja runsaslukuinen.

Wire-tailed Swallow*Hirundo smithii*

Mole NP ja ympäristö, yht. 17 määritetty.

African Pied Wagtail*Motacilla aguimp*

Yleinen kylien ja taajamien liepeillä.

**Plain-backed Pipit***Anthus leucophrys*

Shai Hills, 3.

Tree Pipit*Anthus trivialis*

Mole NP, yht. 2.

Red-shouldered Cuckooshrike*Campephaga phoenicea*

Shai Hills, 1 ja Mole Np, yht. 8.

Purple-throated Cuckooshrike*Campephaga quiscalina*

Bobiri forest, /1.

Blue Cuckooshrike*Coracina azurea*

Kakum NP:n alueella näimme yhteensä 4 ja Bobirissa 3.

White-breasted Cuckooshrike*Coracina pectoralis*

Mole NP:ssa näimme lajin kahtena päivänä, yhteensä 2 yksilöä.

Little Grey Greenbul Kakum NP, yht. 6 ja Bobiri forest, 6.	<i>Andropadus gracilis</i>
Yellow-whiskered Greenbul Kakum NP, yht. 6 ja Atewa forest, 1.	<i>Andropadus latirostris</i>
Little Greenbul Kakum NP, yht. 3.	<i>Andropadus virens</i>
Slender-billed Greenbul Kakum NP, yht. 5 ja Bobiri forest, 1, Atewa 3.	<i>Stelgidillas gracilirostris</i>
Honeyguide Greenbul Kakum NP, yht. 2 ja Bobiri forest, 2, Atewa 1.	<i>Baeopogon indicator</i>
Golden Greenbul Kakum NP, yht. 3 ja Bobiri forest, 5, Atewa 3.	<i>Calyptocichla serinus</i>
Icterine Greenbul Bobiri forest, 1, Atewa 2.	<i>Phyllastrephus icterinus</i>
Simple Leaflove Kakum NP:n sivutie, 1.	<i>Chlorocichla simplex</i>
Western Nicator Kakum NP:n sivutie, 1, Bobiri forest, 1, Atewa 1.	<i>Nicator chloris</i>
Common Bulbul Yleinen jokapaikan höylä, havaintoja jokaisena matkapäivänä.	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Swamp Palm Bulbul Kakum NP:n sivutie, viiden linnun parvi.	<i>Thescelocichla leucopleura</i>
Grey-headed Bristlebill Kakum NP, yht. 4. Tälläkin lajilla on hieno suomenkielinen nimi: guineansukasnokka.	<i>Bleda canicapillus</i>
Green-tailed Bristlebill Atewa forest, 2.	<i>Bleda eximius</i>
Red-tailed Bristlebill Kakum NP, 2, Bobiri forest, 1, Atewa 2.	<i>Bleda syndactylus</i>
Western Bearded Greenbul Kakum NP, 2.	<i>Criniger barbatus</i>
Red-tailed Greenbul Bobiri forest, 2, Oपुरo forest, 2.	<i>Criniger calurus</i>
Yellow-bearded Greenbul Kakum NP, 1 (alla) ja Atewa 2.	<i>Criniger olivaceus</i>



White-tailed Alethe Kakum NP, 3, Atewa 3. Tälläkin lajilla on hieno suomenkielinen nimi: kekälekerkkurastas.	<i>Alethe diademata</i>
White-tailed Ant Thrush Atewa forest, 1 ja Ä1. Taisimme olla onnekkaita, sillä näimme tämän piilottelevan metsälinnun oikein hyvin Atewan rinnetiemessä.	<i>Neocossyphus poensis</i>
Forest Robin Kakum NP, Ä ja Oपुरo forest, 1Ä ja Ä1.	<i>Stiphrornis erythrothorax</i>

Finsch's Rufous Thrush Kakum NP, 1, Bobiri, yht. Ä2, Atewa 2. Nigerianmuurahaisrastas.	<i>Stizorhina finschi</i>
White-crowned Robin-Chat Mole NP, 2.	<i>Cossypha albicapillus</i>
Snowy-crowned Robin-Chat Näimme yhteensä 6 lintua neljänä päivänä Kakum NP:ssa, Opuro forestissa ja Mole NP:ssa.	<i>Cossypha niveicapilla</i>
Forest Scrub Robin Atewa forest, Ä1. Metsäruostepyrstö.	<i>Erythropygia leucosticta</i>
African Thrush Shai Hills, 2.	<i>Turdus pelios</i>
Whinchat Mole NP, yht. 6.	<i>Saxicola rubetra</i>
White-fronted Black Chat Mole NP, näimme kaksi naaraspukuista puustoisella savannilla.	<i>Pentholaea albifrons</i>
Mocking Cliff Chat Tämän linnun löytyminen oli hauska tapaus. Olimme saapuneet Shai Hillsin alueella 13.4. erään korkean kalliokukkulan juurelle. Tuumailin, että tällaisessa paikassa täytyy olla jonkin erityisen lajin reviiri ja kysyin asiaa oppaaltamme Kalulta. Kalu totesi, että juu, tällaisessa paikassa voi olla Mocking Cliff Chat. Soitimme atrappia noin neljä sekuntia, kun korkealta kallion laelta lähti isomuuraista tasku syöksyyn ja lensi äännellen ohitsemme laskeutuen kaljun puun latvaan. Katselimme lintua sitten tyytyväisinä.	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>
African Moustached Warbler Winneba Plains, 3, Mole NP Ä, ja White Voltan niityt, Ä.	<i>Melocichla mentalis</i>
Rufous-crowned Eremomela Kakum NP, 4.	<i>Eremomela badiceps</i>
Senegal Eremomela Melko yleinen, Shai Hills ja Mole NP.	<i>Eremomela pusilla</i>
Lemon-bellied Crombec Kakum NP:n alueella yht. 5.	<i>Sylvietta denti</i>
Green Crombec Kakum NP:n alueella yht. 4.	<i>Sylvietta virens</i>
Green Hylia Yleinen metsälintu, kirjassimme muistiin yht. 42.	<i>Hylia prasina</i>
Wood Warbler Näimme eri puolilla yht. 3.	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Willow Warbler Mole NP:n seudulla yht. 5.	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Violet-backed Hyliota Kakum NP, Canopy walkway, 2.	<i>Hyliota violacea</i>
Grey Longbill Melko yleinen metsänreunan lintu, havaintoja viitenä päivänä.	<i>Macrosphenus concolor</i>
Kemp's Longbill Melko yleinen metsänreunan lintu, havaintoja neljänä päivänä.	<i>Macrosphenus kempii</i>
Singing Cisticola Shai Hills ja Kakum NP, yht. 6.	<i>Cisticola cantans</i>
Red-faced Cisticola Winneba Plains 2 ja Kakum NP:n reuna-alueet, 1.	<i>Cisticola erythrops</i>
Whistling Cisticola Kakum NP:n reuna-alueet, 1.	<i>Cisticola lateralis</i>
Black-backed Cisticola White Voltan rantaniityt, 2Ä.	<i>Cisticola eximius</i>
Winding Cisticola White Voltan rantaniityt, 3Ä.	<i>Cisticola marginatus</i>
Croaking Cisticola Shai Hills, Winneba Plains, yht. 5.	<i>Cisticola natalensis</i>
Yellow-breasted Apalis Mole NP, 1.	<i>Apalis flavida</i>
Black-capped Apalis Kakum NP, yht. 3.	<i>Apalis nigriceps</i>
Sharpe's Apalis Kakum NP, yht. 3.	<i>Apalis sharpii</i>

Red-winged Warbler

Kakum NP ja Mole NP, yht. 4.

Heliolais erythropterus

Tawny-flanked Prinia

Laajalle levinnyt laji. Näimme yht. 4 eri puolilla Ghanaa.

Prinia subflava

Grey-backed Camaroptera

Yleinen, havaitsimme yht. 29 eri puolilla. Alla yksi Kakum NP:ssa kuvattu.

Camaroptera brevicaudata

**Olive-green Camaroptera**

Metsälaji, havaitsimme yht. 6, mm. Atewassa.

Camaroptera chloronota

Yellow-browed Camaroptera

Metsälaji, havaitsimme yht. 7, mm. Atewassa.

Camaroptera superciliaris

Oriole Warbler

Kuulimme yhden Shai Hillsilla ja Mole NP:ssa myös näimme lajin. Siniperuukkikerttu suomeksi.

Hypergerus atriceps

Fraser's Forest Flycatcher

Kakum NP:n pohjoisosissa yht. 3 ja Bobiri forest, Ä1.

Fraseria ocreata

Northern Black Flycatcher

Savannilaji. Shai Hills, 2 ja Mole NP, 5.

Melaenornis edolioides

Ussher's Flycatcher

Latvalaji, Kakum NP, 2 ja Bobiri forest, 2.

Muscicapa ussheri

Dusky-blue Flycatcher

Kakum NP, Aboabo, 2 ja Bobiri forest, 2.

Muscicapa comitata

Tessmann's Flycatcher

Kakum NP, Antiwikwaa, 1.

Muscicapa tessmanni

European Pied Flycatcher

Mole NP, 4.

Ficedula hypoleuca

Swamp Flycatcher

Mole NP, 3.

Muscicapa aquatica

Gambaga Flycatcher

Mole NP, 1. Gambaga fc on Ghanassa vähälukuinen ja paikoittainen. Mole NP:ssa lajia tavataan yhden lammikon rannalla, jossa on noin kolme reviiriä.

Muscicapa gambagae

Spotted Flycatcher

Shai Hills, 1.

Muscicapa striata

Grey-throated Tit-Flycatcher

Bobiri forest. Ä1, ja Atewa 1Ä.

Myioparus griseigularis

Lead-coloured Flycatcher

Shai Hills, 2 ja Mole NP, 1. Tämän lajin kohdalla kirjan kuvitus aiheutti hämmennystä. Laji kannattaa opiskella valokuvista.

Myioparus plumbeus

African Blue Flycatcher

Mole NP, 3.

Elminia longicauda

Chestnut-capped Flycatcher

Erikoinen flycatcher, muistuttaa käyttäytymiseltään ja muodoltaan warbleria tai sylviaa. Kakum NP, Aboabo, 2 ja Antiwikwaa, 2.

Erythrocercus mccallii

Red-bellied Paradise Flycatcher

Melko yleinen metsälintu, havaitsimme yht. 13.

Terpsiphone rufiventer

African Paradise Flycatcher *Terpsiphone viridis*
Mole NP, yht. 7 ja Bobiri forest, 1.
Blue-headed Crested Flycatcher *Trochocercus nitens*
Kakum NP, Antiwikwaa Ä2, ja Bobiri forest, Ä1.
Bioko Batis *Batis poensis*
Kakum NP, 1/1.
Senegal Batis *Batis senegalensis*
Näimme yhteensä 6 eri puolilla. Alla naaras.



Black-and-white flycatcher *Bias musicus*
Opuro forest /1, ja Atewa forest 1.
African Shrike-flycatcher *Megabyas flammulatus*
Atewa forest, 1.
Chestnut Wattle-eye *Platysteira(Dyaphorophya) castanea*
Melko yleinen metsälintu.
Common (Brown-throated)Wattle-eye *Platysteira cyanea*
Shai Hills, Kakum NP, Bobiri forest, yht. 7.
Capuchin Babbler *Phyllanthus atripennis*
Opuro forest, 2.
Brown Babbler *Turdoides plebejus*
Mole NP, 2.
Blackcap Babbler *Turdoides reinwardtii*
Mole NP, 4.
Yellow-headed Picathartes *Picathartes gymnocephalus*
New Edusiaben metsäalue, 2.
Blackcap Illadopsis *Illadopsis cleaveri*
Atewa forest, 1Ä.
Brown Illadopsis *Illadopsis fulvescens*
Kakum NP:n sivutie 1, ja Atewa forest, 1.
Puvel's Illadopsis *Illadopsis puveli*
Kakum NP, 2 ja Atewa forest, 1.
Dusky Tit *Parus funereus*
Kakum NP, Antiwikwaa, 1Ä.
White-shouldered Black Tit *Parus leucomelas*
Mole NP, yht. 6.
Tit Hylia *Pholidornis rushiae*
Hyvin pieni lintu ja usein metsän latvuksessa, siksi aika hankala tapaus. Havaitsimme kuitenkin yhteensä 11.

Spotted Creeper	<i>Salpornis spilonotus</i>
Näimme Mole NP:ssa kaksi helmikiipijää.	
Yellow White-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>
Yllättävän harvinainen, näimme lajin ainoastaan Atewa forestissa.	
Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>
Yleinen Kakum NP:n seudulla.	
Fraser's Sunbird	<i>Deleornis fraseri</i>
Näimme yhden Kakum NP:ssa ja yhden Bobiri forestissa.	
Buff-throated Sunbird	<i>Chalcomitra adelberti</i>
Hieno lintu! Näimme yhteensä kolme: Kakum NP, Bobiri forest, Opuro forest.	
Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>
Mole NP, yht. 10.	
Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>
Kakum NP:n ympäröivillä alueilla näimme yht. 5.	
Splendid Sunbird	<i>Cinnyris coccinigastrus</i>
Shai Hills ja Kakum NP, yht. 3Ä.	
Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>
Shai Hills, 4 ja Mole NP, 3.	
Johanna's Sunbird	<i>Cinnyris johannae</i>
Kakum NP, Canopy walkway, 2.	
Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>
Mole NP, 2.	
Superb Sunbird	<i>Cinnyris superbus</i>
Kakum NP, 2 ja Bobiri forest, yht. 2.	
Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>
Kakum NP, 1.	
Olive Sunbird	<i>Cyanomitra olivacea</i>
Kakum NP, 1.	
Green-headed Sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>
Kakum NP, 2.	
Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>
Yleinen ja laajalle levinnyt, havaitsimme 32 yhteensä.	
Yellow-billed Shrike	<i>Corvinella corvina</i>
Shai Hills, 1 ja Mole NP, 3.	
Common Fiscal	<i>Lanius collaris/humeralis</i>
Tien varsilla paikoitellen, yleisin pohjoisessa.	
Many-colored Bushshrike	<i>Chlorophoneus multicolor</i>
Atewa forest, 1/ Ä ja Ä1.	
Sulphur-breasted Bushshrike	<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>
Winneba plains, 1 ja Mole NP, 2.	
Grey-headed Bushshrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>
Opuro forest, 1.	
Fiery-breasted Bushshrike	<i>Malaconotus cruentus</i>
Opuro forest, ensikäynnillä kuulimme 2, jälkimmäisellä käynnillä näimme peräti 4.	
Marsh Tchagra	<i>Bocagia minuta</i>
Brenu Beach road, 2.	
Brown-crowned Tchagra	<i>Tchagra australis</i>
Kakum NP, sivutie, 1.	
Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>
Shai Hills, 2 ja Mole NP, 1.	
Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>
Ilmeisesti melko yleinen: näimme lajin neljässä paikassa avomaiden tuntumassa.	
Sabine's Puffback	<i>Dryoscopus sabini</i>
Kakum NP, Ä, Bobiri forest, Ä1 ja 1Ä.	
Brubru	<i>Nilaus afer</i>
Melko yleinen Mole NP.	
Yellow-crowned Gonolek	<i>Laniarius barbarus</i>
Melko yleinen pensaikkojen piileskelijä.	
Sooty Boubou	<i>Laniarius leucorhynchus</i>
Kakum NP:n sivutie 1Ä.	

Red-billed Helmetshrike	<i>Prionops caniceps</i>
Sympaattinen lintu! Näimme yhteensä 6 (Kakum NP ja Opuro forest).	
African Golden Oriole	<i>Oriolus auratus</i>
Mole NP, yht. 5.	
Western Oriole	<i>Oriolus brachyrynchus</i>
Kirjasimme muistiin yht. 16, lähinnä Kakum NP:n seudulta.	
Black-winged Oriole	<i>Oriolus nigripennis</i>
Tämän ja edellisen lajin kanssa määritykset eivät menneet ihan kohdalleen ennen kuin matkan loppumetreillä.	
Bobiri forest, 2.	
Pied Crow	<i>Corvus albus</i>
Runsas ja yleinen.	
Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>
Melko yleinen, havaintoja viitenä päivänä.	
Shining Drongo	<i>Dicrurus atripennis</i>
Bobiri forest, 1.	
Velvet-mantled Drongo	<i>Dicrurus modestus</i>
Melko yleinen, mm. Bobiri forest, 10.	
Piapiac	<i>Ptilostomus afer</i>
Shai Hills, 1, Atewan seutu, 1 jätien varressa matkalla Mole NP:hen, 2.	
Copper-tailed Starling	<i>Hylopsar cupreocauda</i>
Mole NP, yht. 5.	
Splendid Starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>
Opuro forest, 10.	
Forest Chestnut-winged Starling	<i>Onychognathus fulgidus</i>
Kakum NP, 6 ja Bobiri forest, yht. 5.	
Long-tailed Glossy Starling	<i>Lamprotornis caudatus</i>
Mole NP, yht. 5.	
Bronze-tailed Starling	<i>Lamprotornis chalcurus</i>
Mole NP, 2.	
Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>
Mole NP, yht. 4.	
Lesser Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chloropterus</i>
Mole NP, 1.	
Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>
Mole NP, yht. 12, Bobiri forest, 1. Kuvassa alla.	



Northern Grey-headed Sparrow	<i>Passer griseus</i>
Yleinen kylien laitamilla, kirjasimme muistiin yht. 54.	
Bush Petronia	<i>Petronia dentata</i>
Mole NP, 1, Ä1.	
Chestnut-crowned Sparrow-Weaver	<i>Plocepasser superciliosus</i>
Mole NP, Ä1, 2.	
Orange Weaver	<i>Ploceus aurantius</i>
Brenu Beach road, 4, Hans Cottage Botelin lampi, 10.	

Village Weaver*Ploceus cucullatus*

Monin paikoin yleinen ja runsaslukuinen, erityisesti Hans Cottage Botelin lampi, jossa noin 200. Kuvassa alla.

**Little Weaver***Ploceus luteolus*

Mole NP ja ympäristö, yht. 6.

Black-headed Weaver*Ploceus melanocephalus*

Mole NP, 1/.

Black-necked Weaver*Ploceus nigricollis*

Kakum NP:n ympäristö, yht. 12.

Maxwell's Black Weaver*Ploceus albinucha*

Bobiri forest, Atewa forest ym. yht. 33.

Vieillot's Black Weaver*Ploceus nigerrimus*

Monin paikoin yleinen ja runsaslukuinen, erityisesti Hans Cottage Botelin lampi, jossa noin 200.

Preuss's Weaver*Ploceus preussi*

Kakum NP, Aboabo, 5 ja Bobiri forest, 2.

Yellow-mated Weaver*Ploceus tricolor*

Havaitsimme lajin neljänä päivänä metsäisillä alueilla, Kakum, Bobiri, Atewa, yht. 16 yksilöä.

Red-headed Quelea*Quelea erythrops*

Kakum NP:n sivutie: yksinäinen lintu istui pensaassa latvassa.

Crested Malimbe*Malimbus malimbicus*

Kakum NP, Aboabo, 1 ja Bobiri forest, 3.

Blue-billed Malimbe*Malimbus nitens*

Kakum NP:n sivutie, Ä2, Opuro forest, 1Ä, Atewa, 2.

Red-headed Malimbe*Malimbus rubricollis*

Kakum NP, yht. 13, Bobiri forest, 2.

Red-vented Malimbe*Malimbus scutatus*

Kakum NP, 4, Bobiri forest, 1.

Yellow-crowned Bishop*Euplectes afer*

Mole NP, 40.

Yellow-mantled Widowbird*Euplectes macroura*

Winneba plains, 10, Kakum NP:n ympäristö, 15.

Chestnut-breasted Nigrita*Nigrita bicolor*

Kakum NP, yht. 7.

Grey-headed Nigrita*Nigrita canicapillus*

Kakum NP, yht. 4, Bobiri forest, yht.3, Atewa, 1.

White-breasted Nigrita*Nigrita fusconotus*

Kakum NP, yht. 5.

Red-fronted Antpecker*Parmoptila rubrifrons*

Tämä vähälukuinen punamuurahaispeippo oli Opuro forestin yllätyslaji 18.4. – tosin kuulimme sen vain laulavan.

Black-bellied Seedcracker	<i>Pyrenestes ostrinus</i>
Kakum NP, Antiwikwaa, 1 ja Opuro forest, 1.	
Red-winged Pytilia	<i>Pytilia phoenicoptera</i>
Mole NP, kolmen linnun parvi puustoisella savannilla.	
Western Bluebill	<i>Spermophaga haematina</i>
Opuro forest, 1Ä – todella piilotteleva lauleskelija.	
Bar-breasted Firefinch	<i>Lagonosticta rufopicta</i>
Näimme tämän savanniruusupeipoksikin nimetyn linnun kolmena päivänä, yht. 37 yksilöä.	
Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegal</i>
Mole NP, yht. 22 yksilöä.	
Zebra Waxbill	<i>Amandava subflava</i>
White Voltan rantaniityillä näimme yhdeksän linnun parven.	
Lavender Waxbill	<i>Estrilda caerulescens</i>
Mole NP, yht. 4.	
Orange-cheeked Waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>
Kakum NP, 2 ja Mole NP, yht. 30.	
Black-rumped Waxbill	<i>Estrilda troglodytes</i>
Kakum NP, 1 ja Mole NP, yht. 3.	
Red-cheeked Cordon-bleu	<i>Uraeginthus bengalus</i>
Mole NP ja ympäristö, yht. 25.	
Black-and-white Mannikin	<i>Lonchura bicolor</i>
Kakum NP:ssa melko yleinen, muualla vain yksittäisiä lintuja harvakseltaan.	
Bronze Mannikin	<i>Lonchura cucullata</i>
Kakum NP:n liepeillä ja rannikolla, yht. 75.	
Maggie Mannikin	<i>Lonchura fringilloides</i>
Atewan majapaikkamme, Hotel Royal Beumlichin, pihassa yksi lintu.	
Black-faced Quailfinch	<i>Ortygospiza atricollis</i>
White Voltan rantaniityltä komppasimme ilmaan kolmen linnun parven – nimi on suomeksi muuten töpöpeippo.	
Wilson's Indigobird	<i>Vidua wilsoni</i>
Mole NP, yht. /3	
Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>
Kakum NP, 5 ja Mole NP, 10.	
Streaky-headed Seedeater	<i>Serinus gularis</i>
Mole NP, 1.	
Yellow-fronted Canary	<i>Serinus mozambica</i>
Mole NP, yht. 30.	
Brown-rumped Bunting	<i>Emberiza affinis</i>
Sinnikäs sirkkujahtimme tuotti vain kaksi yksilöä rusoperäsirkkuja Mole NP:ssa, mutta hyvä näinkin.	



Matkan nisäkkäitä ja muita eläinkunnan edustajia



Jari, Aulikki, Eki ja Juha raskaanpuoleisen Atewan metsäpolun suorittaneina.
Tässä muita lajeja sekalaisessa järjestyksessä:

Krokotiili

Mole NP, 10



African Elephant

Mole NP, 19.4. näimme 4, 20.4. samoilla paikoilla näimme 2 ja lähtiessämme Mole NP:sta oli tien tukkeena seitsemän norsun lauma

Pahkasika

Mole NP:ssa päiväsumat olivat 15, 20, 20 ja 10

Roan antilooppi

Mole NP, 27:n eläimen lauma

Kob antilooppi

Shai Hills, 48

Bushbock

Mole NP, 4

Red-flanked Duiker

Mole NP ja ympäristö, yht. 3



Mole National Park, elefanti ja pahkasika juomapaikan lähetyvillä.

Waterbuck

Mole NP, 40

Genetti

Mole NP, 1

Sivetti

Mole NP, 1

Olive Baboon

Shai Hills, 7, Mole NP, 1

Vervet Monkey

Mole NP:ssa näimme yhteensä 11.

Patas Monkey

Mole NP, 2

Galago (Bush-baby)

Kakum NP, pöllöretkellä kuulumme kahden ääntelevän

Slender-tailed Mungo

Kakum NP:n pohjoispuolella, 1

Striped Brown Squirrel

Mole NP, 4

Giant Wood Squirrel

Kakum NP, 1

Ghananleijuri

Anomalurus pelii

Tämän öisen liito-oravan näimme 14.4. Kakum NP:n ydinalueella, Tree Housen alla, ollessamme pöllöretkellä

Puutamaani

Kakum NP, pöllöretkellä kuulumme kolmen ääntelevän

Lisäksi näimme isoja oravia ja pieniä oravia, jonkinmoisia kaneja sekä ison lepakon.



Tällainen lisko oli hyvin yleinen Kakumin kansallispuistossa.



Pearl-spotted Owlet ja Yellow-fronted Canary, Mole NP. Alakuvassa Winding Cisticola, White Volta.

