



Pohjois-Intian lintu- ja luontomatka 5. – 21.2.2016

Ryhmä: Marja ja Lasse Hakkala, Eero Hietanen, Anna ja Leo Kuismin, Marita ja Hannu Maula

Matkanjohtaja Harri Taavetti / Kon-tiki

Paikallinen matkanjärjestäjä Vinod Goswami / Babita Tours sekä paikallisoppaita

5.-6.2.

Delhiin laskeuduimme aikataulussa n. klo 6.30 paikallista aikaa. Passien ja viisumien tarkistus sujui hyvin, joten suoriuduimme ulos hyvissä ajoin. Iloisesti hymyilevä paikallinen matkanjärjestäjämme Vinod oli meitä vastassa portilla ja ohjasti meidät parkkipaikalle pikkubussiamme odottelemaan. Intian ensimmäisen lajin titteli meni vähän tylsästi pululle, mutta heti perään pääsimme jo paikallisemman lajiston makuun intianvariksen (House Crow) sekä piha- ja intianmainojen (Common & Bank Myna) muodossa.

Aikaisesta aamusta huolimatta Delhin tiet ja kadut olivat jo täyttyneet autoista, rikshoista ja muista menopeleistä ja matkanteko oli todella hidasta. Varmaan pari tuntia kesti, ennen kuin pystyimme sanomaan olevamme ulkona Delhistä. Haarahaukkojen määrä taivaalla oli paikoin päätä huimaava.

Matkalla ylitimme kaksi intialaisille pyhää jokea: Yamunan ja Gangesin. Jonkun faktan mukaan noin 10 % koko maailman väestöstä elää Gangesin valuma-alueella. Kun katsoi ihmisten määrää teillä, sen saattoi helposti uskoa... Hieman ennen puoltapäivää saavuimme lounaspaikkaamme, hyvätasoiseen ja siistiin kadunvarsiravintolaan. Nautimme tyypillisen intialaisen lounaan, mihin kuului "dal" eli linssikeittoa, "palak paneer", eli pinaattia ja juustokuutioita, paria erilaista kasvismössöä ja riisiä sekä tietenkin naan-leipää. Kaikki olivat erinomaisen maukkaita.

Lounaan jälkeen jatkoimme vielä kolmisen tuntia, kunnes Ramnagarin kaupungin pohjoispuolella

pysähdyimme äkisti ja Vinod komensi meidät kävelylle kohti läheistä Kosi-joen uomaa. Tällä kohtaa jokiuomaa talvehtii kolme iibisnokkaa (Ibisbill), jotka olivat kohteinamme. Alhaalla joella tapasimme paikallisoppaamme Karanin. Hän oli ollut etsimässä lintuja jo hyvän tovin, siinä kuitenkin onnistumatta, eikä meidänkään sinnikäs jokiuoman skannailu tuottanut toivottua tulosta. Jotain sentään näkyi. Koska suurin osa porukkaa oli Intiassa ensimmäistä kertaa, uusia lajeja tipahteli tuon tuostakin, kuten joki- ja virtaleppälintu (Plumbeous & White-capped Water Redstart), jokihiippä (River Lapwing), mustavästäräkki (White-browed Wagtail) ja jaavanmerimetso (Little Cormorant).

Jatkoimme vielä reilun kymmenen kilometrin matkan majapaikkaamme The Deniin, minne saavuimme parahiksi ennen pimeää. Pihalla näimme vielä parvelliset aasianrillejä (Oriental White-eye) ja metsäpensastimaleita (Jungle Babbler). Nautimme kahvit ja teet jokiuomalle avautuvalla terassilla, missä näimme ensimmäiset aasiankeisarinkalastajat (Crested Kingfisher), joskin vähän huonosti. Marita ja Hannu kertoivat nähneensä mökkinsä katolla turkoosisiepon (Verditer Flycatcher).

Päivän lajimäärä matkustuspäiväksi kohtuullinen 54.

7.2.

Eipä aamuhämärissä pihalle könytessämme vielä arvattu, minkälainen päivä meitä odotti. Raitavarpuspöllö (Asian Barred Owlet) huuteli ja pian myös valkotöyhtötimalit (White-crested Laughingthrush) aloittivat mekastuksensa. Ennen aamiaista pihaa reunustavista puista hoksittiin vielä mm. kuvan rusovatsalehvi (Orange-bellied Leafbird) ja räikeänvärinen karmiinimedestäjäkoiras (Crimson Sunbird). Myös aroamerikotka (Pallas's Fish-eagle) suoritti komean ylilennon.

Aamiaisen jälkeen jatkoimme samaa tietä eteenpäin, jota pitkin edellisiltana saavuimme the Deniin. Pysähdyimme kohtaan, missä tien varrella oli tekojuja ym. ja aika paljon ihmisiä. Melkein heti bussista noustuamme huomasimme koiras himalajansatakielen (White-tailed Rubythroat) hyppivän tiellä kohdassa, missä pieni puro lirisii tien yli. Samalla kohdalla listamme jatkui mm. isokivikkorastasnaaraalla (Chestnut-bellied Rock-thrush), kuningassepällä (Great Barbet), hienosti poseeranneella ja koiras sinilakkisiepolla (Rufous-bellied Niltava).



Jatkoimme kävellen tietä eteenpäin katsellen koko ajan alas purouomaan. Yhdessä kohtaa alhaalla uoman pohjalla oli muun roskan seassa isohko pahvinpala, jossa luki Coca-cola. Se näytti olevan lintujen suosiossa, sillä pahvin alla ja vieressä todettiin mm. keltapittakerttunen (Chestnut-headed Tesia), pakistanintimaleita (Black-chinned Babbler), pitkäpyrstöräätäleitä (Common Tailorbird), savupriinioita (Grey-breasted Prinia),

sinipikkusieppo (Slaty-blue Flycatcher) ja aamun toinen himalajansatakieli.

Jätimme pahvinpalan taaksemme ja kävelimme eteenpäin. Ehkä sadan metrin päässä alkoi uusien Himalajan erikoisuuksien tykitys: lepnkäistimali (White-browed Shrike-babbler), himalajan-kirjotikka (Fulvous-breasted Woodpecker) ja muutama jora (Common Iora). Paikan kohdelaji oli kuitenkin pikkuhaarapyrstö (Little Forktail). Kauaa ei tarvinnut purorotkon pohjaa katsella, kun Karan jo ilmoitti löytäneensä linnun. Siellähän se touhusi, virtaleppälinnun tosin häiritessä sen askareita ajamalla sitä takaa useita kertoja.

Jatkoimme bussilla vielä pätkän matkaa eteenpäin, kunnes pysähdyimme pienen temppelin kohdalle. Siitä jatkoimme kävellen pientä polkua pitkin vielä vähän ylemmäs. Polun varressa näimme mm. useita tulipyrstömedestäjiä (Fire-tailed Sunbird) ja himalajankaijoja (Slaty-headed Parakeet) sekä kotoisen varpushaukan.

Temppeliltä palasimme takaisin päin ja pysähdyimme taas pikkuhaarapyrstöpaikalle. Tälläkin kertaa paikalla oli haarapyrstö, tosin laji oli vaihtunut pitsihaarapyrstöksi (Spotted Forktail). Jatkoimme vielä kävellen saman Coca-cola-pahvin luo, mistä nyt toisella yrittämällä löytyi paikan kohdelaji, töpötimali (Scaly-bellied Wren-babbler). Se esittäytyikin varsin mallikkaasti ja muutama ihan kelpo kuvakin (alla vas.) syntyi tästä pienestä, pyrstöttömästä, vilkkaasta ja erittäin kähmystä lajista.



Töpötimali ja sinilakkisieppo

Ei paikan anti suinkaan tähän vielä loppunut. Vajaan sadan metrin päässä tästä pääsimme katselemaan samoilta jalansijoilta sinilakkisieppoa, oranssivyösieppoa (Rufous-gorgeted Flycatcher) ja sinipikkusieppoa, sekä pisteenä iin päälle uutena lajina viirupriinia (Striated Prinia).

Jatkoimme takaisin The Deniä kohti. Emme päässeet taaskaan pitkälle, kun Karan pysäytti bussin. Jotain "flowerpeckeristä" mutisten hän meni ulos. Pian hän näyttikin hyvin pientä ja väritöntä lintua, että siinä on intiankukastaja (Pale-billed Flowerpecker). Emme kukaan oikein ymmärtäneet, miten hän oli huomannut linnun liikkuvasta bussista. Paikalla oli muutenkin hyvin lintuja. Kaulusvarpuspöllön äänen viheltely sai mm. himalajanpyrstötimalia (Rufous Sibia) säksättämään lähipuihin. Myös toinen kukastaja, harmaaviirukukastaja (Thick-billed



Flowerpwecker) löytyi samasta puusta.

Pitkin aamupäivää uhkaillut sadekin pääsi alkamaan, kun pääsimme takaisin The Deniin, mutta mitäpä siitä, kun menimme sisätiloihin lounaalle. Sitä nauttiessamme se ehti jo loppuakin. Ennen iltapäiväretkelle lähtöä kuittasimme mm. pihan yläpuolella pyörineet kymmenkunta pronssidrongoa (Bronzed Drongo).

Bussilla lähtömme jälkeen emme ehtineet pitkällekkään, kun jo pysähdyimme ja jatkoimme kävellen tietä eteenpäin. Silmä tarttui metsästä erottuvaan harmaaseen möykkyyn: villi aasiannorsu! Pian huomasimme, että niitä olikin kaksi. Toinen norsuista heitteli kärsällään pölyistä hiekkaa päälleen. Pian norsujen jälkeen kuulumme vielä aksiskauriiden varoittavan aktiivisesti metsässä ja Karan totesi, että todennäköisesti siellä oli tiikeri. Bussia alkoi olla vähän ikävä... Tulihan se lopulta ja jatkoimme muutaman kilometrin metsän ympäröimän pienen joen varrelle. Ennen kuin ehdimme edes pysähtyä, hoksasimme bussin ikkunasta ihan tien varressa langalla istuvan upean sulttaanikalastajan (Stork-billed Kingfisher), kuvassa. Kalastajaa ihmetellessämme Karan yhtäkkiä sanoi kuulleen isohelmitikan (Great-slaty Woodpecker) äänen. Menimme vähän kauemmas solisevalta puroilta ja pian kaikki kulimme tikan huutelevan korkealla latvustossa. Kun olimme saaneet paikallistettua äänen, tajusimme, että puussa ei ole vain yhtä tai kahta lintua, vaan viisi! Ei huono.



Tästä jouduimme kävelemään ainakin 50m ennen seuraavaa "tähtilajia". Se oli isonokkarastas (Long-billed Thrush), joka suorastaan nakkeli kiviä purouoman pohjalla. Kolina vain kuului ylös tielle. Jatkoimme kävellen jokiuomaa seurailevaa tietä pitkin ja pian hoksasimme päivän toisen pikkuhaara-pyrstön. Ja taas virtaleppälintu oli sitä kiusaamassa, senkin kiusanhenki. Myös komea aasiankeisarikalastaja istuskeli puron keskellä kivillä ja meikäläinen kuningaskalastajakin vilahti.

Iltapäivä oli jo pitkällä, joten palasimme takaisin majapaikkaamme, missä vielä katselimme pihapiirin lajistoa leppoisasti oluttuopin kera. Mustaotsanakkeli (Velvet-fronted Nuthatch) jatkoi vielä päivän komeaa lajilistaa.

Yhtään liioittelematta voinee sanoa päivän olleen yksi parhaista ikinä näillä Intian reissuilla. Myös Karanin ilme oli hämmästyneen muikea, hänkin oli päivään erittäin tyytyväinen.

Päivän lajimäärä 80, yhteislajimäärä 116.

8.2.

Tällä kertaa menimme jo hämärissä aamiaiselle, jotta ehtisimme tutkailla The Denin pihapiirin linnustoa ennen lähtöämme kohti Corbettin kansallispuistoa. Se kannatti, sillä uusia lajeja tipahteli taas useita, joista mainittakoon punanokkabulbuli (Black Bulbul) ja kultaniskatikka (Greater Yellowthroat).

Pihalla vaihdoimme bussin kahteen avojeeppiin (=Gypsy), joilla lähdimme muutaman kilometrin päässä sijaitsevalle Corbettin portille. Tosin matkamme tyssäsi hetkeksi jo noin sadan metrin päässä, missä ison puun latvus oli täynnä punarintakaijoja (Red-breasted Parakeet). Myös kaksi kultaotsalehviä (Golden-fronted Leafbird) huomattiin meluisten kaijojen joukosta.

Corbettin portilla odottelimme varttitunnin, kun oppaat hoitelivat paperitöitä ym. muodollisuuksia. Pieni ja vilkas, vaatimattoman värinen pikkukirjosiepponaaras (Little Pied Flycatcher) pyydysteli hyönteisiä reunapuskissa. Pian pääsimme portista sisään. Noin 30–40 km matka majapaikkaamme Dhikalaan kulkee rehevän metsän halki. Välillä Corbettin halki virtaava Ramganga-joki näkyi tielle ja pääsimme nauttimaan puistolle tyypillisestä maisemasta jokiuomineen ja sitä ympäröivine metsäisine kukkuloineen.



Matkalla tietysti pysähdeltiin useita kertoja lintuparvien kohdalla. Lintuparvista löytyi uusia lajeja toistensa perään, kuten siniminla (Blue-winged Minla/Siva), sympaattinen ja värikäs harlekiinipyrstötiainen (Black-throated Tit), kultasiipibulbuli (Ashy Bulbul), kastanja- ja huppukuhankeittäjä (Maroon & Black-hooded Oriole). Myös tikkoja näkyi useita lajeja, joista uusina aasian-töyhtötikka (Rufous Wood-pecker) ja useat isotulitöyhdöt (Himalayan Flameback). Komeimpia ja värikkäimpiä ilmestyksiä olivat

kuitenkin kolme viherharakkaa (Common Green Magpie), jotka tekivät kaikkensa pysyäksään piilossa oksistossa.

Lounaan nautimme matkan varrella puistonvartijoiden tukikohdassa. Varjoisan ja Gypsy-kyydissä yllättävän viileän metsän jälkeen oli mukava paistatella auringossa avoimella pihalla. Taivaalla soidintava ja kiljuva harjakotkapari (Crested Serpent Eagle) viihdytti meitä ennen matkan jatkumista. Myös turkoosi- ja kilkkuseppiä (Blue-fronted & Coppersmith Barbet) kiipeili pihaa ympäröivissä puissa.

Jatkoimme matkaa kohti Dhikalaa. Pian pysähdyimme kohdassa, mistä avautui avoin näköala alas Ramganga-joelle. Joen rantakivikossa lojui puolenkymmentä pitkänenäistä gaviaalia, ja pitkäkaulainen käärmeaula (Darter) jatkoi lintulistaamme. Tämän pikaisen pysähdyksen jälkeen meillä olikin kiire jo seuraavan kahden yön majapaikkaamme Dhikalaan. Pysähdyksenämme myös



siellä oli pikainen: oppaat ja henkilökunta hoitivat matkatavaramme yhteen huoneeseen ja matka jatkui taas.

Tällä kertaa suuntasimme alas jokiuomalle. Matkalla kuittasimme vakiopuussaan päivehtivän kalahuuhkajan (Brown Fish-owl). Jokiuomalta avautui luonnollisesti laaja näköala ja avoin taivas. Hieman ehkä yllättäen ainoa peto, mikä taivaalta huomattiin, oli vuorikotka (Bonelli's Eagle), joka kaarteli komeasti vastarannan metsäistä kukkulaa vasten.

Emme tyytyneet pelkästään jokiuomaan, vaan suuntasimme joen toiselle puolelle. Joen ylitys olikin mielenkiintoinen: joen keskiosan yli oli rakennettu puinen silta, jolle päästäkseen oli ensin ajettava pätäk virtaavassa vedessä. Itse silta oli vain matala, parrujen päällä oleva huteran oloinen rakennelma. Yli päästiin kuitenkin.



Koska virtaavaa vettä oli, oli myös joki- ja virtaleppälintuja, jotka poseerasivat kuvauksellisesti. Merimetsoja kalasteli varmaan satakunta. Myös sambar(hirvi) vasoinen (kuvassa) kahlaili matalassa jokivedessä. Toisella puolella siltaa, alavirran puolella melko kaukaa oli saukkolauma kalastamassa.

Joelta jatkoimme vastarannan metsikköön. Meno oli varsin määrätietoista, sillä Karanilla oli tavoitteena kohta, mistä avautuu laaja näköala yli avoimen jokiuoman. Paikka on hyvä havainnoida tiikeriä. Matkalla tien varressa patsasteli teräsfasaaneita (Kalij Pheasant) ja kesykanan kantaisiä punaviidakkokanoja (Red Junglefowl).

Kauriiden varoitteluja kuului alkuillan aikana useita kertoja, mutta tiikeri ei kuitenkaan suostunut näyttäytymään. Paluumatkalla melkoisen yllätyksen tarjosi tieltä lentoon pompannut ja lähipuuhun istumaan jäänyt harmaahuppurastas (Chestnut Thrush). Karanin mukaan laji on täällä melko kova rari. Palasimme takaisin puusillalle juuri auringon laskiessa. Kirjokalastaja (Pied Kingfisher) tuli leluttelemaan aivan yläpuolellemme ja saukkolauma kalasteli nyt melko lähellä. Laskevan auringon valossa tunnelma oli lähes satumainen. Matkan jälkeen osa reissulaisista äänesti kohdan "the place of the trip":ksi. Koska puistosta täytyy poistua auringonlaskuun mennessä, paluumatka majoitukseen sujuikin sitten varsin vauhdikkaasti.

Päivän lajimäärä 102, yhteislajimäärä 163.



Näkymä puusillalta. Paikka ja tunnelma äänestettiin yhdeksi matkan hienoimmista hetkistä.

9.2.

Oli vielä lähes pilkkopimeää, kun kokoonnuimme aamiaiselle. Se nautittiin ripeään tahtiin, sillä startti tiikerisafarille tapahtui heti auringon noustessa. Suuntasimme halki aamusumuisen maiseman samalle tielle kuin edellisiltana. Melko pian pysähdyimme odottelemaan kahden tien risteykseen. Läheisessä metsässä oli kuulemma tiikerin aiemmin tappama saalis ja oletus oli, että siellä on tiikeri saalistaan nauttimassa. Meidän perässä oli tulossa safarinorsu, joka pääsisi metsään saaliin luokse. Tovin odoteltuamme norsun jyhkeä hahmo ilmestyikin ja rauhallisesti tallustellen se ohitti meidät poiketakseen pian metsän puolelle. Seurasi jännittynyttä odottelua... Pian kuitenkin norsu ilmestyi takaisin tielle tyhjin käsin. Eipä ollut tiikeri nälkäinen tänä aamuna. Onneksi meille lintufriikeille riitti katseltavaa odotellessakin, mm. aroamerikotka laskeutui kuvauksellisesti kuolleen puun latvaan ihan viereen.

Luovutimme sillä erää tiikerin suhteen ja lähdimme ajelemaan jokivartta ylävirtaan seurailevaa tietä eteenpäin. Pysähdyimme kohdassa, jossa oli pieni kostea painanne. Karanin mukaan paikalla oli havaittu pikkutöpötimali. Soitimme atrappia, mutta tuloksetta. Samalla alkoi viherharakan ääntelyä kuulua läheisistä puista. Sitäkin yritimme atrapilla houkutella, tuloksetta. Hämärästi muistan, kuinka toinen jeeppi ajoi ohitsemme allekirjoittaneen soitellessa viherharakkaa kaiuttimien kädessä. Emme arvanneet, että tästä lyhyestä kohtaamisesta kuulisimme vielä...

Jatkoimme eteenpäin eiliselle puusillalle. Saukkoporukka oli taas kalassa ja sukelteli koskessa touhukkaana. Sillalta jatkoimme melko pitkästi joen vastarantaa seuraten kohti alavirtaa ja



patojärveä. Matkalla näimme mm. kalahuuhkajan, jalokotkan (Changeable Hawk-eagle), muuttohaukan ja paksunokkavariksen välisen kisailun, isokauluskaijan (Alexandrine Parakeet) ja intianvihertikkoja (Streak-throated Woodpecker). Yhdessä kohtaa kaukaa metsästä kuului samanaikaisesti isohelmitikan ja keisarisarvinokan (Great Hornbill) ääntelyä, mutta ne olivat liian kaukana näkyäkseen.


Viimein saavuimme määränpäähämme, patojärven penkalla olevalle puuttomalle niemekkeelle. Paikalta avautui hyvä näkyvyys järvelle, joka oli tosin kovaa kyytiä kuivumassa, sillä monsuunista alkoi olla jo aikaa. Rantapenkan kuvioista näki, että joskus vesi oli ollut varmaan toistakymmentä metriä korkeammalla. Rantalietteellä kölli kymmeniä krokotiileja ja gaviaaleja, joista yksi oli ihan järjettömän kokoinen pattinokka. Linnuista järvellä ja sen rantalietteillä oli mm. reippaasti haikaroita, jokitiiroja (River Tern), intianpaksujalka (Great Thick-knee) sekä useita kotoisia viklo- ja sorsalajeja. Rantapenkalla patsastelleet kaksi aasiansatulahaikaraa (Black-necked Stork) olivat komeaa katseltavaa.

Paluumatkalla poikkesimme taas tienpätkälle, jolla olimme piipahtaneet jo edellispäivänä. Huhun mukaan paikalla olisi nähty intianhuuhkaja, joka on Corbettissa hyvin harvinainen ja vaikeasti havaittava. Ajoimme hitaasti oksistoa tähyillen. Äkkiä eka jeepin kuski alkoi sohia ylös oikealle. Suureksi järkytykseksemme oksistosta meitä tuijotti takaisin valtavan kokoinen ja komea intianhuuhkaja (Spot-bellied Eagle Owl)!!! Lintu ei ollut moksiskaan, kun kuvasimme ja ihastelimme sitä antaumuksella. Karan sanoi myöhemmin, että lintu oli kuuteen vuoteen ensimmäinen intianhuuhkaja, jonka hän näki Corbettissa. Ja me olimme kuulemma kolmas porukka koko talvikaudella, joka onnistui linnun näkemään. Mikäpä siinä... Elis nasahti allekirjoittaneellekin.

Jätimme pöllön torkkumisoksalleen ja palailimme pikkuhiljaa takaisin Dhikalaa kohti, missä vietimme puolentoista tunnin leppoisan siestan ennen lounasta.

Lounaan jälkeen lähdimme koluamaan Dhikalan puoleista, patoallasta ympäröivää ruohotasankoa. Aamupäiväinen käyntikohteemme näkyi kaukana tasangon ja järven toisella puolella. Lintuosasto oli iltapäivän paisteessa hiljaisen sorttista, vain muutama aasiankiuru (Oriental Skylark) ja himalajankirvinen (Rosy Pipit) näkyi. Aksiskauriita laidunsi avoimella ruohokentällä isoja laumoja, seassa muutamia harvinaisia, mutta täällä tavallisia rytökauriita. Komeat, aikanaan märkään mutaan painautuneet tiikerin jäljet näimme myös.

Koska lintuja oli niukasti, niin eipä aikaakaan, kun huomasimme olevamme jälleen kerran samalla,



Dhikalasta ylävirtaan kulkevalla tiellä. Pysähdyimme joen penkalle, missä aromerikotka söi saalistaan uoman pohjalla vesirajassa. Myös mustahaikaroita koikkelehti rannalla.



Aasiankeisarikalastaja (kuvassa) järjesti hienon show:n leikuttelulla hetken edessämme.

Jatkoimme eteenpäin, kunnes yhtäkkiä kaksi kookasta hahmoa lensi tien yli: keisarisarvinokkia! Ne liitivät arvokkaasti kohti pientä metsäsaarekettä, jonne ne laskeutuivat samaan isoon puuhun. Kummasti niinkin isot linnut sinne katoavat, mutta kun tiesi niiden siellä olevan, pääsimme näkemään niiden komeat nokat.

Jatkoimme tyytyväisinä eteenpäin. Pian törmäsimme muutamaan jeeppiin, joissa näytti olevan

kiihtynyt tunnelma: alhaalla laaksossa oleva safarinorsuporukka oli hetkeä aiemmin nähnyt tiikerin, ja olipa yksi jeepeistäkin siinä onnistunut. Ja taas mentiin. Rytkytimme mahdotonta rallia taas takaisin samalle puusillalle ja sen yli vastarannan näköalapaikalle, mutta taas vedimme vesiperän. Norsu kyytiläisineen pyöri alhaalla pensaikossa, mutta mitään ei tapahtunut.

Ilta alkoi taas hämärtää, joten oli aika palata takaisin kohti Dhikalaa. Jokilaaksoa ylittäessämme huomasimme yksinäisen sarvinokan lentävän taivaalla. Se oli intiansarvinokka (Oriental Pied Hornbill)! Myös ruskosuokana (Brown Crake) juoksi etujeeppin editse. Jälkimmäisestä jeepeistäkin lintu onnistuttiin vilahdukselta näkemään. Taas matka Dhikalan portille sujui vauhdikkaasti.

Mutta portillapa odottikin yllätys: portin edessä nimittäin seisoj ryhmä miehiä, joista yksi oli selkeästi joku viranomainen ja kahdella vartijalla oli aseet olalla. He pysäyttivät meidän jeeppit, mutta muut päästettiin menemään. Pitkän hindinkielisen keskustelun jälkeen Karan tuli kertomaan allekirjoittaneelle, että minun pitää mennä näyttämään atrappikaiutintani ja puhelintani heille. Meistä oli kuulemma tehty valitus, että soittamme lintujen ääniä ja häiritsemme lintuja. No menin näyttämään heille niitä ja soitin malliksi viherharakan ääntä, jota siis aiemmin päivällä olin soitellut. Sitten minusta otettiin kuvia kaiutin kädessä, muka soittamassa. Yritin saada naamalleni mahdollisimman hämmästyneen ilmeen. Myöhemmin illalla minun piti allekirjoittaa "tunnustus", että olin soittanut atrappia, mutta en tiennyt sen olevan kiellettyä. Selvisi myös, että minulle oli määrätty 25000 rupian (265 Euroa) sakot, mutta se oli saatu "kohtuullistettua" 10000 rupiaan (135 Euroa). Myös kaiuttimen menetin rikoksentekovälineenä. Jälkeenpäin selvisi, että puiston säännöissä on kuin onkin pykälä, jossa sanotaan että "any noise is prohibited". Atrapin käyttö tulkittiin tässä tapauksessa "noise":ksi, vaikka se alun perin tarkoittanee auton torven tai koväänisen musiikin soittamista. Kävi myös ilmi, että valituksen oli tehnyt joku intialaisturisti, joka meidät siis ohitti viherharakkapaikalla, ja joka oli kuulemma aiemmin halunnut Karanin oppaakseen. Tämä oli ilmeisesti suivaantunut siitä, että Karan olikin varattuna meille, joten kosto oli suloinen. Karanin mukaan kaikki oppaat, joilla atrappivehkeet on, on soittanut niitä aina ilman



mitään käsitystä, että se ei olisikaan sallittua. Mielenkiintoinen keissi kaiken kaikkiaan! Taas tuli mieleen sanonta: Intia yllättää aina.

Päivän lajimäärä 99, yhteislajimäärä 189.

10.2.

Tänä aamuna pakkasimme laukut valmiiksi aamiaiselle lähtiessämme. Kun se oli nautittu, laukut nostettiin taas jeepeihin ja jätimme Dhikalan taaksemme. Suuntanamme oli Himalajan juurella sijaitseva Nainital. Paljon oli kuitenkin ohjelmassa ennen sinne ehtimistä.



Lähdimme aamusumun kietoessa meidät syleilynsä kohti eilistä ruohotasankoa. Linnustollisesti se oli taas varsin köyhä, joten dejavu –ilmiö koettiin jälleen: varmaan viidennen kerran Corbettissa olomme aikana könsimme samaa ylävirtaan vievää tietä. Jossain vaiheessa matkaa kuulumme taas viherharakan huutelua metsästä. Karanin kanssa hymyillen vilkaistiin toisiamme, että pitäisikö soittaa atrappia... Noh, vaikeaahan se olisi ollut ilman kaiutinta.

Emme juuri pysähdelleet matkalla portille. Pikkuviiridrongo (Lesser Racket-tailed Drongo)

kuitenkin huomattiin retkipinnaksi. Yhdessä kohtaa oli alue, missä vuorikalahuuhkajapariskunta usein päivehtii tielle näkyen, mutta tällä kertaa ei natsannut. Pian olimmekin takaisin portilla ja työnnyimme päätielle metelin, torvensoiton ja ihmispaljouden sekaan, kohti Ramnagaria. Kaikki ihmisen aiheuttama mekkala kuulosti kahta kauheammalle leppoisan hiljaisten Corbettin päivien jälkeen.

Palasimme Kosi-joelle iibisnokia yrittämään. Tällä kertaa menimme eräälle temppelille johtavalle sillalle, pari kilometriä ensimmäisen päivän paikasta alavirtaan. Haroimme jokea sillan molemmin puolin kiikareilla ja kaukoputkella, mutta iibisnokia ei vain näkynyt. Aikamme etsittyämme Karan käveli sillan toiseen päähän ja löysi kaksi lintua melkein heti kohdasta, joka ei näkynyt sillan alkupäähän. Vähän kaukana linnut olivat, mutta putkella ne näkyivät hyvin. Kuvia ei kuitenkaan syntynyt. Kotvan kuluttua myös kalliokiipijä (Wallcreeper) löytyi vastarannan rinteestä ja sitä katsellessamme toinen kalliokiipijä lepatti ylitsemme ja laskeutui samaan rinteeseen. Näkyvimmat linnut joella olivat kuitenkin jaavanmerimetsot ja silkkihaikarat, joita lenteli parvittain pitkin jokea. Myös intialaisia oli joessa ja sen rantakivikoilla paljon. Osa pesi pyykkiä, osa, lähinnä nuoret miehet kahlailivat ja jopa makoilivat suoraan Himalajalta virtaavassa vedessä. Myös sillalla oli, totta kai, paljon kansaa, matkalla temppelille ja takaisin. Myös pari lehmää aiheutti liikenneuhkan, kun ne eivät oikein mahtuneet meidän ja kaukoputkien jalkojen ohi.

Tyytyväisinä jatkoimme Ramnagarin kaupunkiin, missä heittäydyimme turisteiksi ja menimme matkamuistomyymälään. Ryhmäläisten tehdessä ostoksia kuskeilla oli kädet täynnä töitä: toisesta jeepestä oli puhjennut rengas ja se tyhjeni kovaa kyytiä. Ongelma ratkaistiin vaihtamalla jeeppi.



Myös toisesta autosta oli joku moottorin osa rikki. Se vaihdettiin paikan päällä. Pian olimme taas kaoottisen liikenteen seassa. Menimme Karanin omistamaan motelli/ravintolaan, missä nautimme maukkaan lounaan.

Lounaan jälkeen jatkoimme aiemmista reissuista poiketen jeepeillä kohti Nainitalia. Pysähdyimme kuitenkin heti kaupungin jälkeen Kosi-joen ylittävällä patosillalla. Merimetsojen määrä oli huikea ja myös ruostesorsia oli paljon – tarkkaan ottaen 240. Eero laski. Mieleenpainuvin kokemus paikalla oli kuitenkin, kun kuulemma ihan kansallisen television toimittajat tulivat ja haastattelivat muutamaa meistä. He kyselivät, mitä täällä teimme, mitä me ajattelimme Corbettista ja Ramnagarista ja millaisia lintuja olimme nähneet. Montakohan miljoonaa ihmistä meidät on televisioistaan nähnyt, mene ja tiedä.

Sitten pääsimme toden teolla matkalle kohti Nainitalia. Alkumatka oli tasaista viljelysseutua, mutta äkkiä tie sukelsi metsään ja alkoi nousta jyrkästi. Samalla se muuttui tietysti serpentiinimäisen mutkaiseksi. Myös ilma alkoi viiletä meidän noustessa ylöspäin. Maisemat muuttuivat jyrkemmiksi ja puusto havupuuvoittoisemmaksi. Mahtijalokotka (Mountain Hawk-eagle), muutama loistoharakka (Red-billed Blue Magpie) ja 200 retkipinnaa rikkonut himalajannärhi (Black-headed Jay) jäivät päällimmäisinä mieleen matkalla nähdyistä linnuista. Olimme perillä Nainitalin kaupungin reunalla sijaitsevassa varsin hienossa hotellissamme hyvissä ajoin ennen pimeää.

Päivän lajimäärä 75, yhteislajimäärä 201.

11.2.

Aamulla starttasimme jo klo 5.30 säkkipimeässä taivuttelemaan kapeita ja mutkaisia, oletettavasti korkeiden jyrkänteiden reunalla kulkevia teitä vielä ylemmäs kohti Himalajaa ja Pangotin aluetta. Itätaivaan valjettua Himalajan huiput piirtyivät jylhän tummina horisontissa. Määränpäähämme, lähes puuttomalle, kulottunutta heinää kasvavalle vuorenrinteelle saavuimme juuri auringon noustessa. Paikka tunnetaan epävirallisesti nimellä Cheer Pheasant Overlook, eli harmaafasaanin katselupaikka. Ja se oli kohteena meilläkin. Pitkään skannasimme rinteitä ilman tulosta. Pari muutakin porukkaa oli samalla asialla, joten rinteet tulivat varmasti syynättyä varsin tarkkaan. Parvi himalajanrautiaisia (Altai Accentor) näkyi pikaisesti ja kalliopääskyjä lenteli taivaalla. Myös muutama vuohieläimiin kuuluva (himalajan)goraali (Goral) mutusti heinää rinteillä. ”Koska syödään” –kyselyt alkoivat olla jo sen verran ponnekkaita, että jatkoimme eteenpäin löytääksemme aurinkoisen kohdan, missä nauttia piknik-aamiainen.

Emme kuitenkaan malttaneet olla kokonaan pysähtelemättä upeissa, paksua naavaa kasvavissa, kunnon peikkometsää muistuttavissa rinnemetsissä, ja se kannatti! Pysähdyimme pienen aukon reunaan, minne jo yksi brittiryhmä oli ehtinyt meitä ennen. Karan käveli aukon vastakkaiseen reunaan jyrkemmän rinteiden reunalle ja alkoi heti ääneti huihoa meitä tulemaan. Juoksimme alkumatkan ja hiivimme loppumatkan jyrkänteelle. Komea töyhtöfasaanikoira (Koklass Pheasant) hiippaili rinteessä! Montaa sekuntia se ei osakseen saamaansa huomiota kestänyt, vaan ponkaisi lentoon metsäisen rotkon yli vastakkaiselle rinteelle. Siellä se näkyi vielä pikaisesti. Taas oli yksi Himalajan tähtilajeista nähtynä! Vaikka olisihan sitä pidempäänkin raaskinut katsella, ja vaikka kuvatakin oheista rupista dokumenttia paremmin. Elis tuli kuitenkin koko porukalle. Lajilla on hyvin suppea ja kapea levinneisyys Himalajan keski- ja länsiosien rinteillä. Mutta parastahan tietysti



oli se, että brittiryhmä puuskutti paikalle vasta, kun fasaani oli jo häipäissyt...

Nyt maistui myöhäiseksi venähtänyt aamiainen, kun vielä auringon lämmittävä kohtakin löytyi. Punarinta- ja himalajan-kaijaparvia viuhtoi matalalla tien yli hurjaa vauhtia. Näimme aamun mittaan useita rinteitä seuraavia parvia, jotka vaikuttivat vain sinkoilevan rinteitä seurailen edestakaisin. Aamiaispaikalta teimme pienen kävelylenkin kapeaa polkua pitkin. Himalajan lumihuiput näkyivät paikoin komeasti. Linnuista polun varrella näkyi (himalajan)sinipyrstönaaras.

Ehdottomasti aamiaispaikan paras laji oli kuitenkin korkealla ylitsemme liukunut rosvokotka (Black Eagle).



Jatkoimme pientä, rinteitä seurailevaa tietä aina vaan eteenpäin, kunnes saavuimme avoimemmalle kohdalle, missä oli myös pieniä peltotilkkuja. Peltojen ja tien reunapuskissa oli ihan mukavasti lintuja, kuten vuori- ja mustakurkkusirkkuja (Rock & White-capped Bunting), kanelivarpusia (Russet Sparrow), aasianvihervarpusia (Yellow-breasted Greenfinch), pikkunaurutimaleita (Streaked Laughingthrush), louhikkorautiaisia (Rufous-breasted Accentor) sekä kivikko- ja louhikkoleppälintuja (Blue-capped & Blue-fronted Redstart). Muiden kävellessä autolle jääneet Lasse ja Marja näkivät lisäksi mustakurkkurautiaisen (Black-throated Accentor). Taivaalla lenteli useita himalajan- ja hanhikorppikotkia (Himalayan & Griffon Vulture).

Nyt oli aika palaila takaisin päin. Pysähdyimme vielä harmaafasaanipaikalla, mutta onni ei ollut myötä nytkään. Kaikkea ei vain voi nähdä. Sukelsimme taas naavametsään, missä pääsimme ihmettelemään himalajankäpy- ja liekiniskatikkaa (Himalayan & Brown-fronted Woodpecker) samassa puussa.

Meille oli tuotu hotellista lämmin lounas seuraavaan pikkukylään ja nautimme sen tien varressa kylän reunalla. Paikallinen koiruuskin olisi selvästi halunnut osansa. Marja ja Anna käyttivät tilaisuutta hyväkseen ja hyppäsivät "ruoka-autoon", joka palasi takaisin hotellille. Me enemmän lintuhullut jatkoimme retkeilyä kävelemällä pätjän lounaspaikalta lähtevää sivutietä pitkin. Tien varrelta löytyi muutama viirunaurutimali (Sriated Laughingthrush) ja himalajanpunavarpunen (Pink-browed Rosefinch). Myös hiirihaukka lenteli laaksossa ja istuskeli puiden latvoissa.

Jatkoimme paluumatkaamme Pangotin kylään, missä menimme paikallisen majoitusyrittäjän (Jungle Lore) pihalle nauttimaan kahvit ja teet. Ne eivät toki vierailumme päätarkoitukset olleet, vaan rehevän pihapiirin linnut. Ihmettelimme yhden henkilökuntaan kuuluvan miehen edesottamuksia: hän haahuili pitkin pihapiiriä koko ajan erikoisesti älähdellen. Mikäköhän raukkaparkaa mahtaa vaivata... Pian kuitenkin selvisi, että käytöksellä oli vissi tarkoitus. Linnut oli pitkän ajan kuluessa opetettu siihen, että kun "kutsuhuuto", eli tässä tapauksessa älähtely, kuuluu, on ruokaa tarjolla. Pian alkoi pihan reunapuskista kuulua himalajannaurutimaleiden (White-throated Laughingthrush)



ääntelyä, ja samalla mies alkoi viskellä siemeniä pihanurmikolle. Eipä aikaakaan, kun pihalla kuhisi parikymmentä himalajannaurutimalia, muutama kultasiipitimali (Chestnut-crowned Laughingthrush), useita himalajannärhiä ja jopa pari loistoharakkaa. Ja kaikkia näitä pääsimme katselemaan ja kuvaamaan ravintolan terassilta kahvikuppi kädessä! Jokseenkin leppoisaa.



Himalajannärhi ja kultasiipitimali Jungle Loren pihassa

Jungle Lorelta jatkoimme vielä pientä, mutkaista, alas laaksoon johtavaa tietä, missä teimme kävelylenkin pienellä jokiuomalla. Pääkohteenamme ollut kultasinipyrstö (Golden Bush-robin) ei löytynyt, mutta tähän saakka vain kuultu raitavarpuspöllö päästiin täällä myös näkemään. Iltapäivä alkoi olla jo pitkällä, joten pistimme päivän pulkkaan ja palasimme mutkaista tietä takaisin hotelliin.

Päivän lajimäärä 68, yhteislajimäärä 229.

12.2.

Aamiaisen jälkeen hyppäsimme taas autoihimme ja siirryimme tällä kertaa vain muutaman kilometrin matkan kaupungin reunalle. Siellä oli eräänlainen leirintäalue telttapaikkoineen rehevässä metsälaaksossa. Paikan kohdelaji oli viidakkopyy (Hill Partridge). Kävelimme laakson pohjaa kulkevaa polkua tarkasti kuunnellen, josko pyyt olisivat maisemissa. Karan käveli ensimmäisenä. Pienen penkan päällä Karan yhtäkkiä huudahti "Leopard!!!" Valitettavasti eläin oli niin nopea, että kukaan meistä ei ehtinyt sitä nähdä. Penkalta avautui eteenpäin pieni avoin kenttä, jonka reunalla leopardi oli ollut ja hypännyt saman tien tiheään aluskasvillisuuden sekaan meidät havaittuaan. Hetken yritimme katsella rinnettä kentältä käsin, mutta pedosta ei näkynyt enää merkkiäkään. Hieman myöhemmin muutaman kymmenen metrin päässä metsärinteestä kuulunut rapina sai vähän pulssin nousemaan, mutta rapisija osoittautui muntjakiksi. Saimmepa jännityksestä kuitenkin vähän lämmikettä, maa oli nimittäin kylmän yön jäljiltä kuurassa. Yritimme vihellellä viidakkopyyntä kutsuääntä ja pian yksi yksilö vastasikin rinteestä, jonne leopardi oli juuri kadonnut. Paluumatkalla onnistuimme näkemäänkin yhden linnun, joskin varsin pikaisesti.



Leirintäalueelta jatkoimme taas muutaman kilometrin, kunnes pysähdyimme tien varressa olevalle paikalle, missä oli runsaasti hevosia varten kyhättyjä eläinsuojia. Paikalla oli kymmeniä hevosia ja niitä hoitavia miehiä. Osaa hevosista satuloitiin. Paikalta lähti kivetty tieura seurailemaan jyrkkää rinnettä, jota pitkin järjestettiin ohjattuja ratsastusretkiä. Me kävelimme pätjän tieuraa ihan ilman hevosia. Kuten niin useasti ennenkin, viheltelimme kaulusvarpuspöllön ääntä muita lintuja houkutellaksemme. Naamiolelväkerttuja (Black-faced Warbler) ja harlekiinipyrstötiaisia tuli hätäilemään useita. Ja kuten muutamaan otteeseen jo edellispäivänä, myös oikea kaulusvarpuspöllö alkoi vastailla. Tällä kertaa pöllö myös näyttäytyi! Karanin mukaan se on varsin epätavallista päästä näkemään. Lajille tyypilliset niskapuolen "valesilmät" näkyivät hyvin pöllön käännellessä päätään.

"Hevostieltä" jatkoimmekin sitten autoilla reilumman pätjän laskeutuen koko ajan alaspäin. Seuraavan retkipaikan kohteena oli taas kultasinipyrstö. Kävelimme paikalle pienen kylän läpi johtavaa kapeaa kivettyä ja melko jyrkkää "katua" pitkin. Paikalliset asukkaat olivat arkisissa askareissaan, eivätkä juuri välittäneet "kotikatuaan" tallaavista turisteista. Mietimme, että harva turisti varmaan tällaisissa paikoissa pääsee käymään, vaikka Intiassa kävisikin, ja että tämä seikka on ehdottomasti yksi lintuharrastuksen tuomia etuja. Pian olimme perillä kultasinipyrstöpaikalla. Se oli pieni avoin peltotilkku, jota ympäröi tiheät pusikot. Louhikkorautiaisia ja pikkunaurutimaleita pyöri pusikissa, mutta kohdelajia ei löytynyt. Kunnes se yhtäkkiä pomppi pienen penkan juurella – koiras kultasinipyrstö! Ainakaan Grimmettin kirja ei tuo lajille oikeutta ollenkaan, niin korean kirjkaan keltaisen ja mustan kirjava lintu on! Pääsimme katselemaan ja kuvaamaan sen touhuja muutaman minuutin ajan, kunnes se lennähti yhden ison puskan taakse ja katosi. Pois lähtiessä hoksasimme peltotilkun reuna-puskissa vielä yksinäisen ylänköuunilinnun (Tickell's Leaf Warbler). Olimme yhtä hymyä, kun lähdimme kävelemään takaisin alaspäin.



Seuraavan kohteen nimi oli Mangoli Valley. Pieni tie alas laaksoon lähti pienestä kylästä. Vinod kävi ostamassa pieniä friteerattuja kasvispalleroita, "samosa", ja tarjosi niitä myös meille. Maukkaita olivat, joskin kuumia. Tie kulki rehevän metsän halki. Myös rhodorendronit alkoivat kukkia ja komeita punakukkaisia puita oli useita. Pinnallinen lintuantti jäi kahteen vuoriviirubulbuliin (Mountain Bulbul). Taas kerran näimme himalajankäpytikan ja liekkinisatikan samassa puussa



koputtelemassa. Mahtaakohan lajit olla jotenkin symbioosissa keskenään? Alhaalla laaksossa oli viljelyksiä ja jopa muutamia kasvihuoneita, joissa kuulemma kasvatettiin kukkia, kuten neilikoita. Pieni joki virtasi laakson pohjalla ja joella oli usein havaittu liuskehaarapyrstöjä. Me kolusimme jokivartta melko tarkkaan, mutta onnistuimme löytämään vain pari pitsihaarapyrstöä. Ruskosuokanan erikoista, vaimeaa huutelua kuului useasta kohdasta. Pian automme tulivat noutamaan meidät laaksosta ja lähdimme kipuamaan takaisin Nainitaliin ja hotelliin lounaalle.

Lounaan jälkeen olikin vuorossa varinainen "luontoelämys". Menimme nimittäin Nainitalin kaatopaikalle. Täällä kaatopaikka on järjestetty siten, että se sijaitsee jyrkän ja syvän rotkon pohjalla, minne jätteet kipataan rinnettä seuraavalta tieltä. Eli itse kaatopaikalle meidän ei tarvinnut mennä, vaan katselimme kaatopaikan ylle kippauspaikan kohdalta tieltä. Jo autosta näimme kymmeniä arokotkia pyörimässä rinteen yllä mukavasti kuvaushollilla. Kuvasimme ja katselimme varmaan tunnin eri-ikäisiä ja -pukuisia arokotkia niiden pyöriessä välillä hyvinkin lähellä. Ja kamerat raksuttivat.



Kaatopaikalta palasimme takaisin kaupunkiin, missä vietimme loppupäivän. Tutustuimme mm. paikalliseen alkoon, joka oli kuin pieni kaltereilla varustettu kioskin luukku, josta haluamansa tuotteen sai tilata.

Osittaisen turistipäivän lajimäärä 51, ja kokonaislajimäärä 234.

13.2.

Aamulla teimme pre-breakfast käynnin Nainitalin lähellä sijaitsevalle näköalapaikalle, mistä avautui komea näkymä Himalajan lumihuipuille. Tähtäsimme paikalle auringon nousulle, jolloin vuoret värjäytyvät kauniin punertaviksi. Valitettavasti sää oli hieman utuinen, mutta huiput, mukaan lukien Intian korkein vuorenhuippu, yli 7800 m korkea Nanda Devi, näkyivät kuitenkin hyvin. Maisemien kuvaaminen oli vähällä unohtua, kun kaksi kauniin värikästä ja tuuheahäntäistä keltakurkkunäätä ilmestyi kiipeilemään lähipuihin. Myös pari viidakkopyytä rapisteli metsän pohjalla, mutta taaskaan ne eivät kunnolla antautuneet näytille.

Aamiaisen jälkeen seurasimme, kuinka isot laukkumme sullottiin pieneen henkilöautoon, joka lähetettiin Delhin kautta Agraan. Ne olisivat odottelemassa meitä Agran asemalla reilun vuorokauden kuluttua seuraavana päivänä, kun saapuisimme junalla sinne, eikä meidän näin ollen tarvinnut haalata laukkujamme mukana yöjunassa. Totesimme olevan kerrassaan loistava järjestely.



Jälleennäkemisen suuressa toivossa katsoimme, kun auto laukkuineen katosi nurkan taakse.

Me sen sijaan jakaannuimme taas kahteen tila-autoon, jätimme Nainitalin taaksemme ja lähdimme alaspäin kohti Sattalia. Pysähdyimme jyrkän laakson varrelle ja kävelimme alas uoman pohjalle johtavaa polkua. Uoman rinteet suorastaan kuhisivat lintuja. Uutena lajina pääsimme ihastelemaan tulirintatimaleita (Red-billed Leiothrix), joka oli Eerolle erityisen tärkeä laji. Hän oli ruokkinut kauan sitten häkki-leiothrixia Heinolan lintutarhalla ja nyt oli mukava nähdä vanhojen ystävien viljelemiä lajikumppaneita. Myös pikaisesti nähty, mutta paremmin kuultu viiksijuhina (Whiskered Yuhina), pari harjalintua ja taivaalla pyörineet muutamat ruostepääskyt pidensivät lajilistaamme.

Jatkoimme edelleen alaspäin yhdelle Sattalin (=seitsemän järveä) järvistä. Järveltä lähti rehevän ja metsäisen laakson pohjaa seuraava polku, jota kävelimme ehkä kilsan verran. Polku seuraili pienen puron vartta, jonka varrella oli mukavasti lintuja. Retken toinen töpötimali näkyi pikaisesti, mutta toinen, kovempi töpötimalilaji, pikkutöpötimali (Pygmy Wren-babbler), suostui vain vastaamaan muutaman kerran atrappiin. Onneksi isompi ja värikkäämpi retkipinna, oranssikurkkutimali (Rufous-chinned Laughingthrush) näkyi paremmin, kun kaksi lintua kuopsutti kariketta laakson rinteellä. Myös lisää tulirintatimaleita nähtiin parvikaupalla.

Tämän päivän lounas tarjosi mukavan ja tervetulleen, länsimaisen yllätyksen. Tienvarsiravintolan listalta nimittäin löytyi intialaisen ruuan lisäksi pastaa ja pitsaa! Mehän tilasimme niitä molempia. Lisäksi lounas saatiin nauttia aurinkoisilla ulkopöydillä, samalla ylhäältä vuorenhuipulta alas laaksoon kieppuvia riippuliitäjä ihmetellen.

Lounaan jälkeen matka jatkui edelleen alaspäin. Ja jälleen kerran pysähdyimme uuden, metsäisen jokilaakson varrella. Joen ylle kaartuvien puiden oksilla ruokaili muutamia komeita, kuukkelin kokoisia viirunaurutimaleita. Huomattavasti pienempi oli retkipinnaksi saatu, käsittämättömän pieni tikkalaji, täplävatsoikkonen (Speckled Piculet), joka näyttäytyi pikaisesti. Kävelimme tieltä pieneen kylään johtavaa polkua pitkin ja taas pääsimme tutustumaan lähietäisyydeltä paikalliseen arkiseen elämänmenoon. Yllätyksiltä ei välttytty nytkään. Yhtäkkiä huomasimme pellon ja metsän rajassa maassa hyppivän kultasinipyrstökoiraan! Karanin mukaan paikka oli uusi, eikä niitä kovin montaa kuulemma alueella ollut. Mukava sponde!

Kolusimme jokivartta vielä useammasta kohtaa, mutta tavoittelajia, liuskehaarapyrstöä ei kuitenkaan löytynyt. Aasiankoskikara (Brown Dipper) ja aasiankeisarikalastaja kuitenkin nähtiin. Samalla Marja ja Anna ehtivät livahtaa pieneen ravintolaan nauttimaan pienet rommitotit!

Kello alkoi olla jo niin paljon, että meidän oli pakko lähteä kulkeutumaan kohti Kathgodamin kaupunkia ja rautatieasemaa. Matkaa tehtiin hitaasti ja varmasti ainakin sata autoa ohitti meidät ankarasti tööttäillen. Myöhemmin selvisi, että Karan yritti kaikkensa himalajanhaukkasen löytämiseksi, joka meillä vielä puuttui. Muuttohaukka oli kuitenkin ainoa petolintu, joka autosta huomattiin puun latvassa istumassa.

Kathgodamissa nautitun kevyen päivällisen jälkeen oli aika hyvästellä Karan. Hän oli tehnyt uskomattoman hyvää ja ammattimaista työtä lintujen löytämisessä ja ryhmän opastamisessa. Kun työtään tekee sydämellä, sen kyllä huomaa.

Retkipinnamittari näytti 244:ä meidän hypäessä yöjunaan kohti Delhiä ja jättäessä Himalajan vuorenhuiput, naavaiset vuoristometsät, kukkulat ja laaksot taaksemme. Päivänpinnoja kertyi 83.



14.2.

Juna oli Old Delhin asemalla aikataulussaan aamuneljän maissa. Ilma tuntui pohjoisen jälkeen lämpimältä, vaikka paikallisten mielestä aamuyön kosteus ei varmasti lämmin ollutkaan. Siirryimme bussilla New Delhin asemalle, missä odottelimme reilun tunnin Agran-junaa.

Usvaisen aamun valkeneminen paljasti ohikiitävän tasaisen, muutamien rakennusten ja puiden täplittämän peltomaiseman. Intianvaristen ja lehmähaikaroiden parvet lentelivät ja ne, jotka olivat nenä kiinni ikkunassa, näkivät jopa reissun ensimmäiset saruskurjet (Sarus Crane) jo junan ikkunasta.

Agrassa olimme aamukahdeksan maissa. Asemalla kävi ilmi, että bussimme ei ollut päässyt asemalle kaupungissa järjestetyn maratonkilpailun vuoksi. Kilpailun myötä mm. asemalle johtava päätie oli suljettu liikenteeltä ja bussi oli joutunut jäämään useamman kilometrin päähän. Vinod järjesti asian niin, että hän hommasi meille puolenkymmentä pyörärikshaa, joilla lähdimme tunkemaan läpi kaoottisen kaupungin. Tämä järjestely tarjosi meille kirjaimellisesti Intiaa kaikille aisteille. Ihmisten määrä, erilaisten eläinten ja mitä ihmeellisimpien kulkuneuvojen kirjo teillä, torvien ym. meteli ja viemäreiden haju oli kerta kaikkiaan huumaaava ärsyketykitys. Olipahan taas elämys, jota ei ihan joka turisti pääse kokemaan. Pian kuitenkin istuimme pikkubussissa matkalla kohti Chambal Safari Lodgea, ja matkatavarammekin näkyivät pilkistävän takaikkunasta.

Ajo majapaikkaamme kesti puolisentoista tuntia, vaikka matka itsessään ei kovin pitkä ollutkaan. Tie oli paikoin todella huonossa kunnossa ja matka taittui kävelyvauhtia. Aasiankalastajia (White-breasted Kingfisher), mustadrongoja (Black Drongo), liitohaukkoja (Black-shouldered Kite) ja intiansininärhiä (Indian Roller) näkyi ikkunasta tuon tuostakin.

Perillä meitä odotti todella viihtyisät, metsän ympäröimässä pihapiirissä oleva ravintolarakennus sekä metsään ripotellut bungalowi-tyyppiset majamme. Vietimme parin tunnin siestan, mikä oli varsin tervetullut yön matkustamisen jälkeen.

Erittäin maukas lounas nautittiin leppoisassa, lähes helteisessä säässä ulkopöydissä. Intiantokot (Indian Grey Hornbill), purppuramedestäjä (Purple Sunbird), variskäki (Asian Koel) ja rusohuppuseppä (Brown-headed Barbet) jatkoivat lajilistaamme lounasta nauttiessamme. Lounaan jälkeen teimme paikallisoppaan Gaj:n johdolla pitkähköän kävelyreissun lodgen pihapiirissä ja ympäröivillä pelloilla. Heti muutaman kymmenen metrin säteellä pihametsässä päivehti useampia brahmanpöllöjä (Spotted Owlet) sekä yksi haukkapöllö (Brown Hawk-owl). Koska olimme siirtyneet kokonaan uudenlaiseen ympäristöön, kävelyreissulla nähtyjen uusien lajien määrä oli melkoinen. Lintujen lisäksi pääsimme näkemään myös suokissan (Jungle Cat), joka lymysi pitkässä heinikossa.

Päivän lajimäärä 93, vaikka retkeilyä oli käytännössä vain iltapäivällä. Yhteislajimäärä nyt jo 279.

15.2.

Auringon noustessa oli aamiainen nautittuna ja teimme jo matkaa kohti Chambalin alueen laajoja peltoalueita. Kesken peltolakeuksien maisema muuttui äkisti kuivaksi ja erikoisten hiekkamuodostelmien hallitsemaksi. Hiekkakumpujen päällä oli vanhojen linnoitusten ja palatsien



raunioita. Niiden välissä oli piikkipensaita, joiden latvoissa heilui mm. pensastimaleita (Common Babbler). Pian edessämme oli Yamuna-joen uoma ja silta sen yli. Lintuja oli joella paljon, mutta uutena lajin taisi tulla vain mustajalkatylli (Kenthis Plover).


Joen jäätyä taakse maisema muuttui taas takaisin tasaisen vihreäksi pelloksi. Vehnä, sinappi ja sokeriruoko olivat yleisimmät viljellyt kasvit. Ajoimme melko pitkälle ennen seuraavaa pysähdystä. Ja se pysähdys tehtiin, kun bussin ikkunasta näkyivät reissun ensimmäiset kunnolla nähdyt saruskurjet. Oppaamme kehotti meitä kuitenkin jatkamaan eteenpäin, sillä kurkia näkyisi kuulemma vielä lisää ja paremmin. Ja oikeassahan hän oli. Muutamien kilometrien jälkeen pysähdyimme ja lähdimme kävelemään tietä pitkin. Lintuja alkoi näkyä. Savannikotka (Tawny Eagle) istui yhden voimajohtopylvään nokassa. Komea satulahaikara patsasteli tien varressa ja sen pesä oli jonkin matkan päässä puun latvassa. Pesässä möllötti yksi pörröinen poikanenkin. Ja saruskurkia oli pariskunnittain pelloilla siellä täällä.

Peltojen lisäksi kävimme parillakin kosteikolla, jotka suorastaan kuhisivat lintuja. Sulttaanikanoja (Purple Swampfen) oli kymmeniä, samoin pikku-uikkuja. Sorsia oli monilajisesti, mm. täplänokkasorsia (Spot-billed Duck) ja useimmat kotoiset Anakset, ruskosotkia (Ferruginous Duck) ja punapäänarskuja (Red-crested Pochard).

Saruskurkipari esitti komean soidintanssin lutakon reunalla. Taivaalla pyörinyt vuorikotkapari ei oikein sopinut tasaisen lättänään maisemaan. Kosteikko sijaitsi pienen kyläpahasen reunalla, ja varmaan joka ikinen asukas kerääntyi taaksemme meitä ihmettelemään.

Seuraava pysähdys oli varsin vilkasliikenteisen tien varrella. Viereisellä pellolla oli toistakymmentä saruskurkea. Koko päivän aikana laskimme nähneemme kaikkiaan komeat 43 lintua! Kurkien lisäksi pellolla oli mm. suohyyppiä (White-tailed Lapwing). Taivaalla pyöri useita petoja, joista määritettiin niin "intiankiljukotka" kuin tavallisia kiljukotkiakin (Indian & Greater Spotted Eagle). Ainakin allekirjoittaneella meinasi pärähtää hermot kokonaan ihmisiin, lähinnä moottoripyörillä ajaneisiin miehiin, jotka järkiään kaikki pysähtyivät meitä tuijottamaan. Siinä ne vain katsoa mollottivat meitä vajeamielisen näköisinä. Noh, saivatpahan jotain sisältöä elämäänsä...

Täältä oli aika palata takaisinpäin, ja taas ajelimme pitkän patkan kohti Chambal-jokea.





Matkalle osui parikin todella vilkasta kylää, joiden läpi oli puskeuttava. Välillä ihmisten ja kaikenlaisten pyörillä liikkuvien vekottimien määrä oli lähes epätodellinen. Viimein pääsimme kuitenkin läpi ja Chambal-joki alkoi siintää hiekkaisen maiseman keskeltä. Pieni ura johti ihan jokivarteen saakka, missä meitä odotti pieni katos, kaksi venettä, ja mikä tärkeintä – lounas. Vinod keräsi taas pisteet kotiin taikomalla jostain esiin muutaman oluttölkin.

Lounaan jälkeen hieroimme vielä lisää aurinkorasvaa itseemme ja nousimme kahteen pieneen moottoriveneeseen. Lähdimme päristelemään pikkuhiljaa ylävirtaan päin. Rannalle hylätyillä isoilla ponttooneilla kyttäsi yksinäinen pieni kyyryhaikara (Striated / Little Heron). Vesilintuja näkyi mukavasti, mm. kymmeniä tiibetinhanhia (Bar-headed Goose), intianviheltäjäsorsia (Lesser Whistling-duck) ja punapäänarskuja. Myös kapustahaikaraparvi (Eurasian Spoonbill) siivilöi evästä rantavedestä. Uutena lajina näimme muutamia maailmanlaajuisesti uhanalaisia mustavatsatiiroja (Black-bellied Tern). Myös kotoisia kuoveja istuskeli hietikolla pari kappaletta. Lintujen lisäksi rannoilla lötkötti useita gaviaaleja ja krokotiileja. Myös isoja intianläppäpehmeäkilpikonnia (tämä todellakin on lajin suomenkielinen nimi) paistatteli auringossa.

Nisäkkäistä ”kovin” oli kuitenkin gangesinjokidelfiini, joita näimme kaksi. Odottelimme tovin alueella, jolla niitä tiedettiin olevan, ja lopulta pääsimme näkemään muutamia kertoja, kun ne hyppäsivät pinnalla. Lajin maailmankanta arvioidaan tällä hetkellä vain 1200–1800 yksilön suuruiseksi ja se on lisäksi jakautunut patojen seurauksena useisiin eristäytyneisiin ryhmiin. Eli erittäin uhanalaisesta lajista on kyse.

Lintupuolelta Chambal-joen tähtilajia, intiansaksinokkaa, emme sen sijaan onnistuneet näkemään. Joella ei tänä talvena talvehtinut montaakaan yksilöä ja ne kuulemma liikkuvat laajalla alueella. Tästä huolimatta päivän lajimäärä oli selvästi retken korkein 133. Gaj:n mukaan se on yksi hänen suurimmista lajimääristä koskaan yhden retkipäivän aikana. Retken yhteislajimääräkin heilahti reilusti yli kolmensadan, aina 317:än saakka. Illalla päivällisen jälkeen meidät vielä kutsuttiin pihalle, missä pari sivettikissoihin kuuluvaa musankia kiipeili pihapuissa taskulamppujen valossa.

16.2.

Tämä päivä olikin sitten ihan turistipäivä. Palasimme Chambalilta Agraan, missä vierailimme mykistävän upeassa Taj Mahalissa. Opas kertoi kattavasti tämän valkomarmorisen mausoleumin historiasta. Oppaan osaaminen ei vain Taj Mahalin esittelyyn rajoittunut, vaan hänellä oli tällaiselle lintuhullulle porukalle ässä hihassaan – harmaahuuhkajan (Dusky Eagle Owl) pesä Taj Mahalin vieressä! Eli retkipinna saatiin kulttuuriin tutustuessakin.

Jatkoimme luksustasaisen lounaan jälkeen toiselle monumentille, Fatehpur Sikrille. Tämäkin paikka on ainutlaatuinen ja hieno, täynnä historiaa, mutta täysin erilainen kuin Taj. Varsin antaumuksella oppaamme taas selosti kuningas Akbarin vaimoista ja heitä varten tehdyistä rakennuksista.

Seuraava kohteemme, Keoladeon kansallispuisto Bharatpurissa, sijaitsi vain parinkymmenen kilometrin päässä Fatehpur Sikristä, joten pääsimme pian majoittumaan puiston sisällä sijaitsevaan hotelliimme juuri ennen pimeän laskeutumista.

Jotain lintujakin kuitenkin nähtiin, päivän lajimäärä 59, kokonaislajimäärä 319.

17.2.

Aamiaisen jälkeen alkaneen kävelyretkemme ensimmäiset sadat metrit olivat taas melkoista ilotulitusta. Puiston portin vieressä sijaitsevassa varjoisessa montussa oli koko talven viihtynyt rubiinisatakieli (Siberian Rubythroat), jolla kuulemma oli tarkka aikataulu: se tulee paikalle aina siinä klo 9 tienoilla. Olimme paikalla kuitenkin jo ennen 8:a, mutta kas kummaa, lintu oli jo paikalla! Komea koiras esitteli rubiininpunaista kurkkuaan montun pohjalla pomppiessaan. Jatkoimme kohti varsinaista Keoladeon kosteikkoaluetta, minne oli vielä muutama sata metriä. Ennen sinne pääsyä olimme havainneet vielä neljä reissupinnaa lisää: oppaamme Rana tiesi sepelpöllösparin (Indian Scops-owl) päiväpensaan, ja siellähän ne torkkuivat, hyvin piilossa. Kaunis pikkuminivetti (Small Minivet) esittäytyi, kuten myös muutama kultasilmätimali (Yellow-eyed Babbler). Intiantulitöyhtö (Black-rumped Flameback / Lesser Goldenback) seuraili lajityypilliseen tapansa metsäpensastimaliparvea.



Viimein pääsimme itse vesialueiden äärelle. Saman tien alkoi paljastua, mistä Keoladeossa oikein oli kysymys: satoja lintuja oli yhtä aikaa näkösällä. Oli aasianiibis- (iso pesimäkolonia), rusko-, pikkujalo- ja silkkihaikaroita, pronssi-iibiksiä, sulttaanikanoja, intianviheltäjä-sorsia ja satoja muita sorsia, kiljukotkia ja vaikka mitä. Välillä tuntui, että ei tiedä mihin päin katsoa ja kameralla sohia. Myös erittäin piilotteleva mustapikkuhaikara (Black Bittern), kuvassa, onnistuttiin yhyttämään yhden pensaan alta.

Meno oli tietysti hidasta, emmekä päässeet pitkälle, kun kello näytti jo lounasta. Osa porukasta oli jo "karannut" takaisin hotellille ja pian maltoimme lähteä me loputkin. Takaisin kävellessä Rana äkkiä poikkesi tieuralta pensakkoon. Hän alkoi huitoa: "yes, we are lucky!" Pian tajusimme, että hänen edessään pötkötti kolme-nelimetrinen python! Taivastelimme sen valtavaa kokoa, kun se lähti liikkeelle. Se teki "U-käännöksen" ja ryömi oman häntänsä vierestä takaisin isoon piikkisian koloon, minne se katosi. "Rubiinisatakieliportin" ohi kävellessämme kurkkasimme montun pohjaa. Hämmästyks oli suuri, kun lintu ruokaili siellä edelleen! Vaikka paikka oli edelleen varjoisa ja hämärä, pääsimme kuitenkin kuvaamaan sitä selvästi paremmassa valossa kuin aamulla. Kyllä me



sinne lounaallekin lopulta selvittiin...

Lounaan jälkeen lähdimme pitkässä pyörärikshajonossa samaa tietä pitkin kuin aamupäivälläkin. Rikshoilla pääsimme kuitenkin vähän pidemmälle. Lintuja oli edelleen ihan tolkkuttomasti. Samoille jalansijoille näkyi mm. komeat savanni- ja kuvan keisarikotka (Tawny & Eastern Imperial Eagle). Muutenkin petoja pyöri runsaasti taivaalla. Muuta uutta lajistoa edustivat mm. pitkäpyrstöjassana (Pheasant-tailed Jacana), intianmerimetso (Indian Cormorant) ja pikkupääskykahlaaja (Small Pratincole).

Kertakaikkisen upea lintupäivä. Vaikka päivän lajimäärä 117 ei ennätykseen yltänytkään, yksilömäärältään lintumäärä oli ehdottomasti reissun suurin. Kokonaislajimäärä nyt 335.

18.2.

Aamulla ennen aamiaista teimme noin puolentoista tunnin kävelyretken hotellin lähiympäristöön. Heti aamuhämärissä kaksi viiriäistä viipotti tien yli puskiensa suojaan. Seuraavaksi siirryimme kookkaaseen, kosteapohjaiseen metsään. Metsän pohjalla, osittain pensaiden alla hyppeli piilotellen yksinäinen intianrastas (Tickell's Thrush). Vielä kolmaskin reissupinna kävelyretkellä saatiin tuhkadrongon (Ashy Drongo) istuskella ison puun latvassa. Kuvaajilla riitti töitä harjalintupariskunnan ja hienon ohilennon tehneen riikinkukkokoiraan kanssa. Yksi riikinkukko oli päättänyt maallisen vaelluksensa ilmeisesti hyeenan kynsiin ja jäljelle oli jäänyt vain valtava kasa värikkäitä höyheniä.

Aamiaisen jälkeen jätimme tämän uskomattoman lintuisan paikan ja siirryimme Bharatpurin kaupungin toiselle puolelle kokonaan toisenlaiseen ympäristöön, aromaisen kuivalle peltoalueelle. Heti ensimmäisellä pysähdyksellä hoituivat paikan kohdelajit, intianaavikkojuoksija (Indian Courser) ja savannihietakyyhky (Chestnut-bellied Sandgrouse). Coursereita rullaili kuivalla mulloksella viiden linnun parvi ja hietakyyhkyjä lensi ohitsemme seitsemän linnun parvi. Niiden lisäksi kirvisiä ja taskuja pyöri alueella paljon. Aavikko- ja arotasku (Desert & Isabelline Wheatear) sekä nummikirvinen (Tawny Pipit) jatkoivat lajilistaamme.

"Aavikkopellolta" palasimme takaisin Bharatpurin kaupunkiin. Vielä Nainitalin kaatopaikkaakin vastenmielisempi oli seuraava käyntikohteemme: Bharatpurin kaupungin läpi virtaava iso oja, joka oli käytännössä valtava avoviemäri. Jostain syystä se veti puoleensa kahlaajia, mukaan lukien kultakurppoja. Paitsi nyt. Melko pitkään yritimme lajia hakea, mutta viimein oli luovutettava.



Siirryimme paikalliseen ravintolaan lounaalle. Lounaan jälkeen ehdimme istuskella tovin ravintolan pihatuoleissa, ennen kuin edessä oli muutaman tunnin junamatka kohti viimeistä kohdettamme Ranthambhoren tiikeripuistoa.

Päivän lajimäärä 90, yhteislajimäärä 345.

19.2.



Ranthambhoren puisto on turisteille avoinna aamulla klo 6.30–10.30 ja iltapäivällä klo 14.00–17.30. Niinpä aamiainen oli valmis klo 5.45 ja lähtö hienosta majapaikastamme, The Tiger Denistä klo 6.15. Kukin turistiryhmä arvotaan eri reiteille ja meille ensimmäisen aamun reitiksi sattui nro 5. Lyhyen ajomatkan jälkeen oppaat hoitelivat parit muodollisuudet portilla ja olimme ykkösautiona odottamassa reittimme portin aukeamista. Pian olimme tiikerisafarilla ja päiväkin oli jo valjennut, ainakin melkein. Ensimmäisen muhkean yllätyksen aiheuttivat kuitenkin ihan muut karvaiset kaverit: kaksi tummanpuhuvaa ja pyöreää huulikarhua paineli meitä karkuun metsäisessä rinteessä!

Välikättelyn jälkeen jatkoimme safaria. Tie oli kuoppainen, rökkyinen ja pölyinen. Aksiskauriita, sambarhirviä ja riikinkukkoja käyskenteli tien varrella. Pian näimme ensimmäiset tuoreet tiikerin jäljet ja menoon tuli vähän määrätietoisuutta. Pian pienen mäenkumpareen jälkeen paikallisoppaamme Pankaj huudahti: "Tiger!" ja osoitti eteenpäin. Tiellä muutaman kymmenen metrin päässä makasi urostiikeri! Auto tietenkin pysähtyi siihen paikkaan. Samalla hetkellä vasemmalta puoleltamme alkoi kuulua rytinää ja murahtelua:

kookas uros huulikarhu tulla rymisteli puusta alas, ja sen sijaan, että olisi lähtenyt metsä ryskyen meitä karkuun, se alkoi metsä ryskyen ja murahdellen tulla meitä kohti! Onneksi se oli vain säikäytystarkoituksessa tehty valehyökkäys ja hetken uhittelun jälkeen se kääntyi ja katosi pensaikon sekaan. Tässä vaiheessa kaikki olivat niin sekaisin, että ei tiennyt mitä katsoa, kuvaamisesta puhumattakaan, ja vain Leo onnistui saamaan kuvan karhusta. Ihan kertakaikkisen käsittämätön tilanne!

Huulikarhun poistuttua näyttämöltä keskityimme tietysti tiikeriin. Sekin harmistui meidän ja karhun aiheuttamasta hässäkästä, nousi makuultaan ja siirtyi pensaikon suojaan. Pian se kuitenkin



jatkoi matkaansa sieltäkin ja siirryimme autoinemme sen oletetulle reitille. Kohta se astelikin arvokkaasti aivan automme vierestä, ylitti tien ja katosi metsään.

Olo oli vähintäänkin epätodellinen. Olimme juuri todistaneet näytelmää, jollaista vuosikymmeniä tiikerisafareita opastaneet oppaatkaan eivät olleet todistaneet usein, jos kertaakaan: huulikarhu ja tiikeri samassa tilanteessa, ja millä tavalla! Päät pyörällä jatkoimme reittiä eteenpäin. Vähän ovat muistikuvat hatarat loppusafarista, mutta majoitukseen palasimme n. 10.30. kädet vieläkin vähän täristen. Tämän jälkeen meillä oli vapaata fiilistelyä lounaaseen saakka.

Lounaan jälkeen iltapäivällä painuimme takaisin tiikerisafarille. Jo ennen varsinaiselle reitillemme kääntymistä, ”päätien” varrella oli hässäkkää: tiikeri oli nähty jo siinä. Jeeppejä ja cantereita (isoja avolava-autoja, jollainen meilläkin oli) meni joka suuntaan joidenkin ollessa parkissa. Mekin sahasimme aluetta tovin edes takaisin, mutta pian alkoi suomalaista moinen hädelli ahdistaa ja pyysimme, että jatkaisimme matkaa. Ennakkotiedoista poiketen me jouduimmekin samalle reitille kuin aamulla, joten melkoista röykytystä saimme taas osaksemme.

Reitin varrella olevan järven rannalle oli kertynyt kasapäin jeeppejä ja cantereita, tiikeri oli nähty sielläkin. Pysähdyimme odottelemaan, jonka aikana me katselimme lintuja. Mitään uutta ei kuitenkaan irronnut. Sambareita kahlasivat syvällä järvessä ja söi jotain vesiheinää. Silkkihaikara tasapainoili yhden sambarin selässä. Äkkiä aksiskauriin varoitushuuto sai eläimet juoksemaan maalle pärskeen kera. Jännittyneestä odottelusta huolimatta mitään ei kuitenkaan näkynyt ja jatkoimme matkaa. Siron kaunis persiangaselli antoi katsella itseään pitkään. Kierroksen kovin lintuhavainto oli puussa istunut komea vanha keisarikotka, jota Pankaj ei ollut nähnyt puistossa vuosikausiin.



Palasimme samalle järvelle. Jeeppejä oli edelleen parkissa järven vastarannalla, ja Pankajin mukaan tiikeri oli siellä jossain. Lähdimme rytyyttämään sinne. Paikalle päästyämme jeeppejä tuli jo vastaan, oliko bileet ohi...? No eivät olleet, tiikeri makasi taas tiellä jeeppien ympäröimänä. Se nousi ylös ja totesimme sen olevan hyvin mutainen sen käytyä viilentymässä järvessä. Tiikeri käveli kahden jeepin välistä ja lähti meitä kohti. Jostain käsittämättömästä syystä me lähdimmekin tilanteesta pois kesken kaiken. Vinod tuli kertomaan meille nolon näköisenä, että olimme menneet tiikerin perässä väärälle reitille ja puistovahti oli kuulemma ollut jossain jeepeistä, joten jouduimme luikkimaan karkuun.

Joka tapauksessa kaksi tiikeriä ja kolme huulikarhua oli moninkertaisesti enemmän kuin kukaan meistä oli osannut kuvitella.

”Iltaramramin” yhteydessä päätimme yksimielisesti, että emme lähde enää kolmannelle tiikerisafarille puistoon, vaan menemme heti aamusta läheiselle Soorwalin patojärvelle. 13 lajia oli matkaa kaikkien aikojen allekirjoittaneen opastamien Pohjois-Intian reissujen



lajimääräennätykseen, joten tekemistä riitti viimeisellekin retkipäivälle!

Lintujen osalta päivän lajimäärä 70, yhteislajimäärä 351.

20.2.

Aamu ei ollut taaskaan vielä valjennut kun starttasimme tällä kertaa kahdella avojeepillä kohti Soorwalia. Heti kilsan-parin jälkeen toppasimme keskelle tietä: pitkäpyrstökehrääjän (Large-tailed Nightjar) soidinääni kuului jostain läheltä liikkuviin autoihinkin. Pysähdyttyämme totesimme sen lentelevän jossain lähellä ja kerran se vilahtikin suoraan ylitsemme. Lupaava alku päivälle! Niinkään lupaavalta ei vaikuttanut sää: alkoi hiljalleen sataa vettä ja taivas näytti uhkaavan tummalta. Sade teki kuitenkin huulikarhut, eli uhitteli vain, eikä edes kunnolla meitä kastellut.

Reitti järvelle vei Sawai Madhopurin kaupungin ja pienempien kylien läpi. Väki oli jo herännyt ja lapset kovin innokkaina meille taas vilkuttivat ja huutelivat. Yhden kylän reunamilla oli kuiva kenttä, jolla kökötti viitisentoista paksujalkaa. Pinnalaskuri rakshti taas. 11 lajia to go. Toiveikkaina saavuimme patojärvelle. Pinnaa alkoi plorottaa: avosetti, mustapyrstökuiri, flamingo, hietatiira, mustapäälökki, suosirri, ja kovimpana ylänkötylli. Selän takana puun latvassa istui punakottarainen. Reissupinnojen lisäksi altaalla oli runsaasti pikkupääskykahlaajia, rakonokkia, suokukkoja ja muita kahlaajia.

Jatkoimme järveltä kuivalle arolle, missä lauloi kaikkiaan toistakymmentä intianpensaskiurua (Indian Bushlark). Jostain meidän mukaamme ilmestyi koira, joka otettiin juoksemaan mukaan monen kilometrin matkalle ja vielä useamman vieraan koirareviirin halki. Kova on elämä koiralla, jos oman revierin ulkopuolelle joutuu. Oppaat yrittivät ottaa koiran autoon viedäkseen sen jonnekin turvallisempaan paikkaan, mutta siihen tämä ei suostunut.

Paluumatkalla tien varrelta löytyi vielä louhikkotasku (Variable Wheatear) ja sitä katsellessamme intianpikkulepinkäinen (Bay-backed Shrike). Juuri ennen majoitusta kepitimme taivaalta vielä intiankorppikotkan (Indian Vulture) ja ylilentäneen intianisokäpinkäisen (Large Cuckooshrike). Varsin tuottoisasta aamupäivästä huolimatta pieni epävarmuus ennätyksen rikkoutumisesta kalvoi mieltä, mutta myöhemmin Excel näytti huojentavaa lukemaa 366, eli olimme lyöneet enkan kahdella lajilla!

Iltapäivällä osa porukasta kävi vielä Pankajin opastamalla vierailulla Ranthambhoren historiallisella linnoituksella. Matkalla hän näytti vielä bonuksena meille kalahuuhkajan.

Illalla pakkasimme tavarat autoon (tai siis katsottiin, kun ne pakattiin) ja siirryimme paikallisten käsityöläisten matkamuistomyymälän kautta juna-asemalle ja yöjunaan kohti Delhiä. Reissu alkoi olla taputeltu

21.2.

Aamulla oli vuorossa enää siirtyminen rautatieasemalta hotelliaamiaisen kautta Indira Gandhin kansainväliselle lentokentälle Helsingin-lentoa varten.

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.	
R e t k i p i n n a t				D e l h i - K u m e r i a	K u m e r i a	K u m e r i a - C o r b e t t	C o r b e t t	C o r b e t t - N a i n i t a l	N a i n i t a l	N a i n i t a l	N a i n i t a l - D e l h i	D e l h i - C h a m b a l	C h a m b a l	C h a m b a l - B h a r a t p u r	B h a r a t p u r	B h a r a t p u r - R a n t h a m b h o r e	R a n t h a m b h o r e	R a n t h a m b h o r e - D e l h i	D e l h i - H e l s i n k i	
1	Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>	mustafrankoliini										1							1
1	Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	harmaafrankoliini									2	20	10	30	30	20	30		7
1	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>	viiriäinen													2				1
1	Jungle Bush Quail	<i>Perdica asiatica</i>	viidakkopensasviiriäinen										1				2			2
1	Hill Partridge	<i>Arborophila torqueola</i>	viidakkoppy							2	2									2
1	Painted Spurfowl	<i>Galloperdix lunulata</i>	kirjopyyfasaani														2			1
1	Koklass Pheasant	<i>Pucrasia macrolopha</i>	töyhtöfasaani						1											1
1	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	punaviidakkokana			10	7	6												3
1	Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>	teräsfasaani			10	10		2	4	3									5
1	Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	riikinkukko	6			15					25	50	20	5	30	x	x		9
1	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>	merihanhi												200			150		2
1	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>	tiibetinhani										100		100			50		3
1	Lesser Whistling-duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	intianviheltäjäsaorsa									1	50		60					3
1	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	ruostesaorsa			4	2	240					20	80	10			20		7
1	Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	kyhmysaorsa										3	1	3			5		4
1	Gadwall	<i>Anas strepera</i>	harmaasaorsa										30		200					2
1	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>	haapana										1		10		20	20		4
1	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	sinisaorsa				2								1					2

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.
1	Spot-billed Duck	<i>Anas poecilorhyncha</i>	täplänokkasorsa										10		50	10		20	4
1	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>	lapasorsa										8	10	50			4	4
1	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	jouhisorsa										20		100			50	3
1	Garganey	<i>Anas querquedula</i>	heinätavi										10				10		2
1	Common Teal	<i>Anas crecca</i>	tavi				30						4		50		40	100	5
1	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	punapäänarsku										30						1
1	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	punasotka										2					4	2
1	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	ruskosotka										1		15				2
1	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	pikku-uikku										5	8	50				3
1	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	aasianiibishaikara										15	33	80			40	4
1	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	aasianrakonokka									3	15		1			30	4
1	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>	piispahaikara			1	2						2				1		4
1	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	mustahaikara			1	13	12											3
1	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	aasiansatulahaikara				2						2		6				3
1	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber / roseus</i>	flamingo															35	1
1	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	pronssi-iibis												60				1
1	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	aasianpyhäiibis	2								3	10		20		3		5
1	Black (Red-naped) Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>	intianiibis	9								2	10	2					4
1	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	kapustahaikara									1	9		10			30	4
1	Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i>	mustapikkuhaikara												2				1
1	Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	intianriisihaikara	10			2	5				5	50	10	10		10	20	9
1	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	yöhaikara												1				1
1	Little (Striated) Heron	<i>Butorides striata</i>	kyyyryhaikara										1						1
1	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	harmaahaikara				10						20	3	40	1	1	10	7
1	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	ruskohaikara										5		15		1		3
1	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	lehmähaikara	150				1				30	x	x	3	x	10	x	9
1	Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>	jalohaikara	2			5	2				1	3	1	10	1	1	3	#
1	Intermediate Egret	<i>Mesophoyx intermedia</i>	pikkujalohaikara									1	3		30				3
1	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	silkkihaikara	4			60	100				5	15		5	5	5	5	9
1	Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>	jaavanmerimetso	2				150			8	1	20	5	30	10	10	50	#
1	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	intianmerimetso												40		2		2
1	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	merimetso			100	400	50		5	1		30	5	100	50	10	20	#
1	Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	käärmeaula			1							10		20		2	10	5
1	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	tuulihaukka		1				2			1	3	1	1	1		1	8
1	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	muuttohaukka		1	1	1				1								4
1	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	liitohaukka	1		1	3					5	20	5	2	2	2	5	#
1	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	haarahaukka	5000				100		20	20	50	30	x		10			3
1	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	sääksi			2	2						2						8
1	Pallas's Fish Eagle	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	aromerikotka		2	5	10	2											4
1	Lesser Fish Eagle	<i>Ichthyophaga humilis</i>	pikkukalakotka			1	2	1											3

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.	
1	Black Eagle	<i>Ictinaetus malayensis</i>	rosvokotka						1											1
1	Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	idänmehiläishaukka									2					10			2
1	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	pikkukorppikotka	2		1			1			6	20	7	10	10				8
1	Long-billed / Indian Vulture	<i>Gyps indicus</i>	intiankorppikotka															2		1
1	Himalayan Vulture	<i>Gyps himalayensis</i>	himalajankorppikotka			1		4	6	1										4
1	Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>	hanhikorppikotka			8	2			10	10									4
1	Black / Cinereous Vulture	<i>Aegypius monachus</i>	munkkikorppikotka			5	8													2
1	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	kalmokorppikotka				1													1
1	Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	harjakotka		2	10	4								1		1			5
1	Eurasian Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	ruskosuohaukka												3					1
1	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	sinisuohaukka			1							1							2
1	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	arovarpushaukka	4			1					3	5	1	1	2		1		8
1	Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>	varpushaukka		1				1		1									3
1	Common (Himalayan) Buzzard	<i>Buteo buteo (burmanicus)</i>	hiirihaukka					1	1											2
1	Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>	kiljukotka					2					1		10					3
1	Indian Spotted Eagle	<i>Aquila hastata</i>	"intiankiljukotka"									1	2		1					3
1	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>	savannikotka										1		1					2
1	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	arokotka			1		10	5	50	20		2							6
1	Eastern Imperial Eagle	<i>Aquila heliaca</i>	keisarikotka												1		1			2
1	Bonelli's Eagle	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	vuorikotka			1					1		2							3
1	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>	pikkukotka										1		1					2
1	Changeable Hawk Eagle	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	jalokotka			2	4	1												3
1	Mountain Hawk Eagle	<i>Spizaetus nipalensis</i>	mahtijalokotka					1	2											2
1	Brown Crake	<i>Amaurornis akool</i>	ruskosuokana				1			3ä			2							3
1	White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	ojasuokana									2	4	1	15	10	4	10		7
1	Purple Swampphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>	sulttaanikana										15		100	20		1		4
1	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	liejukana	1								3	10	10	200	40	30	10		8
1	Common Coot	<i>Fulica atra</i>	nokikana										10		500	5				3
1	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	saruskurki									2	43		6	2				4
1	Eurasian (Indian) Thick-knee	<i>Burhinus oedicephalus (indicus)</i>	paksujalka															25		1
1	Great Thick-knee	<i>Esacus recurvirostris</i>	intianpaksujalka				1						4					5		3
1	Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	pitkäpyrstöjassana												15					1
1	Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	pronssijassana									5	10		15	5				4
1	Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	iibisnokka					2												1
1	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	pitkäjalka	30			5					15	20	30	15	50	40	100		9
1	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	avosetti															100		1
1	River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	jokihyppä	15	2	5	20	10					15	5						7
1	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>	intianhyppä	5								10		3		5		8		5
1	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	kenttähyppä	15		5	5	20				20	100	50	20	30	20	30		#
1	White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	suohyppä										4		10					2

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.	
1	Kenthis Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	mustajalkatylli										120					30		2
1	Lesser Sand Plover	<i>Charadrius mongolus</i>	ylänkötylli															1		1
1	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	pikkutylli			2	10						10					10		4
1	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>	suokukko													3		30		2
1	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	taivaanvuohi									4	1		1		1	30		5
1	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	mustapyrstökuiri															80		1
1	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	kuovi										2					2		2
1	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	mustaviklo									2			4					2
1	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	punajalkaviklo				2					1	3			1		3		5
1	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	lampiviklo									1				1		1		3
1	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	valkoviklo	1		2	5	3				3	5	5	5	5	1	10		#
1	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	metsäviklo	1	1	1	3					2	3	2	2	5	3	5		#
1	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	liro									5	2		20	10	5	10		6
1	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	rantasipi				1					1	5	1	1	1		5		7
1	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	pikkusirri										1							1
1	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	lapinsirri									10	5					10		3
1	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	suosirri															2		1
1	Indian Courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>	intianaavikkojuoksija													5				1
1	Small Pratincole	<i>Glareola lactea</i>	pikkupääskykahlaaja												1			150		2
1	Pallas's Gull	<i>Larus ichthyaetus</i>	mustapäälokki															8		1
1	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	hietatiira															3		1
1	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	jokitiira				50						1	30				10		4
1	Black-bellied Tern	<i>Sterna acuticauda</i>	mustavatsatiira										6							1
1	Chestnut-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles exustus</i>	savannahietakyyhky													7				1
1	Painted Sandgrouse	<i>Pterocles indicus</i>	intianhietakyyhky														6			1
1	Common Pigeon	<i>Columba livia</i>	kalliokyyhky	x		5		x	x	x	x	x	x	x	20	x	x	x		#
1	Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	idänturturikyyhky					2		5	4									3
1	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	turkinkyyhky	50				3				10	20	20	5	20		50		8
1	Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	pikkuturturikyyhky									8						1		2
1	Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>	aasianturturikyyhky			3	4										2	2		4
1	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	palmukyyhky	1								10	10	2	20	20	5	20		8
1	Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	smaragdikyyhky				2													1
1	Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phoenicopterus</i>	huiluviherkyyhky									15		1	5	2		5		5
1	Pin-tailed Green Pigeon	<i>Treron apicauda</i>	puikkopyrstökyyhky		4															1
1	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>	isokauluskaija				1					2						2		3
1	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	kauluskaija	30								x	x	x	x	x	x	x		8
1	Slaty-headed Parakeet	<i>Psittacula himalayana</i>	himalajankaija		15	5	5	5	50	10	20									7
1	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	luumupääkaija		5	20	200	50				1					20	x		7
1	Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	punarintakaija		10	30	150	80	300	30	30									7
1	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	variskäki									2	1							2

POHJOIS-INTIA 2016[illegible]

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.
1	Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygaeus</i>	intianvihertikka				6												1
1	Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	harmaapäätikka		1	10	8												3
1	Himalayan Flameback	<i>Dinopium shorii</i>	isotulitöyhtö			10	5												2
1	Black-rumped / Lesser Flameback	<i>Dinopium benghalense</i>	intiantulitöyhtö												2		1	1	3
1	Greater Flameback	<i>Chrysocolaptes lucidus</i>	punaselkätikka								1								1
1	Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	metsäkäpinkäinen					30								1			2
1	Large Cuckooshrike	<i>Coracina macei</i>	intianisokäpinkäinen															1	1
1	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	sieppokäpinkäinen		15		30				2								3
1	Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	jora		5												3		2
1	Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	pikkuminivetti												2		1		2
1	Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>	liekkiminivetti		5	30		10			1								4
1	Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>	pilkkaminivetti		10		1												2
1	Isabelline Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>	punapyrstölepinkäinen													4			1
1	Bay-backed Shrike	<i>Lanius vittatus</i>	intianpikkulepinkäinen															1	1
1	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	ruskoperälepinkäinen			5	10	15				3	5			1	1	2	8
1	Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	etelänisolepinkäinen									1				2		2	3
1	Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	pikkuviiridrongo					1											1
1	Spangled Drongo	<i>Dicrurus hottentottus</i>	peräsindrongo		1	8		5	1										4
1	Greater Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus paradiseus</i>	viiridrongo												1				1
1	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	mustadrongo	20			1	10			1	20	30	10	50	30	20	20	#
1	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	tuhkadrongo													1			1
1	White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caeruleascens</i>	valkovatsadrongo														10		1
1	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	pronssidrongo		15	15			1	1Ä	1								5
1	Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthonus</i>	huppukuhankeittäjä			5Ä	7	5											3
1	Maroon Oriole	<i>Oriolus traillii</i>	kastanjakuhankeittäjä			8	2				2								3
1	Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura hypoxantha</i>	keltavatsamonarkki		10		1				3								3
1	White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	harmaavatsamonarkki		20		lä	1	1		5								5
1	White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>	valko-otsamonarkki														2		1
1	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	närhi						15										1
1	Black-headed Jay	<i>Garrulus lanceolatus</i>	himalajannärhi					3	15	8									3
1	Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	loistoharakka			3		10	2		15								4
1	Common Green Magpie	<i>Cissa chinensis</i>	viherharakka			3	1	lä											3
1	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	happuviidakkoharakka		2	3	2	3				6	5	1	30	20	x	50	#
1	Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>	naamioviidakkoharakka			1			1		2								3
1	Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>	paksunokkavaris	100	2	10	10	20	15	30	x	x	x	x	30	x	10	x	#
1	House Crow	<i>Corvus splendens</i>	intianvaris	500	2	2				2		x	x	x	10	x		x	#
1	Great Tit	<i>Parus major</i>	talitiainen		15	10	1										10	5	5
1	Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	vihertalitiainen						30	15	10								3
1	Black-lored Tit	<i>Parus xanthogenys</i>	intianharjatiainen		10	4					5								3
1	Coal Tit / Spot-winged Tit	<i>Parus ater melanolophus</i>	kuusitiainen						20	5	5								3

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.	
1	Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>	kerttutiainen						2											1
1	Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>	harlekiinipyrstötiainen			1			40	20	20									4
1	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	pikkutörmäpääsky	50		20	30	20					30	5	30	5	20	10		#
1	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	kalliopääsky		15				20	3	10									4
1	Dusky Crag-Martin	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	aasiankalliopääsky														30	20		2
1	Nepal House Martin	<i>Delichon nipalense</i>	nepalinräystäspääsky		2															1
1	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	jouhipääsky										20			1		20		3
1	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	haarapääsky	10			2	4	5	20	20		3		10	10	1	5		#
1	Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	ruostepääsky								5									1
1	Indian Bushlark	<i>Mirafra erythroptera</i>	intianpensaskiuuru															10		1
1	Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	lyhytvarvaskiuuru										200			100				2
1	Ashy-crowned Sparrow-Lark	<i>Eremopterix griseus</i>	intianvarpuskiuru										10			50		30		3
1	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	töyhtökiuru										5			10				2
1	Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>	aasiankiuru				6	6					20			20				4
1	Himalayan Bulbul	<i>Pyconotus leucogenys</i>	valkoposkibulbuli		20	10	50	30	50	50	20									7
1	White-eared Bulbul	<i>Pycnonotus leucotis</i>	tiaisbulbuli										2		30	20				3
1	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	töyhtöhuppubulbuli			2	2													2
1	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	punaposkibulbuli				2													1
1	Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>	punaperäbulbuli	20	10	10	15	10	2			20	30	10	15	30	x	x		#
1	Mountain Bulbul	<i>Ixos mcclllandii</i>	vuoriviirubulbuli							2										1
1	Ashy Bulbul	<i>Hemixos flavala</i>	kultasiipibulbuli			15	8													2
1	Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	punanokkabulbuli			1					30									2
1	Striated Prinia	<i>Prinia crinigera</i>	viiru priinia		1				1											2
1	Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>	savu priinia		30						5	1								3
1	Ashy Prinia	<i>Prinia socialis</i>	sinipriinia								2			1	5	5		2		5
1	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>	intiantuhkapriinia									5	2		5					3
1	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	heinäkerttu										5							1
1	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	pitkäpyrstöräätäli		10	2						5	5		3ä	2				6
1	Brown-flanked Bush-warbler	<i>Cettia fortipes</i>	pensassilkikerttunen			1														1
1	Aberrant Bush-warbler	<i>Cettia flavolivacea</i>	keltasilkkikerttunen						1		3									2
1	Grey-sided Bush-Warbler	<i>Cettia brunnifrons</i>	himalajansilkikerttunen								1									1
1	Blyth's Reed Warbler	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	viitakerttunen										1		1					2
1	Chestnut-headed Tesia	<i>Tesia castaneocoronata</i>	keltapittakerttunen		3						3									2
1	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	tiltalti	2													2			2
1	Tickell's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus affinis</i>	ylänköuunilintu							1										1
1	Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>	himalajanuunilintu						1	2										2
1	Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	tiibetinuunilintu		10				10	10	20									4
1	Hume's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	kashmirinuunilintu	2	5	10ä	15ä	5ä				10		1	5	10	5	5		#
1	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	idänuunilintu				2ä					2			3	2	2	1		6
1	Black-faced Warbler	<i>Abroscopus schisticeps</i>	naamiolehväkerttu							30										1

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.	
1	Grey-hooded Warbler	<i>Seicercus xanthoschistos</i>	himalajansieppokerttu		10	50	20	10ä	5	20	20									7
1	Whistler's Warbler	<i>Seicercus whistleri</i>	kashmirinsieppokerttu		2						1									2
1	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	hernekerttu						1			2	2		10	5				5
1	Scaly-breasted Wren-Babbler	<i>Pnoepyga albiventer</i>	töpötimali		1					1										2
1	Pygmy Wren-Babbler	<i>Pnoepyga pusilla</i>	pikkutöpötimali							1										1
1	Black-chinned Babbler	<i>Stachyris pyrrhops</i>	pakistanintimali		5	10	3			10										4
1	Rusty-cheeked Scimitar-Babbler	<i>Pomatorhinus erythrogenys</i>	punakylkitimali			3ä	1ä			4	2									4
1	Common Babbler	<i>Turdoides caudata</i>	pensastimali										20		2	5				3
1	Large Grey Babbler	<i>Turdoides malcolmi</i>	isopensastimali									30	20	50	10	20	10	x		7
1	Jungle Babbler	<i>Turdoides striata</i>	metsäpensastimali	15	40	50	20	10				x	50	50	50	30	x	x		#
1	White-throated Laughingthrush	<i>Garrulax albogularis</i>	himalajannaurutimali						60											1
1	White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i>	valkotöyhtötimali		15	5														2
1	Striated Laughingthrush	<i>Garrulax striatus</i>	viirutöyhtötimali						2		3									2
1	Rufous-chinned Laughingthrush	<i>Garrulax rufogularis</i>	oranssikurkkutimali								2									1
1	Streaked Laughingthrush	<i>Garrulax lineatus</i>	pikkunaurutimali						30	20	20									3
1	Chestnut-crowned Laughingthrush	<i>Garrulax erythrocephalus</i>	kultasiipitimali						6											1
1	Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix lutea</i>	tulirintatimali								50									1
1	Blue-winged Minla/Siva	<i>Minla cyanouroptera</i>	siniminla			3					1									2
1	White-browed Shrike Babbler	<i>Pteruthius flaviscapis</i>	lepinkäistimali		1															1
1	Rufous Sibia	<i>Heterophasia capistrata</i>	himalajanpyrstötimali		3				20	10	10									4
1	Whiskered Yuhina	<i>Yuhina flavicollis</i>	viiksijuhina								1									1
1	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>	kultasilmäitimali												3			2		2
1	Brown Dipper	<i>Cinclus pallasi</i>	aasiankoskikara		2						1									2
1	Oriental White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	aasianrilli	20	30	20		30		10		2					20	5		8
1	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta castanea</i>	aasiannakkeli	3	4	5														3
1	White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	himalajannakkeli						5	8	3									3
1	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	mustaotsanakkeli		2	5	1													3
1	Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	kalliokiipijä					2												1
1	Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia himalayana</i>	raitapyrstökiipijä						3	2										2
1	Jungle Myna	<i>Acridotheres fuscus</i>	viidakkomaina				20	5												2
1	Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>	intianmaina	x								10	20	5	2	x		x		7
1	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	pihamaina	x	10	20														

POHJOIS-INTIA 2016

	English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.	
1	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	kulorastas						3											1
1	Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	sinirinta												4					1
1	Siberian Rubythroat	<i>Luscinia calliope</i>	rubiiinisatakieli												1					1
1	White-tailed Rubythroat	<i>Luscinia pectoralis</i>	himalajansatakieli		2															1
1	Orange-flanked Bush Robin	<i>Tarsiger (cyanurus) rufilatus</i>	sinipyrstö			1			2	2	2									4
1	Golden Bush Robin	<i>Tarsiger chrysaeus</i>	kultasinipyrstö							1	1									2
1	Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i>	harakkatasku	2		1							1		20	5	2	2		7
1	Indian Robin	<i>Saxicoloides fulicatus</i>	intiantasku	1								2	20	2	5	20	5	30		8
1	Plumbeous Water Redstart	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>	jokileppälintu	20	30	10	5	5	1		5									7
1	White-capped (Water) Redstart	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	virtaleppälintu	5	30	10	5	5	1		5									7
1	Blue-capped Redstart	<i>Phoenicurus caeruleocephala</i>	kivikkoleppälintu						6	1	1									3
1	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	mustaleppälintu									2			3			1		3
1	Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus frontalis</i>	louhikkoleppälintu						3	1										2
1	Little Forktail	<i>Enicurus scouleri</i>	pikkuhaarapyrstö		2															1
1	Spotted Forktail	<i>Enicurus maculatus</i>	pitsihaarapyrstö		4					2	3									3
1	Siberian Stonechat	<i>Saxicola maurus</i>	sepeltasku			2	20	5			2	5	15							6
1	Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>	nokitasku				1				1	2	5		1	3				6
1	Grey Bushchat	<i>Saxicola ferreus</i>	harmaatasku	1	5	3	10	5	2	2	5									8
1	Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	aavikkotasku													12		5		2
1	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellinus</i>	arotasku													2		1		2
1	Variable Wheatear	<i>Oenanthe picata</i>	louhikkotasku															1		1
1	Brown (Indian) Rock-Chat	<i>Cercomela fusca</i>	pihatasku									1				2		10		3
1	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	sinirastas										2							1
1	Chestnut-bellied Rock Thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	isokivikkorastas		2															1
1	Rufous-gorgeted Flycatcher	<i>Ficedula strophiatea</i>	oranssivyösieppo		2															1
1	Red-throated Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>	pikkusieppo											1	2	5		1		4
1	Taiga Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>	idänpikkusieppo				1	1				1ä	1							4
1	Little Pied Flycatcher	<i>Ficedula westermanni</i>	pikkukirjosieppo			1														1
1	Slaty-blue Flycatcher	<i>Ficedula tricolor</i>	sinipikkusieppo		5		1		2		2									4
1	Verditer Flycatcher	<i>Eumyias thalassinus</i>	turkoosisieppo	1	1							1								3
1	Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i>	puistosinisieppo														1Ä			1
1	Grey-headed Canary Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	viitasieppo		3	3		2							1					4
1	Rufous-bellied Niltava	<i>Niltava sundara</i>	hopealakkisieppo		3	1					1									3
1	Small Niltava	<i>Niltava macgrigoriae</i>	pikkusinisieppo		2															1
1	Golden-fronted Leafbird	<i>Chloropsis aurifrons</i>	kultaotsalehvi			2														1
1	Orange-bellied Leafbird	<i>Chloropsis hardwickii</i>	rusovatsalehvi		3	3														2
1	Thick-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum agile</i>	harmaaviirukukastaja		1															1
1	Pale-billed Flowerpecker	<i>Dicaeum erythrorhynchos</i>	intiankukastaja		3			2												2
1	Purple Sunbird	<i>Nectarinia asiatica</i>	purppuramedestäjä									2	5		5	20		5		5
1	Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga nipalensis</i>	sateenkaarimedestäjä		5						1									2

POHJOIS-INTIA 2016[illegible]

POHJOIS-INTIA 2016

English common name	Scientific name	Finnish name	6.2.	7.2.	8.2.	9.2.	10.2.	11.2.	12.2.	13.2.	14.2.	15.2.	16.2.	17.2.	18.2.	19.2.	20.2.	21.2.
NISÄKKÄÄT JA MUUT ELÄIMET	*lista ei välttämättä täydellinen ja lajit aika satunnaisessa järjestyksessä.																	
Northern/Five-striped Palm squirrel	<i>Funambulus pennantii</i>	pakistaninpalmuorava	10								20	x	x	x	x	x	x	
Nilgai / Blue Bull	<i>Boselaphus tragocamelus</i>	nilgaiantilooppi									1	20		30				
Common / Asian Palm Civet	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	musanki										2						
Golden Jackal	<i>Canis aureus</i>	kultasakaali										6	ÄÄ	ÄÄ				
Spotted Deer / Axis Deer / Chital	<i>Axis axis</i>	aksiskauris	7	5	100	250	50							30		x	10	
Sambar (Deer)	<i>Cervus unicolor</i>	sambar(hirvi)			10	20								5		x	5	
Hog Deer	<i>Axis porcinus</i>	rytökauris			5	10												
Indian Muntjac / Barking Deer	<i>Muntiacus muntjak</i>	muntjakki		1	2	5		2	4									
Asiatic Elephant	<i>Elephas maximus</i>	aasiannorsu		2	4	2												
Wild Boar	<i>Sus scrofa</i>	villisika			8	5	7							10	20	x	10	
Indian Grey Mongoose	<i>Herpestes edwardsii</i>	mungo									1							
Indian Flying Fox	<i>Pteropus giganteus</i>	kaljulenkko/intianlentäväkoira									100	50						
(Bengal) Tiger	<i>Panthera tigris (ssp. tigris)</i>	(bengalin)tiikeri														2		
Indian Hare	<i>Lepus nigricollis</i>	mustakaulajänis									1	2	2					
Rhesus Macaque	<i>Macaca mulatta</i>	reesusmakaki	50	x	50	x	x	x	x	x	x	10	15	x	x	1	x	
Hanuman Langur	<i>Semnopithecus entellus</i>	hanumaani	10	10	50	x	x	x	x	x						x	x	
Otter	<i>Lutra lutra</i>	saukko			10	10												
Himalayan Goral	<i>Naemorhedus goral</i>	himalajangoraali						10										
Jungle cat	<i>Felis chaus</i>	suokissa									1							
Yellow-throated Marten	<i>Martes flavigula</i>	keltakurkkunäätä								2								
Sloth Bear	<i>Melursus ursinus</i>	huulikarhu														3		
Indian Gazelle	<i>Gazella bennettii</i>	persiangaselli														1		
Checkered Keelback	<i>Xenochrophis piscator</i>	(vesikäärme-laji, ei suom.)															2	
Russel's / Chain Viper	<i>Daboia russelii</i>	ketjukyy															1	
Indian rock python	<i>Python molurus</i>	tiikeripython												1				
Bengal Monitor	<i>Varanus bengalensis</i>	bengalinvaraani												1				
Gharial	<i>Gavialis gangeticus</i>	gaviaali			5	16						20						
Mugger Crocodile	<i>Crocodylus palustris</i>	suokrokotiili				10						10				8	5	
Ganges River Dolphin	<i>Platanista minor</i>	gangesindelfiini										2						
Indian flap-shell turtle	<i>Lissemys punctata</i>	intianläppäpehmeäkilpikonna											5	5				
kilpikonna sp					1								5					