

Pohjois-Intian lintu- ja luontomatka 19.11.–5.12. 2015

Ryhmä: Hannu Friman, Hannu Kormano, Antero Kurikka, Raija Kurikka, Kirsi Leiri, Martti Mielonen, Tapani Missonen, Marja-Leena Mäki, Hannu Pösö ja Timo Tammiketo

Matkanjohtaja Harri Taavetti

Paikallinen matkanjärjestäjä Vinod Goswami / Babita Tours sekä paikallisoppaita

19.-20.11.

Helsinki–Delhi–The Den, Kumeria, n. 300 km Delhistä pohjoiseen

Jo muutamaa tuntia ennen lentoa tuli Finnairilta tieto, että Delhin-lento Hesasta on noin 2h myöhässä. Arvioitu uusi lähtöaika piti aika lailla kutinsa ja pääsimme matkaan vähän ennen iltakymmentä Suomen aikaa.

Laskeuduimme Delhiin klo 8.30 paikallista aikaa. Yleensä lento laskeutuu auringon noustessa ennen seitsemää. Passien ja viisumien tarkistus sujui hyvin paitsi Martilla ja Leenalla, joilla oli uusi hieno e-viisumi. Se jono ei vetänyt ei sitten ollenkaan. Me muut odottelimme yli tunnin matkatavarahihnan vieressä. Viimein pääsimme ulos, missä Vinod jo meitä odottelikin. Niin, lentokoneesta havaittiin jo ainakin haarahaukkoja ja puluja.

Pihalla bussia odotellessamme viereisissä pienissä, rakennusten ja asfaltin ympäröimissä puskipuistoissa pyöri kolme huppuviidakkoheikkokkaa (Rufous Treepie) ja parvi metsäpensastimalleita (Jungle Babbler). Ensimmäiset elikset tuli siis osalle ryhmäläisistä kuitattua jo lentokentällä. Liikkeelle pääsimme vasta noin klo 10. Heti lentokentän porttien jälkeen tienvarsinurmikolla tepasteli kaikkiaan kymmenkunta intianhyökkääjä (Yellow-wattled Lapwing). Tuossa vaiheessa emme vielä tienneet sitä yllättävää faktaa, että kyseiset linnut jäivät ainoiksi havainnoiksi koko reissulla, vaikka kyseessä on varsin yleinen laji kuivilla kentillä. Pääasia kuitenkin, että laji tuli havaittua.

Koska päivä oli jo pitkällä, Delhin tiet ja kadut olivat täyttyneet autoista ja rikshoista ja meno oli todella ruuhkaista ja hidasta. Varmaan pari tuntia kesi, ennen kuin pystyimme sanomaan olevamme ulkona Delhistä. Haarahaukkojen määrä laitakaupungin yllä oli paikoin päätä huimaava.

Matkalla ylitimme kaksi intialaisille pyhää jokea: Yamuna ja Ganges. Jonkun faktan mukaan noin 10 % koko maailman väestöstä elää Gangesin valuma-alueella. Kun katsoi ihmisten määrää teillä, sen saattoi helposti uskoa...

Nälkä ja muut tarpeet alkoivat jo painostaa, kun viimein saavuimme lounaspaikkaamme, matkan varrella olevaan hyvään ravintolaan. Nautimme tyypillisen intialaisen lounaan, mihin kuului ”dal” eli linssikeittoa, ”palak paneer”, eli pinaattia ja juustokuutioita, paria erilaista kasvismössöä ja riisiä sekä tietenkin naan-leipää. Kaikki olivat erinomaisen maukkaita.

Lounaan jälkeen sama matkantekomme jatkui pitkälle pimeään saakka. Alkoi jo tuntua, että määränpäämme ei tule koskaan. Edellinen monsuuni oli vielä saanut loppupään tiet aika huonoon kuntoon ja yksi siltakin oli kokonaan poikki. Sen kiersimme kuoppaista kiertotietä pitkin. Onneksi kyseinen uoma oli jo ehtinyt kuivua.

Yhdeksän tunnin matkanteon jälkeen The Denin kyltti toivotti meidät vihdoin tervetulleiksi. Illalla päivällisellä juhlistimme Rajan ja Antun 33-v hääpäivää oikein kakun kera.

Vaikka koko päivä meni matkustaessa, eikä varsinaista linnustamista ollut ollenkaan, Pösön Hannun yli 5000 lajin maailmanpinnalista sai jatkoa jopa kolmen lajin, intiansininärhen (Indian Roller), kyläkottaraisen (Asian

Pied Starling) ja intiantokon (Indian Grey Hornbill) verran. Mutta intialaisten kaupunkien, kylien ja maaseudun hulinaa pääsimme ihmettelemään senkin edestä.

21.11.

Aamulla, kun taivaanrannassa alkoi hiukan sarastaa, sinijokirastaan (Blue Whistling Thrush) voimakas vihellys kuului sisälle toimien oivana herätyskellona. Kokoonnuimme auringon noustessa The Denin rehevän metsän ympäröimälle pihalle, missä aasianrillit (Oriental White-eye), keltavatsamonarkit (Yellow-bellied Fantail) ja intianharjatiaiset (Black-lored Tit) pitivät jo aamukonserttia. Myös paikallinen lintuoppaamme Karan oli saapunut paikalle. Alhaalla jokivarressa näkyi mm. aasiankeisarikalastaja (Crested Kingfisher) ja loistoharakka (Red-billed Blue Magpie) suoritti nopean ohilennon. Aikamme ihmeteltyämme pihalla lähdimme kävelemään alas jokivarteen vievää pientä uraa. Tai yritimme. Heti pihalla meidät keskeytti komea koiras liekkivihertikka (Lesser Yellownape). Matkalla näimme mm. aasian- (Chestnut-bellied) ja himalajannakkelin (White-tailed Nuthatch), tiibetinuunilintuja (Lemon-rumped Warbler), aasianpikku- (Grey-capped Pygmy) ja aasiankirjotikan (Fulvous-breasted Woodpecker). Alhaalla joella pääsimme seuraamaan aasiankoskikaraparin (Brown Dipper) touhuja. Karan meille näyttänyt Karan käveli yksin vähän kauemmas ja huitoi pian meitä tulemaan perässä. Komea pitsihaarapyrstö (Spotted Forktail) ruokaili avoimesti vastarannalla. Myös jalokotka (Changeable Hawk-eagle) kaarteli kiljuen taivaalla.



The Denissä heräiltiin uuteen päivään aamuhämärissä ”sinijokirastaan laulun aikaan”.

Aamiaisen jälkeen jatkoimme bussilla samaa tietä eteenpäin, jota edellisiltana niin loputtomiin könsysimme. Saavuimme pieneen kyläpahaseen, missä tien varrella oli tekojuja ym. ja aika paljon ihmisiä. Paikalla pieni puro virtasi tien yli ja putosi tiilistä rakennettua seinämää alas syvään uomaan. Paikan kohdelaji pikkuhaarapyrstö (Little Forktail) ei suostunut näyttäytymään, mutta kylkiäisinä näkyi mm. himalajankaija (Slaty-headed Parakeet), himalajanbulbuleita (Himalayan Bulbul), mahtijalokotka (Mountain Hawk-eagle) ja päivän toinen pitsihaarapyrstö.

Seuraava kohteemme oli taas pieni jokiuoma, tällä kertaa paljon metsäisemmässä paikassa. Kohdelajinamme oli tällä kertaa vuorikalahuuhkaja (Tawny Fish-owl), joka sekään ei yhteistyöhön ollut halukas. Niinpä palasimme majapaikkaamme. Pihalla näkyi sieppo, mistä emme oikein päässeet yksimielisyyteen, oliko kyseessä pikkusieppo vai idänpikkusieppo. Tuntomerkit menivät vähän ristiin. Lopulta päädyimme idänpikkusieppoon. Siirryimme ravintolan katolla sijaitsevalle terassille, mistä avautuu hieno näkymä yli syvän Kosi-joen uoman. Tilasimme myös oluet ja nautiskelimme olostamme auringon paistaessa suorastaan kuumasti. Kormanon Hannu puki tunnelman sanoiksi: ”Leppoisuus suorastaan runtelee”. Tästä olikin mukava siirtyä lounaalle.

Lounaan jälkeen hyppäsimme taas bussiin ja palasimme takaisin päin kohti Ramnagarin kaupunkia. Oppaamme olivat kuulleet tuoreen havainnon talvehtivista iibisnokista (Ibisbill). Paikka, jossa ne talvehtivat, oli Kosi-joella, pienen temppelin lähellä. Niinpä intialaisia oli tietysti paikalla aika paljon. Tästä huolimatta joella oli kosolti myös lintuelämää. Näimme jokihyyppiä (River Lapwing), pikkutörmäpääskyjä (Plain Martin), yhden ainakin allekirjoittaneen yllättäneen, kivikossa kyttäävän kyyryhaikaran (Striated Heron) ja taas niin komean aasiankeisarikalastajan. Iibisnokatkin (3 yks.) löytyivät pienen haeskelun jälkeen juuri temppelin ja sille johtavan sillan kohdalta. Kävellessämme lähemmäs niitä edessämme pyöri sinirastas ja useampia idäntiltalteja. Joki- (Plumbeous Water) ja virtaleppälinnut (White-capped Water Redstart) olivat yleisiä missä tahansa oli kivikkoisia jokiuomia, niin myös täällä. Sillan ali päästyämme iibisnokat olivat toisella puolen kapeaa jokea huolimatta joessa uivista intialaispojista. Pariin otteeseen linnut suorittivat myös näyttävät ohilennot ja kamerat raksuttivat.



Yksi kolmesta Kosi-joella talvehtivasta iibisnokasta. Laji on lähes jokaisen Intian-kävijän toivelistan kärkipäässä ja se sai kannatusta myös reissun lopussa matkan hienoimman lintulajin äänestyksessä.

Iltapäivän päätteeksi yritimme vielä yhden jokiuoman varrelta pikkuhaarapyrstöä, mutta ilta pimeni väijäämättä, joten mitään uutta ei enää irronnut.

Päivän lajimäärä 61.

22.11.

Päivä alkoi taas The Denin pihapiirin lintuhulinaa ihmetellessä. Nyt uusina lajeina tulivat ainakin mustaotsanakkeli (Velvet Nuthatch) ja kultaniskatikka (Greater Yellownape). Aamiaisen jälkeen olikin aika

hyvästellä tämä hieno paikka, hypätä bussiin ja suunnata kohti uusia seikkailuja ja Corbettin kansallispuistoa.

Corbettin portilla meitä odotti kolme avojeeppiä, Gypsy:ä, joilla tulisimme liikkumaan seuraavat pari päivää. Odottelimme hetken oppaiden hoitaessa pakollista byrokratiaa, minkä aikana lajilistamme jatkui uusilla komeilla tikoilla, isotulitöyhdöllä (Himalayan Flameback) ja aasiantöyhtötikalla (Rufous Woodpecker). Pian pääsimme portista sisään ja ajelemaan läpi jyhkeän metsikön kohti Dhikalaa, kahden seuraavan yön majapaikkaamme. Tiet olivat pölyisiä ja johtaja-autoa lukuun ottamatta näytti siltä, että nämä pari Corbett-päivää tulisi olemaan melkoista pölyn nieleskelyä. Myös vaatteiden ja kameralaukkujen päälle kertyi melkoinen pölykerros.

Matkan varrella pysähtelimme useita kertoja. Erään kerran Karan pysäytti jeepin keskelle metsää ja osoitti taka(!)viistoon ja ylös vasemmalle. Kesti hetken haroa katseella oksistoa, ennen kuin sieltä hahmottui kellanruskea, iso möykky: päivehtivä vuorikalahuuhkaja! Tovin ihmeteltyämme hoksasimme toisenkin yksilön, eli pariskuntahan siellä oli päivätorkuilla.

Nautimme picnic-lounaan erään puiston keskellä sijaitsevan, ilmeisesti puistonvartijoiden asuttaman, tilan kuistilla. Aurinko lämmitti mukavasti avoimella pihalla, sisällä metsikössä avojeepin kyydissä oli itse asiassa varsin vilpoisaa, vaikkakaan ei kylmä. Lounaan jälkeen saavuimme pian Dhikalan ruohotasangolle ja Corbettin läpi virtaavan Ramganga-joen patojärven rannalle. Pääsimme mm. kuvaamaan hienosti aromerikotkaa (Pallas's Fish-eagle). Kiuruja ja kirvisiä sinkoili runsaasti pitkin matalaa heinikkoa. Joukossa oli neljä ylänkökiurua (Bimaculated Lark), mikä on alueella varsin harvalukuinen vieras.



Aromerikotka poseerasi patojärven rannalla.

Illan alkaessa hämärtää pääsimme myös kunnon tiikerijahdin makuun. Ruohotasangolta kuuluneet aksiskauriiden (Spotted Deer) varoittelut saivat jeeppeihin vauhtia niin, että osa porukasta oli tippua kyydistä. Varoittelut kuitenkin jäivät yksittäisiksi, joten jos kauriiden havainto tiikeristä oli oikea, se ei ainakaan metsänreunasta tasangon puolelle tullut.

Päivän lajimäärä 106.



Eläimet ovat Intiassa kesyjä. Tämä muntjakki ruokaili Dhikalan pihassa.

23.11.

Aamun vasta sarastaessa nautimme pikaiset teet ja kahvit ja suoriuduimme taas tiikerijahtiin. Onni ei taaskaan ollut myötä, vaikka tuoreita jälkiä hiekkaan olikin yön aikana painautunut. Jokivarteen aamupesulle saapunut pieni villien aasiannorsujen lauma pienine poikasineen oli kuitenkin mukavaa katseltavaa. Aamiaiselle palasimme tiikerin suhteen tyhjin käsin.

Aamiaisen jälkeen perehdyimme Dhikalan pihapiirin lajistoon. Koko shown varasti pihan vieressä, patojärven penkalla saalistelleet ja pitkään paikallaan poseeranneet kaksi siniampiaissyöjää (Blue-bearded Bee-eater). Kauempana patojärvellä oli lisäksi jokitiiraja (River Tern), useampi sata sorsaa, lähinnä taveja, muutama intianpaksujalka (Great Thick-knee) sekä monilajisesti haikaroita, mm. massiivinen satulahaikara (Black-necked Stork) ja piispahaikara (Woolly-necked Stork). Myös pari krokotiilia köllötteli rantahiekalla.



Iso norsu, pikku norsu ja siniampiaissyöjä olivat aamupäivän ”vetonaulat”

Päivällä kõnysimme jeepeillä pientä ja kuoppaista uraa pitkin jokivarteen, mikä ei kummoisia tarjonnut. Palatessa sen sijaan pienen puron ylityksen kohdalla eka jeepistä nähtiin ruskosuokanan (Brown Crake) juoksevan tien yli. Pysähdyimme sitä odottelemaan, niin yli lensi bramiinikottaraisia (Brahminy Starling) ja laskeutui läheisiin pensaisiin, mihin kohta ilmaantui myös viidakkomainoja (Jungle Myna) ja intianvihertikkapari (Streak-throated Woodpecker). Samassa tien yli lensi bambutimaleita (Chestnut-capped Babbler) yksi toisensa jälkeen varmaan kymmenkunta. Ne jäivät läheiseen heinikkoon, ja vaikka näkyivät vain vilaukselta, ääni kuultiin hyvin. Laji on täällä ilmeisen kova, sillä kuskimme kuittasi siitä eliksen! Myös ruskosuokana innostui pilisemään ruohikon seasta.



Iltapäivä kierreltiin taas ruohotasankoa ja reunametsiä tiikerin toivossa, mutta turhaan. Olimme jo palaamassa takaisin, kun joku Dhikalan henkilökunnasta huitoi ja huusi meille kovaa. Samassa lähdimme rynnistämään päätien varteen metsän reunaan, missä on pitkä suora ja metsään tien viereen raivattu leveämpi avoin käytävä. Ilmeisesti siinä oli tiikeri hetki sitten ollut, mutta meille näyttäytyi vain yksi aksiskauris.

Päivän lajimäärä 103.

Retkeilyä Corbettin malliin avojeepeillä, eli Gypsyillä.

24.11.

Aamun ohjelma oli eilisen toisinto: aktiivista tiikerin hakua. Jossain vaiheessa yksi kolmesta jeepestä jäi muista jälkeen, kääntyi väärästä risteyksestä ja eksyi porukasta lähes puoleksi tunniksi. Yksi punarintakaija (Rose-breasted Parakeet) oli "eksyneiden lampaiden" tuomisina muun porukan löydyttyä. Tiikeri ei taaskaan meille antautunut, mutta lintupuolella riitti katseltavaa. Ehdottomasti komeinta aamun antia oli kuolleen puun latvassa istuskellut keisarisarvinokka (Great Hornbill), joka valitettavasti huomattiin vasta keskimmäisestä jeepestä etummaisen "nolla-auton" jatkaessa matkaa. "Kusipaikaksi" nimetyltä tilalta, missä todellakin pysähdyimme useita kertoja, kuten tänäänkin, listoihin lisättiin ainakin intianvarpuspöllö (Jungle Owlet), liekkiminivetti (Long-tailed Minivet) ja aasianvihervarpunen (Yellow-breasted Greenfinch). Myös jalokotkapari rakensi pesää viereisessä metsikössä.

Aamiaisen jälkeen matkatavaramme nostettiin yhteen jeeppiin. Lähetimme sen kohti porttia meidän jatkaessamme lintujen katselua ja tiikerin etsimistä. Suuntasimme vielä kerran Dhikalan ruohotasangolle. Emme päässeet pitkälle, kun huomasimme osittain tien päälle oksiaan kurkottavassa puussa saalista syövän, pienen mutta pippurisen ja koristeellisen värikkään himalajanhaukkanen (Collared Falconet).

Pitkän kuvausrupeaman jälkeen pääsimme viimein tasangolle saakka, missä tällä kertaa uusina lajeina näkyi mm. punapäänarsku, tuulihaukka ja pikkutylli. Lintujen katselu tosin keskeytyi äkisti metsänreunasta kuuluneen kauriin varoituksen seurauksena. Nopean ja pölyisen pyrähdyn jälkeen odottelimme tovin, mutta rauha oli taas laskeutunut, eikä tiikeristä enää ollut merkkiäkään. Aksiskauriit käyskentelivät hyvin rauhassa, välittämättä kahdesta rannalla loikoilevasta valtavan kokoisesta gaviaalista ja yhdestä pienehköstä krokotiilista.



Vain noin tilhen kokoinen himalajanhaukkanen on värikäs ja äkäinen peto.

Jatkoimme kiertoteitä pitkin kohti porttia, kunnes taas tiellä näkyi ihan tuoreet tiikerin jäljet. Ajoimme läheiselle paikalle, mistä on hyvä näkyvyys pitkälle jokiuomaan ja stajailimme tovin, josko se tulisi tien suunnasta joelle. No eipä tullut. Palasimme tielle, missä punaviidakkokana (Red Junglefowl) varoitteli pitkään ja aktiivisesti. Mistä lie, se ei meille koskaan selvinnyt. Nyt kai oli viimeistään heitettävä toivo tiikerin näkemisestä Corbettissa. Onneksi on vielä Ranthambhore jäljellä.

Paluu ihmisten ilmoille tapahtuikin sitten kerralla kunnolla, kun ajoimme lounaspaikallamme, Karanin omistamaan ravintolaan, Ramnagarin kaoottisen vilkkaan kaupungin läpi. Maittavan lounaan jälkeen nousimme taas tutuille bussin penkeille ja aloitimme pitkän ja mutkaisen nousun kohti Nainitalia. Pimeys ehti jo laskeutua ennen perille saapumistamme. Hyvätasoinen hotelli tuntui vielä entistäkin paremmalta muutaman päivän pölyn nieleskelyn ja varsin vaatimattoman Dhikalan majoituksen jälkeen.

Päivän lajimäärä 116, ja retken yhteislajimäärä kahden ensimmäisen paikan jälkeen 189.

25.11.

Aamu valkeni varsin viileänä, Nainitalin kaupunki kun kuitenkin sijaitsee n. 2000 metrin korkeudella. Lähdimme taivuttelemaan bussiamme kapeita serpentiiniteitä takaisin tulosuuntaamme, mutta tällä kertaa pistimme parkkiin jo parin kilometrin jälkeen. Himalajannaurutimalit (White-throated Laughingthrush)

toivottivat meidät tervetulleiksi heti bussista noustuamme. Lähdimme kävelemään ilmeisesti vanhaa, kivillä päällystettyä kärrypolkua pitkin. Pian kuului pikkulintuparven ääntä. Parvi reagoi hyvin voimakkaasti vihellettyyn kaulusvarpuspöllön (Collared Owlet) rytmikkääseen viheltelyyn. Valitettavasti parvi oli hyvin korkealla puissa, joten määrittäminen oli jokseenkin haasteellista. Silti parvesta irtosi tukku uusia lajeja, mm. himalajanpyrstötimali (Rufous Sibia), vuoriviirubulbuli (Mountain Bulbul), kuusitiainen ("Spot-winged Tit"), joka on kyllä hyvin erinäköinen kuin meikäläinen, hyvin söpö ja sympaattinen harlekiinipyrstötiainen (Black-throated Tit) sekä naamiolehväkerttu (Black-faced Warbler).

Kävely jatkui, mutta lintuaktiviteetti hiljeni yllättävänkin paljon lupaavan alun jälkeen. Komea (himalajan)sinipyrstöpari näyttäytyi lyhyesti ja muutama pikkunaurutimali (Streaked Laughingthrush) hyppeli uran penkalla. Pian saavuimme paikalle, mistä avautui laajempi näköala. Eipä aikaakaan kun taivalta löydettiin ensimmäiset kaartelevat pedot. Valtaosa linnuista oli arokotkia, joukossa muutama hanhikorppikotka. Parasta antia oli kuitenkin pari kertaa lyhyesti näyttäytynyt nuori partakorppikotka.

Tovin stajattuamme lähdimme jatkamaan eteenpäin, mutta pian totesimme puuskuttaen, että Karanin ilmoittama kahdeksan kilometrin taival on meille ylivoimainen. Palasimme siis takaisin bussille ja siirryimme eri paikkaan, Nainitalin kaupungin pohjoispuolelle. Erään mutkan takaa avautui täysin yllättäen upea näköala maailman katolle, eli Himalajan lumihuipuille. Mm. Intian korkein vuori, yli 7800 m korkea Nanda Devi näkyi hienosti. Maisemia kylliksemme ihasteltuamme ja kuvattuamme jatkoimme kävellen tietä eteenpäin. Tien varrella olevalta temppeliltä kuului kovaaäänistä jatkuva rukouslaulu, mutta emme antaneet sen häiritä. Yritimme houkutella lintuja näkösälle kaulusvarpuspöllön vihellyksellä ja muutamia pikkuparvia tulikin varoittelemaan. Vaatimattoman näköinen kerttutiainen (Yellow-browed Tit) kirjattiin uutena lajina. Myös komea mahtijalokotka kaarteli vuorten rinteiden yllä.



Näkymä maailman katolle, eli Himalajan huipulle. Oikealla oleva korkein huippu on Intian korkein vuorenhuippu, Nanda Devi, 7816 m.

Palasimme hotellille lounaalle, minkä jälkeen jatkoimme takaisin Corbettiin johtavaa tietä aamua pidemmälle. Pysähtelimme pari kertaa maatalousvoittoisessa ympäristössä viljelysten reunapusikoita ja oijen uomia koluamaan. Anti oli kuitenkin varsin vaisua. Karankin ihmetteli, että lintuja on jostain syystä normaalia vähemmän. Mahdollisesti normaalia lämpimämmän syksyn vuoksi osa linnuista oli vielä ylempänä vuorilla, eivätkä olleet tulleet vielä talvehtimaan normaaleille alueilleen. Värikäs kanelivarpunen (Russet Sparrow) ja liekkiiskatikka (Brown-fronted Woodpecker) jatkoivat kuitenkin lajilistaamme. Myös taigakirvisiä päästiin ensimmäistä kertaa kunnolla näkemään.


Sitten jatkoimme eteenpäin Mangolin kylään ja sen viereiseen rehevään laaksoon. Laakson toista puolta alas kylään johtavaa tietä rakennettiin juuri autolla ajettavaksi. Lintupuoli oli todella hiljaista. Alhaalla laakson pohjalla kuitenkin oli lintuja ihan mukavasti mm. kultasiipitimali (Chestnut-crowned Laughingthrush), pitsihaarapyrstö ja parvi todella komeita loistoharakoita. Osa porukasta ”nuijasi” lajin The Denissä, joten paikko hoitui komeasti. Ilta alkoi jo hämärtää, kun aloitimme nousun takaisin kohti tietä. Juuri ennen perille saapumistamme, jo melko hämärässä, hokasimme vielä yöpymiskoloa etsivän kuningasseppäparin (Great Barbet). Pimeys oli jo taas laskeutunut kun bussimme kaartoi kapeasta portista hotellin oven eteen.

Päivän lajimäärä 56.

26.11.

Aamulla starttasimme jo klo 4.45. säkkipimeässä ja täyden kuun loistaessa taivaalla. Taivuttelimme kapeita ja mutkaisia, oletettavasti korkeiden jyrkänteiden reunalla kulkevia teitä vielä ylemmäs kohti Himalajaa. Määränpäähämme, lähes puuttomalle vuorenrinteelle saavuimme juuri auringon noustessa. Paikka tunnetaan epävirallisesti nimellä Cheer Pheasant Overlook, eli harmaafasaanin katselupaikka. Ja se oli kohteena meilläkin. Pitkään skannasimme heinikkoisia rinteitä ilman tulosta. Himalajanrautiaisia (Altai Accentor) liiuskeli edestakaisin isoina parvina ja kalliopääskyjä lenteli taivaalla. Yhtäkkiä kuitenkin yksi harmaafasaani löytyi hyvin heinikkoiseen rinteeseen sulautuvasta värityksestään huolimatta. Kun aloimme katsella lintua, totesimme, että niitä oli ainakin viisi. Välillä ne ruokailivat ihan avoimesti, välillä niistä ei näkynyt yhtäkään. Mukaan pakattu retkiaamiainen maistui tämän jälkeen erityisen hyvälle!

Lähdimme kävelemään fasaanipaikalta takaisin tulosuuntaan samalla lintuja katsellen. Kallio- ja ruostepääskyjen seasta huomasimme muutamia piskuisia nepalindräystäspääskyjä (Nepal House Martin). Pian saavuimme puurajalle ja sukelsimme satumaiseen, sammalten peittämään metsään. Mm. miljoona pientä reikää puiden kylkiin poraillut rusovatsatikka (Rufous-bellied Woodpecker) näyttäytyi hienosti. Metsän siimeksestä löytyi myös pieni parvi lepinkäistimalieita (White-browed Shrike-babbler), jotka kävivät hyvin kuvattavissakin. Yllättävin havainto oli kuitenkin edessämme tiellä pomppinut nuori ruostesiipiras (Dusky Thrush), jota ei kirjan levinneisyyskarttojen mukaan ole kovin montaa kertaa Intiassa havaittu. Myös Karanille havainto lajista oli ensimmäinen.



Päivän yllättäjä, ruostesiipiras ja Himalajan esivuoriston värikäs erikoisuus, lepinkäistimali.



Jatkoimme bussilla takaisin kohti Nainitalia. Pienen kylän kohdalla pysähdyimme risteykseen, mistä jatkoimme kävellen osittain puutonta rinnettä seuraavalle sivutielle. Täällä käytiinkin sitten melkoinen nuijasota: hetkessä edellä kulkenut Karan huusi meille mustakurkkusirkun (White-capped Bunting), louhikkorautiaisen (Rufous-breasted Accentor) ja himalajanpunavarpusen (Pink-browed Rosefinch), joista mikään ei ollut enää näkyvissä meidän ehtiessämme paikalle. Noh, kaikkea ei voi saada.

Rusovatsatikka tähtäimessä.

Meille oli haalattu lämmin lounas hotelliltamme ja nautimme sen kylän keskellä kadun varrella kissojen ja koirien seurassa innokkaina. Iltapäivän vietimme Jungle Loressa, mitä useat alueella vierailevat lintuporukat käyttävät majoittumiseen. Paikan omistaja on lintukuvaaja ja hän oli virittänyt pihapiiriin mm. kuvauskojun juomapaikkoineen. Kojun edessä vierailikin mm. kultasiipitimali ja punakylkitimali (Rusty-cheeked Scimitar-babbler). Muutenkin lintuja oli hyvin, mm. himalajannärhiä (Black-headed Jay), pikkunaurutimaleita ja vasta kuvista Suomessa määrittynyt naaras tulipyrstömedestäjä (Fire-tailed Sunbird). Myös himalajanpunavarpunen saatiin paikattua. Vaikka paikka oli leppoisa ja katseltavaa olisi riittänyt, meidän oli lähdettävä jatkamaan matkaa ehtiäksemme takaisin hotelliin ennen pimeän tuloa.



Jungle Loren kojun edessä kävivät poseeraamassa kultasiipi- ja punakylkitimalit.

Päivän lajimäärä 65.

27.11.

Aamulla jouduimme taas hyvästelemään matkalaukkumme. Tai oikeastaan saimme hyvästellä, sillä ne pakattiin bussiimme, joka lähti maanteitse takaisin kohti etelää ja Agraa. Ne olisivat odottelemassa meitä Agran asemalla reilun vuorokauden kuluttua seuraavana päivänä, kun saapuisimme junalla sinne, eikä meidän näin ollen tarvinnut haalata laukujamme mukana yöjunassa, minkä kaikki totesimme olevan kerrassaan loistava järjestely.

Me puolestamme jatkoimme tämän päivän retkeä kolmella henkilöautolla. Ensimmäinen kohteemme oli heti kaupungin laidalla oleva paikka, mikä oli kai jonkinlainen majoitusyritys sekin. Paikka oli hyvin rehevän metsän keskellä ja lähdimme kävelemään parkkipaikalta hyväkuntoista polkua pitkin. Pääkohteenamme oli viidakkopyy (Hill Partridge). Ensimmäiset rapinat pusikosta osoittautuivat jo usein nähdyiksi teräsfasaaneiksi (Kalij's Pheasant), mutta toinen kerta toden sanoi. Pieni parvi viidakkopyitä hiippaili puskien alla kuivat lehdet rapisten. Soitimme niille hieman atrappia, mistä yksi koiraista innostui niin, että käveli ohitsemme ihan vierestä ja aloitti huutelun. Hieman kauempana pääsimme myös kuvaamaan avoimella kohdalla ruokailevaa naarasta.



Viidakkopyy oli aamun parasta antia. Kuvassa naaras. Myös idänturturikyyhky istui kuvauksellisella oksalla.

Muitakin lintuja metsässä toki oli. Niistä näkyvimvät ja kuuluvimmat olivat himalajannaurutimalit, joita olikin varsin iso parvi. Ne riehuivat puissa naukuen ja säksättäen ja ylittivät polkumme tekemän aukon metsässä kuukkelimaisesti ylitsemme liitäen.

Seuraavana vuorossa oli vähemmän upea luontokohde, nimittäin Nainitalin kaatopaikka. Täällä kaatopaikka on järjestetty siten, että se sijaitsee jyrkän ja syvän rotkon pohjalla, minne jätteet kipataan rinnettä seuraavalta tieltä. Eli itse kaatopaikalle meidän ei tarvinnut mennä, vaan katselimme kaatopaikan ylle kippauspaikan kohdalta tieltä. Sää oli harmaa ja vähän sateinen ja harmautta korosti alhaalta nouseva palavien jätteiden sininen savu. No miksi ihmeessä me tänne sitten itsemme tungimme? Tätä ilmestyi kummastelemaan myös paikallinen radiotoimittaja, jonka haastattelun uhreiksi joutuivat Kormanon Hannu ja ak. Vastasimme hänelle totuudenmukaisesti, että ei meitä jätteet ja saasteet kiinnosta, vaan kaatopaikan antimia hyödyntävät arokotkat. Valitettavasti tuhrusen sään vuoksi kotkat eivät olleet lennossa, vaan istua jurottivat rinteiden isoissa männyissä. Komea koiras isokivikkorastas (Chestnut-bellied Rock-thrush) sentään poseerasi meille mukavasti. Näin ollen emme kauaa paikalla viihtyneet, vaan jatkoimme melko pikaisesti matkaa.

Pian pysähdyimme taas, tällä kertaa tien kulkiessa lähinnä meikäläisiä mäntyjä kasvavan metsän keskellä. Joku hoksasi korkealla rinteiden päällä puun latvassa istuvan petolinnun. Tasaisen pikimusta selkä ja pieni töyhtö päässä saivat kaikkien määritystaidot suttaamaan tyhjää. Aikamme ihmeteltyämme se kääntyi sen verran, että valkoinen kaula sekä ruosteenpunainen ja juovikas vatsa näyttäytyi: rusovatsakotkahan (Rufous-bellied Eagle) se. Varsinainen kohdelajimme tällä pysähdyksellä oli kuitenkin himalajankäpytikka (Himalayan Woodpecker), ja pariskunta löytyikin pian männynkylkiä koputtelemasta.

Jatkoimme edelleen alaspäin kiemurtelevaa tietä ja pian ylitimme joen yli kulkevan sillan. Heti sillan jälkeen pysähdyimme ja kävelimme pienen kylän läpi kulkevaa polkua. Polku kulki kapean, rakennetun kastelukanavan vartta pitkin. Kanavan yhteyteen oli rakennettu myös pieni mylly, joka oli vielä toiminnassa,

aivan kuin Suomessa reilu 50 vuotta sitten. Linnuista paikka tarjosi mm. naamioviidakkoaharakan (Grey Treepie) ja raitavarpuspöllön (Asian Barred Owlet). Myös smaragdikyyhkyjä (Emerald Dove) näkyi pari kappaletta – osalle porukasta...

Olimme taas olleet monta tuntia syömättä, joten oli aika jatkaa lounaalle. Ravintolan kyltissä luki "Authentic Italian Restaurant". Noh, pizzaa emme saaneet, vaan "normaali kattauksen" erilaisia maukkaita intialaisia kasvisruokavaihtoehtoja. Taas yksi mielenkiintoinen yksityiskohta intialaisten tavoista paljastui, kun tilasimme oluet. Henkilökunta kävi juoksemassa ne läheisestä kaupasta. Kun kaadoimme oluen laseihimme, Vinod näytti kiusaantuneelta ja pyysi meitä peittämään lasit lautasliinoilla. Täh??? Alkoholi oli tässä ravintolassa kuulemma uskonnollisista syistä kielletty, joten oluen "avoin" nauttiminen ei ollut suotavaa. Lasista juominen sitä oli, pullosta nauttiminen sen sijaan ei. Tämä ratkaistiin käärimällä lasit lautasliinoihin. Että semmosta. Noh, olimme jo lukemattomia kertoja todenneet sen, että "Intia yllättää aina". Sivutuotteena ulkoterassilla sijaitsevasta lounaspöydästä irtosi tumman muodon pikkukotka (Booted Eagle).

Päivän viimeisenä kohteena oli järven rannalta lähtevän kanavan vartta seuraava polku, mitä kävelimme muutamia satoja metrejä. Hämärän sään vuoksi metsän sisällä laakson pohjalla oli aika hämärää. Kuulimme kahden keltapittakerttusen (Chestnut-headed Tesia) vuoropuhelua, mutta emme onnistuneet näkemään niistä kuin vilauksen. Muutenkin lintuaktiviteetti alkoi olla jo hiljaisen puoleista. Paluumatkalla törmäsimme kuitenkin kahteen hyvin värikkääseen oranssikurkkutimaliin (Rufous-chinned Laughingthrush), jotka lymyilivät polun varren puskissa. Tämä oli viimeinen matkan pohjoiselta osuudelta naulattu laji, ja retkipinnamittari näytti lukua 242 meidän jatkaessa kohti Kathgodamin kaupunkia ja juna-asemaa, mistä hyppäsimme yöjunaan kohti Delhiä.

28.11.

Herätyskello soitti klo 3.30, kun meidän piti olla lähellä Old Delhin rautatieasemaa. Kävi ilmi, että juna oli noin tunnin myöhässä. Tämä puolestaan aiheutti sen, että siirtyminen New Delhin rautatieasemalle, mistä junamme Agraan lähti, piti tehdä varsin ripeästi. Hyvin ehdittiin kuitenkin.

Agran asemalla meitä odotti tuttu bussimme ja hymyilevä kuskikaksikkomme. Tässä vaiheessa porukka jakaantui kahtia, kun Kurikan pariskunta ja Kormanon Hannu vietiin päiväksi golfaamaan Agraan meidän jatkaessa bussilla kohti Chambal Safari Lodgea. Matka sujui katkonaisesti junassa nukutun yön vuoksi itse kultakin enemmän tai vähemmän pilkkien, joten lintuhavainnot jäivät vähäisiksi.



Agran laitakaupunkia. Tämä kuva voisi olla oikeastaan mistä vain Intian kylästä tai kaupungista.

Perillä Chambal Safari Lodgella olimme jo noin klo 11. Majoituimme mukaviin bungalow- tyyppisiin mökkeihin. Ennen lounasta ehdimme vähän tutustua lodgen pihapiirin elämään. Kaljulenkot (entiseltä nimeltään intianlentäväkoira), eli valtavan isot, hedelmiä syövät lepakot, mekastivat yhdessä isossa puussa. Ilmeisesti päiväroikkumisoksasta vallitsi kollektiivinen erimielisyys. Pikkusiepot rutisivat, kashmirin- ja idänuunilinnut hihkuivat ja variskäki (Asian Koel) huuteli.

Lounaan jälkeen lähdimme paikallisoppaamme kanssa kävelyreissulle lodgen ympäristöön. Meille oli pohjustettuna ihan pihapiirissä, muutaman kymmenen metrin päässä toisistaan, kolmen pöllölajin päiväntuntisoksa: haukkapöllön (Brown Hawk Owl), brahmanpöllön (Spotted Owlet) ja sepelpöllösen (Indian Scops Owl). Pihalta jatkoimme ympäröiville pelloille. Noin parin kilsan reissun antia olivat mm. aasianrakonokka (Asian Openbill), aasianpyhäibis (Black-headed Ibis), arohiirihaukka (Long-legged Buzzard), etelänisolepinkäinen (Southern Grey Shrike), nokitasku (Pied Bushchat) sekä riisi- (Baya) ja bengalinkutoja (Black-breasted Weaver). Reittimme vei pieneen kylään, missä joukkomme tietysti herätti paikallisten innokkaan huomion. Parilla kosteikkomontulla oli runsain mitoin liroja ja sitruunavästäräkkejä. Yhdessä kohtaa polku vei kivimuurin seinää vasten pienen puron yli. Ylityskohdalla (lankku) me, meitä seuraavat paikalliset ja vastaan tullut vuohi aiheuttivat liikenneuhkan ja pattitilanteen, kun Leena ei päässyt perääntymään lankulta takana olevan ihmisjoukon vuoksi ja lankun toisessa päässä vuohi ei perääntynyt ihan vaan itsepäisyyttään. Tilanne laukesi vuohen loikkaan Leenan ohi, eli kummankaan ei tarvinnut tilanteessa perääntyä ja kasvojaan menettää. Päivän lajimäärä 81.



Pronssijassanalla on komeat varpaat!

29.11.

Aamu valkeni sumuisena. Aamiaisen jälkeen ajoimme bussilla halki laajojen viljelysten ja kylien, kunnes maisema muuttui äkisti kuivaksi ja erikoisten hiekkamuodostelmien hallitsemaksi. Hiekkakumpujen välissä oli piikkipensaita, joiden latvoissa heilui bramiini- ja punakottaraisia (Rosy Starling). Myös pieni viidakkopensasviiriäisparvi (Jungle Bush Quail) viipotti sukkelaan piiloon, ei kuitenkaan liian nopeasti, että kaikki ehtivät ne nähdä. Kauluskaijat esittivät kummallisia soidinmenojaan roikkumalla sähkölangasta pää alaspäin.

Pian tämän jälkeen tie vei Yamuna-joen yli. Sillalta näkyi mm. yllättävä riuttahaikara (Western Reef Egret), mustavatsatiira (Black-bellied Tern) ja mustapäälökkeja (Pallas's Gull).

Matka jatkui taas viljelysseudulle, missä pysähdyimme pienelle kosteikolle. Täällä näkyi mm. reissun ainoa himalajankirvinen (Rosy Pipit) ja tukku tavallisempia kosteikkolajeja. Kosteikon viereiseltä pellolta hoksasimme yhden koko reissun tärkeimmän kohdelajin pään. Todellakin, maailman korkeimman lentävän linnun, saruskurjen (Sarus Crane) pää pilkisti korkeasta heinikosta, huolimatta vieressä työskentelevistä riisinpuijista. Muita uusia lajeja olivat ruskopääsirkku (Red-headed Bunting) ja punapyrstölepinkäinen (Isabelline Shrike).

Pitkästi ei tarvinnut tältä paikalta jatkaa, kun pääsimme mässäilemään komealla saruskurjella jo oikein kunnolla, kun yksi komistus patsasteli avoimella hiekkakentällä tien vieressä. Ja taas olimme tyytyväisiä, että filmiaika on taaksejäänyttä elämää, sen verran tiuhaan kameroiden sulkimet kävivät.

Aamupäivän retkemme päätepisteessä oli kaksi erillistä kosteikkoa, jotka tarjosivat taas uutta lajistoa. Kosteikon vieressä puun latvassa oli savannikotkan (Tawny Eagle) pesä, ja pääsimme pikaisesti näkemään

molemmat emolinnut. Myös jonkin taksonomian mukaan oma lajinsa, "intiankiljukotka" (Indian Spotted Eagle), *Aquila hastata*, kävi kaartelemassa kunniakierroksen peltojen yllä. Kosteikoilla oli runsaslajisesti haikaroita ja kahlaajia. Yllättävin lajeista oli Frimanin Hannun hoksaama rantakurvi (Terek Sandpiper).



Saruskurki koko korkeassa komeudessaan.

Seuraavana vuorossa olikin piiiiiitkä ajomatka takaisinpäin. Emme kuitenkaan menneet takaisin lodgelle, vaan ohjelmassa oli veneretki Chambal-joella. Käsittämättömän ruuhkaisen ja vilkkaan kylän läpi tungettuamme pääsimme viimein jokirantaan, minne kävelimme viimeiset sadat metrit. Picnic-lounas oli meitä jo odottamassa ja se tuli jo tarpeeseen.

Pikaisen lounaan hotkaisun jälkeen jakauduimme kahteen veneeseen, joilla lähdimme päristelemään tuskin havaittavaan ylävirtaan. Jokivarren hietikoilla lojui useita krokotiileja ja gaviaaleja, joukossa todellisia, yli viisimetrisiä monstereita. Linnuista runsaita olivat intianviheltäjäsorsat (Lesser Whistling-duck), kirjokalastajat (Pied Kingfisher) ja tiibetinhahet (Bar-headed Goose). Komea vuorikotkapari (Bonelli's Eagle) lensi peräkanaa joen yli. Ajelimme hissukseen ja pian venekuskimme kuulikin odotetun molskahduksen: gangesindelfiini (Ganges River Dolphin) oli käynyt pinnalla. Seuraavan hyppäyksen näimme mekin. Ei yksi, vaan kaksi yksilöä tätä erittäin uhanalaista ja erikoista vesinisäkästä hyppäsi yhtä aikaa pitkää nokkaansa esitellen. Komeaa!



Krokotiili ja intianviheltäjäsorsia Chambal-joen rannalla

Toinen veneretken kohdelaji, intiansaksinokka (Indian Skimmer) sen sijaan ei suostunut näyttäytymään. Ei, vaikka allekirjoittanut kovasti lajia hiekkasärkkien päällä lentäneistä pitkäjaloista yritti vääntääkin. Delfiinit, krokot ja gaviaalit varmistivat kuitenkin sen, että hyvillä mielin palasimme illan jo pikkuhiljaa hämärtyessä takaisin rantaan. Penkalle noustuamme yritimme vielä epätoivoisesti haroa jokivartta alavirtaan päin saksinokkien toivossa. Vaikka niitä ei edelleenkään löytynyt, hukkaan ei tihrustaminen mennyt: Kormano nimittäin kepitti rannasta yksinäisen neitokurjen (Demoiselle Crane)!

Illalla listan tekeminen kesti ikuisuuden. Porukan juttu lähti laukalle ja lapasesta yhtenään eikä nauramisesta meinannut tulla loppua. Lisäksi henkilökunta tuli kesken kaiken hakemaan meitä ulos: joku oli hoksannut lampulla pihan reunalla kipittävän pakistaninsiilin (Indian Long-eared Hedgehog). Pieni ja tumma siili oli jähmettynyt taskulamppujen valoihin ja hetken sitä ihmeteltyämme jätimme sen rauhaan. Siiliä ei kuulemma välttämättä havaita Lodgella edes joka vuosi, joten kova havis oli kyseessä ja henkilökunnan tohinastakin sen huomasi. Myös sivettikissoihin kuuluva musanki (Asian Palm Civet) viuhahteli lähipuussa valokeiloja vältellen.

Päivän lajimäärä koko reissun korkein, 129 ja Chambalin jälkeen retkipinnoja 299.

30.11.

Tämä päivä oli täysin turistipäivä. Palasimme Chambalilta Agraan, missä vierailimme mykistävän upeassa Taj Mahalissa. Lintuhullu porukka kun oli kyseessä, emmehän me kokonaan malttaneet olla lintuja katselematta sielläkään. Komeammat eivät olisi voineet puitteet olla 300 retkipinnan katkaisulle, kun mausoleumin vieressä virtaavalta Yamuna-joelta löytyi käärmeauka (Darter). Päähuomio kuitenkin oli ansaitusti tässä valkomarmorisessa monumentissa ja sen historiassa.



Ryhmä Taj Mahalin edustalla

Taj Mahalista jatkoimme varsin luksustasoisen lounaan jälkeen toiselle monumentille, Fatehpur Sikrille. Vähän alkoi porukka jo hyytyä oppaan kertomuksiin Akbarin vaimoista ja heitä varten tehdyistä rakennuksista, mutta ainutlaatuinen ja hieno paikka joka tapauksessa, täynnä historiaa.

Seuraava kohteemme, Keoladeo Ghanan kansallispuisto Bharatpurissa sijaitsi onneksi vain parinkymmenen kilometrin päässä Fatehpur Sikristä, joten pääsimme pian majoittumaan puiston sisällä sijaitsevaan hotelliimme.

1.12.

Aamulla lähdimme kävelemään Keoladeon portille, missä oli havaittu talvehtiva rubiinisatakieli. Portinvartija kertoi, että parhaiten lintu on näyttäytynyt yhdeksän jälkeen aamulla. Ohjelmassa oli veneretki kansallispuiston kanavissa ja altaissa, joten lähdimme portin vierestä kanavan päästä kahdella intialaismiehen sauvomalla veneellä. Emme päässeet pitkälle, kun kanavan päällä oksistossa liikahti jotain. Tarkistus kiikareilla osoitti liikahtajan komeaksi, järkyttävän pitkäpyrstöiseksi ruskean muodon paratiisimonarkiksi (Asian Paradise Flycatcher)! Lintu kähmyili taitavasti puun sisällä, mutta lensi pian pyrstö perässä lepattaen kanavan yli toiselle puolen. Ei huono aloitus.

Kanavan avautuessa laajemmaksi kosteikoksi alkoi paljastua, mistä Keoladeossa oikein oli kysymys. Satoja sorsia, kymmeniä haikaroita sekä useita käärmekeuloja ja nilgai-antilooppeja oli yhtä aikaa näkösällä. Pian oppaamme Rana osoitti puun oksalla torkkuvan harmaakehrääjän (Grey Nightjar). Kuvausession jälkeen lähdimme takaisin päin ehtiäksemme aikataulussa rubiinisatakieltä vastaanottamaan. Ajoitus olikin täydellinen. Portille saapuessamme portinvartija kertoi nähneensä linnun hetkeä aikaisemmin. Asetuimme tuijottamaan hämärää, oksien peittämää monttua, missä lintu viihtyi. Kohta se löytyikin pomppimassa montun pohjalla rubiinin kurkku loistaen. Kuvaamista ajatellen lintu ei oikein ollut yhteistyöhön halukas, mutta näin hienon lajin näkeminenkin sai hymyn kaikkien kasvoille.



Keoladeo Ghana National park.

Jatkoimme portilta kävellen yhtä tieuraa pitkin. Vesilintujen määrä oli päättä huimaava ja uusia lajeja retkelle tipahteli tuon tuostakin. Valitettavasti alkoi tipahdella myös vettä. Koko aamun kuuluneet ukkosen jyrähtelyt kuuluivat koko ajan lähempää ja taivas tummui uhkaavasti. Niinpä palasimme takaisin lähtösuuntaamme emmekä päässeet kiertämään laajaa allasta, kuten tarkoitus oli. Sade pääsi yllättämään meidät ennen kuin ehdimme puistonvartijoiden tukikohtaan katoksen alle suojaan. Sadetta pitäessämme päätimme aikaistaa lounasta ja kuuron hieman heikettyä palasimme takaisin hotelliin.

Lounaan jälkeen ukkosrintama oli mennyt menojaan ja aurinko yritti paistaa utuisen ilman läpi. Tällä kertaa meitä odotti kuusi pyörärikshaa kuskeineen. Ahtauduimme niihin ja lähdimme ”rubiinisatakieliportin” läpi toista tieuraa pitkin. Metsäinen tieura kulki keskellä laajoja lintujen täyttämiä kosteikkoaltaita. Oli aasianiibis- (iso pesimäkolonia), rusko-, pikkujalo- ja silkkihaikaroita, pronssi-iibiksiä, sulttaanikanoja, intianviheltäjärsorsia, kiljukotkia ja vaikka mitä. Välillä tuntui että ei tiedä mihin päin katsoa ja kameralla sohia.

Pienen sivupiston varrella pääsimme katselemaan myös harmaahuuhkajaparia (Dusky Eagle Owl) pesällään. Kyyryhaikara poseerasi kameramiehille ihan polun varressa pienen tikun nokassa. Missosen Tapani käveli pahki mustapikkuhaikaraan (Black Bittern), joka valitettavasti teki katoamistempun meiltä muilta. Laji paikattiin kuitenkin paluumatkalla Ranan hoksatessa oksien alla lymyilevän yksilön rikshan kyydistä. Pösön Hannun tavoittelajit hoituivat yksi kerrallaan, kun sulttaanikanat (Purple Swampphen) ja pitkäpyrstöjassanat (Pheasant-tailed Jacana) vielä lisättiin listoille.

Päivän lajimäärä 112.



Kyyryhaikara poseerasi nätisti Keoladeo Ghanan kansallispuistossa.

2.12.

Aamulla jätimme Keoladeon rehevät kosteikot ja vaihdoimme maisemaa kertaheitolla Bharatpurin kaupungin toisella puolella sijaitseville kuiville tasangoille. Ranan täsmäpysähdys keskelle laajaa aukeaa tuotti heti komeat kuusi intianaavikkojuoksijaa (Indian Courser). Koska lintuja, kuten kiuruja, kirvisiä, aavikko- (Desert) ja arotaskuja (Isabelline Wheatear) näkyi mukavasti, päätimme käveleskellä alueella vähän pidempään. Jossain vaiheessa outo ääni sai allekirjoittaneen katsomaan olan yli vasempaan. Järkytykseksi huomasi valtavan kokoisen, valkosiipisen trapin lentävän tien yli. Karjuin jotain sekavaa ja muutkin ehtivät kummajaisen näkemään sen laskeutuessa pellolle. Harmaa pää ja tumma pitkittäisjuova kaulan sivulla varmistivat määrityksen idänkaulustrapiksi (McQueen's Bustard). Ranakin oli kuin klapilla päähän lyöty. Liekö hän soitellut jollekin, kun kohta paikalle porhalsi kaksi tyyppiä kiikarit kaulassa. He lähtivät Ranan johdolla bongamaan trapin meidän jatkaessa tien toiselle puolelle. Jalkavaivainen brahmanpöllö istui pelottomana keskellä peltoa kivisten hätäillessä ympärillä. Yksi kirvisistä osoittautui kalliokirviseksi (Long-billed Pipit). Pian Ranakin palasi takaisin ja kertoi paikallisten sanoneen, että kyseessä oli koko Bharatpurin alueen ensimmäinen havainto lajista, ja että paikallinen sanomalehtikin oli ehtinyt kiinnostua aiheesta.

Nousimme pienelle mäenkumpareelle nähdäksemme peltoaluetta laajemmin. Muutama saruskurki näkyi, mutta uutta lajistoa pellot eivät enää tarjonneet. Niinpä kävelimme takaisin bussille ja jatkoimme patkan eteenpäin. Seuraavalla pysähdyksellä näkyi lisää intianaavikkojuoksijoita, kaikkiaan näimme niitä huppeat 14 yksilöä. Intianpensaskiuruja (Indian Bush Lark) näkyi useita, samoin parvi idänhopeanokkia (Indian Silverbill). Tämän jälkeen palailimme takaisin Bharatpuriin ja lounaalle.

Lounaan jälkeen jouduimme käymään vielä pahemmassa paikassa kuin Nainitalin kaatopaikka. Nimittäin Bharatpurin kaupungin läpi virtaava iso oja oli käytännössä valtava avoviemäri, joka jostain syystä veti puoleensa kahlaajia, mukaan lukien kultakurppoja (Greater Painted-snipe). Onneksi kaksi lintua, koiras ja tätä selvästi värikkäämpi naaras löytyivät melko pikaisesti. Kovin pitkäaikaista ihailua ne eivät saaneet osaksensa, vaan varsin pian suoriuduimme takaisin bussiin ja matkalle kohti rautatieasemaa. Edessä oli muutaman tunnin junamatka kohti viimeistä kohdettamme Ranthambhoren tiikeripuistoa.

Päivän lajimäärä 87 ja Bharatpurin jälkeen retkipinnat 336.

3.12.

Ranthambhoren puisto on turisteille avoinna aamulla klo 7.00–10.30 ja iltapäivällä klo 14.00–17.30. Niinpä aamiainen oli valmis klo 6 ja lähtö hienosta majapaikastamme, The Tiger Denistä klo 6.45. Kukin turistiryhmä arvotaan viidelle eri reitille ja meille ensimmäisen aamun reitiksi sattui nro 4, joka on ainakin maisemiltaan selvästi puiston paras. Se kiertele puiston sydämessä sijaitsevien järvien rantoja. Jos olet katsonut hienot dokumentit Machli-tiikeristä, Lady of the Lake, kuten sitä myös kutsutaan, ne on kuvattu juuri näiden järvien rannoilla.

Aamu oli taas aika sumuinen, eikä järvien koko komeus menomatkalla päässyt oikeuksiinsa. Siispä jatkoimme eteenpäin. Pian tien varressa rullaavan harmaafrankoliiniparven seassa huomattiin vain nyrkin kokoinen tummapyyjuoksija (Barred Buttonquail). Tämän jälkeen ajettiin pidemmälle pienemmälle järvelle, missä pääsimme katselemaan mm. idänmehiläishaukkoja (Crested / Oriental Honey Buzzard).

Palasimme ”pääjärvelle”, minkä rantapuskipäällä hyöri pieni parvi kultasilmätimaleita (Yellow-eyed Babbler). Huppuviidakkoeläimet olivat hyvin kesyjä ja saapuivat auton ympärille pyörimään aina kun johonkin pysähtyi, niin nytkin. Äkkiä varsin läheltä tulosuunnastamme kuului aksiskauriin varoitus. Opas näytti epäröivän hetken. Varoitus kuului uudestaan ja sitten mentiin. Emme ehtineet ajaa kuin sata metriä, kun

näimme tielle pysähtyneen jeepin, joka vilkutti valoja. "Tiger is there", sähähti opas. Rynnistimme paikalle ja jeepin kuski näytti meille että hidastakaa. Äkkiä Tammikedon Timppa huudahti: "Jumalauta, se on tossa ihan edessä!". Todellakin, upea tiikeri käveli arvokkaasti jeepin edessä ja vieläpä kohti sitä. Se ohitti jeepin ihan vierestä meidän katsellessa sen takaa. Meihinkään ei etäisyyttä ollut 20 metriä enempää. Arvokkaasti ja meistä mitään välittämättä se käveli korkean heinikon sisään. Pian se tuli taas näkyviin ja häntäänsä nostaen se jätti merkkinsä yhteen heinätupsuista, tämän jälkeen se katosi heinikon sisään. Tunne oli epätodellinen. Siinä se oli. Reissun täyttymys. Välikättelyt olivat paikallaan.



Tiikerin askelluksessa on kuninkaallista arvokkuutta.

Oppaan mukaan kyseessä oli 22 kuukauden ikäinen naarastiikeri. Vaikka meidän silmiin tämäkin näytti valtavan kokoiselta, aikuinen naaras, urostiikeristä puhumattakaan, on vielä kookkaampi ja rotevampi.

Jäimme odottelemaan, koska tiikerin menosuunnassa tuli järvi vastaan aika pian. Ilmeisesti se kuitenkin jäi päivälevolle jonnekin heinikon kätköihin, koska sen ei havaittu poistuvan teiden ja järven muodostamasta kolmiosta. Siinä odotellessa lisäsimme lintulistoihimme ruskolakkitikan (Brown-capped Pygmy-woodpecker).

Jouduimme luovuttamaan ja lähdimme takaisin kohti porttia kiertäen järven ympäri. Pysähdyimme vielä kerran ihailemaan järvimaisemaa, kun huomasimme kohti tulevan vaaleapäisen pedon. Sääksikö? No ei ollut sääksi, vaan komea bramiinihaukka (Brahminy Kite). Se lensi ohitsemme ihan vierestä esitelleen komean ruosteenruskean, mustan ja valkoisen kirjavaa pukuaan. Laji on täällä ihan levinneisyytensä pohjoisrajalla.

Olihan aamu! Muutaman tunnin siesta safarin ja lounaan välillä kului aamun kokemuksia sulatellessa ja lämpimästä ja aurinkoisesta säästä nauttiessa. Sitä ei enää pitkään riittäisi.

Lounaan jälkeen mentiin taas. Tällä kertaa arpa heitti meidät reitille nro 5. Tämän reitin tie oli järjettömän kuoppainen. Luontokin oli kaikin puolin hiljaisempi, johtuen ehkä osin vuorokaudenajastakin. Jossain kohtaa huomasimme sambarhirven raatoa syövän villisian. Emme arvanneet, että palaisimme paikalle vielä...

Kävimme kääntymässä jossain ja paluumatkalla jeeppi oli parkissa tien varressa. Opas totesi, että tässä on tiikeri lähellä. Noinkohan...? Osaakohan pojat vaan pitää mielenkiintoa yllä...? Muutaman minuutin jälkeen jeepin opas kuitenkin yhtäkkiä osoitti metsään: "Tiger!". Me emme nähneet mitään. Yritimme liikkua autollamme paikasta toiseen, kunnes viimein näimme metsän sisällä rinnettä vasten liikkuvan kookkaan, raitaisen hahmon. Se liikkui kohti kuivunutta jokiuomaa. Rynnistimme sinne. Ajoimme valtavien kivenlohkareiden yli ja ohi ja kohta tiikeri tuli kuin tulikin avoimesti näkyviin uoman pohjalle. Se käveli uomaa pitkin meistä poispäin kadoten pian mutkan taakse. Uskomatonta! Taas tiikeri!

Jokiuomalta poistuminen ei sitten sujunutkaan ihan kuin Strömsöössä. Kuski peruttaa rytkäytti canterimme (12-hengen avoin auto) valtavan kivenlohkareen päälle niin, että taka-akseli lepäsi tukevasti sen päällä renkaiden pyöriessä tyhjä. Entäs nyt? Kuskit ja oppaat yrittivät saada autoa pois siinä onnistumatta. Viimein heidän oli nöyryyttävä pyytämään meidätkin avuksi. No Suomi-poikahan auttaa! Porukalla saimme vihdoin auton liikkeelle, vaikka, luvalla sanoen, intialaisten koheltamisessa meni huomattavasti enemmän aikaa kuin jos homma olisi tehty meidän tavallamme. Noh, joka tapauksessa liikkeellä oltiin taas. Ja lujaa! Pian tajusimme, miksi kuskilla oli niin kiire. Tulomatkalla näkemämme sambarhirven raato, jota villisika oli hyödyntämässä, oli nimittäin kyseisen naarastiikerin aiemmin kaatama ja se oli nyt palannut sille. Juuri kun saavuimme paikalle, se päätti siirtää haaskaa kymmenkunta metriä. Paljoa ei parisataakiloinen hirvenraato painanut tiikerin käsittelyssä! Saimme pitkään seurata tiikerimamman ateriointia, kunnes puiston sulkemisaika painoi päälle ja meidän oli jatkettava matkaa. Noh, kuuluuhan se ruokarauha tiikerillekin. Tämä oli kuulemma noin 7-vuotias naaras, ja sen näki jo koostakin. Kyseessä oli selvästi rotevampi yksilö kuin aamuinen. Yhden pentueen se oli puistoon kasvattanut.



Päivän toinen tiikeri käveli avoimen jokiuoman kautta aiemmin kaatamalleen sambarin haaskalle.

Iltaohjelmassa ennen Tiger Deniin palaamista kiertelimme parilla pienellä vesilätäköllä intianhietakyyhkyn (Painted Sandgrouse) toivossa. Kauaa ei tarvinnut odottaa, kun kaksi lintua ilmestyi näkyviin iltaruskoa vasten lentäen. Ne laskeutuivat hetkeksi näkyviin, jolloin näimme, että kyseessä oli pariskunta. Ne lentelivät vielä pari kierrosta, kävivät pikaisesti lätäköllä ja poistuivat tulosuuntaansa. Näin oli meidänkin aika lopettaa tämän kertakaikkisen käsittämättömän päivän osalta.

Päivän lajimäärä, tiikereiden lisäksi, 92.

4.12.

Viimeisen retkipäivän aamu käynnistyi taas tiikerisafarilla. Aamu oli kirkas ja tosi kylmä, hanskat ja pitkää kerrastoa olisi saanut olla yllä. Alkumatkan tienvarsimetsät olivat hiljaista, ei juuri lintuja, ei varoitteluja. Jossain vaiheessa kuultiin hanumaanien ja aksiskauriiden varoittelua, mutta nekin vaimenivat pian. Ajeltiin melko pitkälle, kunnes pysähdyimme jokiuomalle. Vähän pitkästä, kuoppaisesta ajamisesta ryytynyt tunnelma muuttui kerralla, kun noin sadan metrin päässä uoman päälle kaartuvalla oksalla istui kalahuuhkaja (Brown Fish-owl)! Katselimme ja kuvasimme sitä pitkään ja hartaasti. Kun kuvia oli vähintään riittävästi, jatkoimme vielä vähän eteenpäin reitin päätepisteeseen ja käännymme takaisin. Pian kääntöpaikalta palattuamme löytyi toinen kalahuuhkaja melkein tien vierestä puusta. Se tosin oli kuvaajien harmiksi osin oksien takana.

Paluumatka sujui suhteellisen nopeasti ilman pysähdyksiä melkein portille asti. Vähän ennen porttia hoksasimme vielä tien varressa kuvauksellisesti ruokailevan kirjopyyfasaaniparin (Painted Spurfowl).

Päivällä vietettiin taas siestaa nauttien helteisestä ja aurinkoisesta säästä, viimeistä päivää ennen paluuta harmaaseen koti-Suomeen. Lounaan jälkeen starttasimme Soorwalin tekojärvelle. Pieni tie kulki läpi kylän, missä miljoona lasta huuteli ja juoksi perässä. Kylän laidalla kuivalla joutomaalla oli toistakymmentä paksujalkaa (Eurasian Thick-knee / Stone-curlew). Järvelle ja padolle päästyämme totesimme valon olevan huonoimman mahdollisen, mutta siitä huolimatta reissulle uusi lajeja alkoi tipahdella heti: avosetti, flamingo, suo- ja pikkusirri, kuovi, valkoposki- ja hietatiira sekä keskellä järveä kelluva yksinäinen pelikaani.

Jatkoimme patoa pitkin eteenpäin ja seuraavalla pysähdyksellä yllätys oli melkoinen kun järven keskellä särkällä torkkui kolme intiansaksinokkaa (Indian Skimmer)! Pian huomasimme vastarannalla n. 50 saksinokan porukan lisää. Hieno paikko Chambalin nuijaukselle. Lisäksi särkällä oli kaksi tiibetinlokkia (Brown-headed Gull), kaksi aroharmaalokkia (niitä kai ne kartan perusteella...) ja parikymmentä mustapäällokkia sekä reilu parikymmentä mustapyrstökuiria.



Intiansaksinokat Soorwalin tekojärvellä tarjosivat loppuhuipennuksen upealle reissulle.

Messevän matkan lopetuksen jälkeen fiilis oli korkealla palatessamme takaisin Tiger Deniin. Valtaosan porukasta jo mentyä huoneisiinsa, viereisiin puihin pölähti vielä noin viidentoista pikkumehiläissyöjän parvi. Se jäi reissun viimeiseksi uudeksi lajiksi saaden komean järjestysnumeron 364. Päivän lajimäärä koko reissun toiseksi paras: 127.

Retken hienoimman lintulajin titteli jakautui usealle eri lajille. Äänensä antaneista kannatusta saivat harmaafasaani, rubiinisatakieli, punaviidakkokana (erityisesti kukko, jolla perhokalastajien keskuudessa on erityinen asema ja siksi sellaisen näkeminen oli erityinen kokemus) ja iibisnokka.



Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
R e t k i p i n n a t				D e l h i - K u m e r i a	K u m e r i a	K u m e r i a - C o r b e t t	C o r b e t t	C o r b e t t - N a i n i t a l	N a i n i t a l	N a i n i t a l	N a i n i t a l - D e l h i	D e l h i - C h a m b a l	C h a m b a l - B h a r a t p u r	C h a m b a l - B h a r a t p u r	B h a r a t p u r	B h a r a t p u r - R a n t h a m b h o r e	R a n t h a m b h o r e	R a n t h a m b h o r e - D e l h i	D e l h i - H e l s i n k i
1	Black Francolin	<i>Francolinus francolinus</i>	mustafrankoliini							3									
6	Grey Francolin	<i>Francolinus pondicerianus</i>	harmaafrankoliini									2	20		20	10	30	40	
1	Jungle Bush Quail	<i>Perdica asiatica</i>	viidakkopensasviiriäinen										10						
1	Hill Partridge	<i>Arborophila torqueola</i>	viidakkoppyy								4								
2	Painted Spurfowl	<i>Gallinago lunulata</i>	kirjopyyfasaani														2	2	
3	Red Junglefowl	<i>Gallus gallus</i>	punaviidakkokana			13	10	5											
6	Kalij Pheasant	<i>Lophura leucomelanos</i>	teräsfasaani			4	4	14	20	3	5								
1	Cheer Pheasant	<i>Catreus wallichii</i>	harmaafasaani						5										
9	Indian Peafowl	<i>Pavo cristatus</i>	riikinkukko				6	6				50	70	50	10	50	70	100	
2	Greylag Goose	<i>Anser anser</i>	merihanhi					1										2	
4	Bar-headed Goose	<i>Anser indicus</i>	tiibetinhani										9	17	10			50	
4	Lesser Whistling-duck	<i>Dendrocygna javanica</i>	intianviheltäjäsorsa										200		500+		20	10	
8	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	ruostesorsa			2	20	50					20	50	30		5	50	
3	Comb Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	kyhmysorsa										2		15	1			
3	Gadwall	<i>Anas strepera</i>	harmaasorsa				8	10							500+				
3	Eurasian Wigeon	<i>Anas penelope</i>	haapana				12	5				1							
2	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	sinisorsa				x	x											
1	Spot-billed Duck	<i>Anas poecilorhynchos</i>	täplänokkasorsa												50				

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
5	Northern Shoveler	<i>Anas clypeata</i>	lapasorsa				5							1	500+		10	5	
3	Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	jouhisorsa				4						1		500+				
1	Garganey	<i>Anas querquedula</i>	heinätavi												1				
8	Common Teal	<i>Anas crecca</i>	tavi			20	300	40					2	2	30		20	30	
1	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	punapäänarsku					4											
2	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	punasotka				1								5				
2	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	ruskosotka										2		7				
6	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	pikku-uikku									2	12	20	100	3	10		
1	Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	silkkuiukku															1	
7	Painted Stork	<i>Mycteria leucocephala</i>	aasianiibishaikara	5								6	30	30	200	5		2	
4	Asian Openbill	<i>Anastomus oscitans</i>	aasianrakonokka									2	3				2	5	
9	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>	piispahaikara			1	10	4				4	10	7	1		1	1	
3	Black Stork	<i>Ciconia nigra</i>	mustahaikara				27	15										8	
4	Black-necked Stork	<i>Ephippiorhynchus asiaticus</i>	aasiansatulahaikara			2	2	1					1						
1	Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus ruber / roseus</i>	flamingo															40	
1	Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	pronssi-iibis												70				
6	Black-headed Ibis	<i>Threskiornis melanocephalus</i>	aasianpyhäiibis									2	10		10	1	5	5	
4	Black (Red-naped) Ibis	<i>Pseudibis papillosa</i>	intianiibis	33								1	4	5					
4	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	kapustahaikara										1	20	2			20	
1	Black Bittern	<i>Dupetor flavicollis</i>	mustapikkuhaikara												2				
9	Indian Pond Heron	<i>Ardeola grayii</i>	intianriisihaikara		1			15				15	40	10	20	10	20	50	
2	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>	yöhaikara												1		2		
2	Little (Striated) Heron	<i>Butorides striata</i>	kyrryhaikara		1										2				
10	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	harmaahaikara	1		1	10	5				16	15	15	30		5	10	
3	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	ruskohaikara										3		20		1		
8	Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	lehmähaikara	x				100				100	100+	50	300+	50		50	
9	Great Egret	<i>Casmerodius albus</i>	jalohaikara	5		1	5	3					4	2	10		7	5	
8	Intermediate Egret	<i>Mesophoyx intermedia</i>	pikkujalohaikara	10		1	1	3				1	8		20		2		
10	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	silkkihaikara	20		1	5	10				1	15	5	20	2		5	
2	Western Reef Egret	<i>Egretta gularis</i>	riuttahaikara										1					4	
1	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	pelikaani															1	
8	Little Cormorant	<i>Phalacrocorax niger</i>	jaavanmerimetso	1				2					15	1	30	2	15	10	
3	Indian Cormorant	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	intianmerimetso					100					1		15				
9	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	merimetso		30	35	450	300				100	80	30	100+			20	
4	Darter	<i>Anhinga melanogaster</i>	käärmeaula											1	30		10	3	
3	Collared Falconet	<i>Microhierax caerulescens</i>	himalajanhaukkanen			6	2	1											
6	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	tuulihaukka					1	1	2		1				2		1	
1	Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	muuttohaukka					2											
10	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	liitohaukka	3		2	1	4				3	10	10	1		1	3	
9	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	haarahaukka	10000				200	3		25	50	10	100				20	10

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
1	Brahminy Kite	<i>Haliastur indus</i>	bramiinihaukka														1		
4	Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	sääksi				1	2							1			1	
3	Pallas's Fish Eagle	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	aromerikotka			2	5	2											
3	Oriental Honey-buzzard	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	idänmehiläishaukka	1													3	2	
5	Egyptian Vulture	<i>Neophron percnopterus</i>	pikkukorppikotka	1				3				3	10	5					
1	Lammergeier	<i>Gypaetus barbatus</i>	partakorppikotka						1										
2	Long-billed / Indian Vulture	<i>Gyps indicus</i>	intiankorppikotka														5	1	
3	Griffon Vulture	<i>Gyps fulvus</i>	hanhikorppikotka					4	3	10									
2	Black / Cinereous Vulture	<i>Aegyptius monachus</i>	munkkikorppikotka				1										1		
3	Red-headed Vulture	<i>Sarcogyps calvus</i>	kalmokorppikotka			1	1	1											
1	Crested Serpent Eagle	<i>Spilornis cheela</i>	harjakotka				1												
2	Eurasian Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	ruskosuohaukka												5			1	
3	Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	sinisuohaukka			2	2	1											
11	Shikra	<i>Accipiter badius</i>	arovarpushaukka	2				2		2	2	2	3	2	1	1	1	1	
1	Common (Himalayan) Buzzard	<i>Buteo buteo (burmanicus)</i>	hiirihaukka							1									
1	Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	arohiirihaukka									1							
2	Greater Spotted Eagle	<i>Aquila clanga</i>	kiljukotka												7			1	
1	Indian Spotted Eagle	<i>Aquila hastata</i>	"intiankiljukotka"										1						
1	Tawny Eagle	<i>Aquila rapax</i>	savannikotka										2						
5	Steppe Eagle	<i>Aquila nipalensis</i>	arokotka		1				20	6	25				1				
2	Bonelli's Eagle	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	vuorikotka										2				2		
3	Booted Eagle	<i>Hieraaetus pennatus</i>	pikkukotka								1		1		4				
1	Rufous-bellied Eagle	<i>Hieraaetus kienerii</i>	punavatsakotka								1								
5	Changeable Hawk Eagle	<i>Spizaetus cirrhatus</i>	jalokotka		2	1	3	2							1				
4	Mountain Hawk Eagle	<i>Spizaetus nipalensis</i>	mahtijalokotka		1		1		3	2									
1	McQueen's Bustard	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	idänkaulustrappi													1			
1	Barred Buttonquail	<i>Turnix suscitator</i>	tummapyyjuoksija														2		
2	Brown Crake	<i>Amaurornis akool</i>	ruskosuokana				1											2	
7	White-breasted Waterhen	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	ojasuokana									9	3	5	10	5	10	20	
2	Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>	sulttaanikana												50	2			
7	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	liejukana									15	20	6	500+	20	5	30	
3	Common Coot	<i>Fulica atra</i>	nokikana										40		300+		10		
1	Demoiselle Crane	<i>Grus virgo</i>	neitokurki										1						
3	Sarus Crane	<i>Grus antigone</i>	saruskurki										13		10	6			
1	Eurasian (Indian) Thick-knee	<i>Burhinus oedicnemus (indicus)</i>	paksujalka															14	
4	Great Thick-knee	<i>Esacus recurvirostris</i>	intianpaksujalka				8	1					1					1	
2	Pheasant-tailed Jacana	<i>Hydrophasianus chirurgus</i>	pitkäpyrstöjassana												30		2		
5	Bronze-winged Jacana	<i>Metopidius indicus</i>	pronssijassana	10								7	30		50		1		
1	Ibisbill	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	iibisnokka		3														
8	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	pitkäjalka	200								30	80	100	7	50	40	70	

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
1	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	avosetti															30	
6	River Lapwing	<i>Vanellus duvaucelii</i>	jokihyyppä		15	15	15	20					20	2					
1	Yellow-wattled Lapwing	<i>Vanellus malabaricus</i>	intianhyyppä	10															
11	Red-wattled Lapwing	<i>Vanellus indicus</i>	kenttähyyppä	10		23	10	15				20	100	50+		20	10	30	5
2	White-tailed Lapwing	<i>Vanellus leucurus</i>	suohyyppä										3		1				
2	Kenthis Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	mustajalkatylli										4					1	
3	Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	pikkutylli					1				1	30						
4	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>	suokukko										8	x		1		200	
1	Greater Painted-snipe	<i>Rostratula benghalensis</i>	kultakurppo													2			
2	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	taivaanvuohi										25					10	
1	Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	mustapyrstökuiri															25	
1	Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	kuovi															2	
3	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	mustaviklo										20	x			1		
4	Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	punajalkaviklo									1	3	5				15	
2	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	lampiviklo										7					1	
6	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	valkoviklo			1	10	2					10	1				20	
5	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	metsäviklo								1		3		1	1		4	
6	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	liro									20	10	1	2	2		2	
1	Terek Sandpiper	<i>Xenus cinereus</i>	rantakurvi										1						
6	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	rantasipi	1		1	1						2			1		5	
1	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	pikkusirri															20	
2	Temminck's Stint	<i>Calidris temminckii</i>	lapinsirri										25					10	
1	Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	suosirri															80	
1	Indian Courser	<i>Cursorius coromandelicus</i>	intianaavikkojuoksija													14			
1	Caspian Gull	<i>Larus cachinnans</i>	aroharmaalokki															2	
2	Pallas's Gull	<i>Larus ichthyaetus</i>	mustapäällokki										8					20	
1	Brown-headed Gull	<i>Larus brunnicephalus</i>	tiibetinlokki															2	
2	Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	naurulokki											5				3	
1	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>	hietatiira															2	
6	River Tern	<i>Sterna aurantia</i>	jokitiira			5	45	15					2				7	10	
1	Black-bellied Tern	<i>Sterna acuticauda</i>	mustavatsatiira										5						
1	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>	valkoposkitiira															50	
1	Indian Skimmer	<i>Rynchops albicollis</i>	intiansaksinokka															52	
1	Painted Sandgrouse	<i>Pterocles indicus</i>	intianhietakyyhky														8		
16	Common Pigeon	<i>Columba livia</i>	kalliokyyhky	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	x	x	x	x
2	Oriental Turtle Dove	<i>Streptopelia orientalis</i>	idänturturikyyhky				1				2								
8	Eurasian Collared Dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	turkinkyyhky	30				3				50	30	40	40	10		10	
2	Red Collared Dove	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	pikkuturturikyyhky									15			1				
5	Spotted Dove	<i>Streptopelia chinensis</i>	aasianturturikyyhky	1	2		15	1									3		
8	Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	palmukyyhky	1								4	10	10	5	30	10	20	

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
2	Emerald Dove	<i>Chalcophaps indica</i>	smaragdikiyyhky					1			2								
2	Yellow-footed Green Pigeon	<i>Treron phaeucopterus</i>	huiluvierhkyhky														25	2	
2	Pin-tailed Green Pigeon	<i>Treron apicauda</i>	puikkopyrstökyhky			8		11											
1	Alexandrine Parakeet	<i>Psittacula eupatria</i>	isokauluskaija														1		
11	Rose-ringed Parakeet	<i>Psittacula krameri</i>	kauluskaija	20	4			50				400	x	x	x	x	x	x	x
5	Slaty-headed Parakeet	<i>Psittacula himalayana</i>	himalajankaija		1	1		30		3	20								
5	Plum-headed Parakeet	<i>Psittacula cyanocephala</i>	luumupääkaija			1	30	50									x	x	
1	Red-breasted Parakeet	<i>Psittacula alexandri</i>	punarintakaija					1											
3	Common Hawk Cuckoo	<i>Hierococyx varius</i>	haukkakäki			1	3	1											
4	Asian Koel	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	variskäki									2	1	1				1	
2	Sirkeer Malkoha	<i>Phaenicophaeus leschenaultii</i>	viirukäki			1							1						
8	Greater Coucal	<i>Centropus sinensis</i>	aasiankukaali									2	3	1	8	2	1	2	1
1	Lesser Coucal	<i>Centropus bengalensis</i>	pikkukukaali			1													
2	Indian Scops Owl	<i>Otus lettia</i>	sepelpöllönen									1			2				
1	Asian Barred Owlet	<i>Glaucidium cuculoides</i>	raitavarpuspöllö								1								
1	Jungle Owlet	<i>Glaucidium radiatum</i>	intianvarpuspöllö					1											
4	Spotted Owlet	<i>Athene brama</i>	brahmanpöllö									2	1			2	2		
1	Dusky Eagle Owl	<i>Bubo coromandus</i>	harmaahuuhkaja												2				
1	Brown Fish Owl	<i>Ketupa zeylonensis</i>	kalahuuhkaja															2	
1	Tawny Fish Owl	<i>Ketupa flavipes</i>	vuorikalahuuhkaja			2													
3	Brown Hawk Owl	<i>Ninox scutulata</i>	haukkapöllö									1	1	1					
1	Grey Nightjar	<i>Caprimulgus indicus</i>	harmaakehrääjä												1				
2	White-rumped Spinetail	<i>Zoonavena sylvatica</i>	metsäkiitäjä			50	10												
2	Crested Treeswift	<i>Hemiprocne coronata</i>	intiantöyhtökiitäjä				7	5											
4	House Swift (Little Swift)	<i>Apus affinis</i>	pikkukiitäjä						30				50	30			10		
5	Indian Roller	<i>Coracias benghalensis</i>	intiansininärhi	5								5	10	2		1			
7	Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	harjalintu			1						15	3	3		10	12	3	
13	White-throated Kingfisher	<i>Halcyon smyrnensis</i>	smyrnankalastaja	20	5	3	5	5			2	5	15	20	30	30	20	10	
7	Common Kingfisher	<i>Alcedo atthis</i>	kuningaskalastaja		4	1		2			2				1		1	1	
4	Crested Kingfisher	<i>Megaceryle lugubris</i>	aasiankeisarikalastaja		3	3	4	4											
7	Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	kirjokalastaja		2		6	4					6		4		5	5	
1	Blue-bearded Bee-eater	<i>Nyctyornis athertoni</i>	siniaimpiaissyöjä				2												
1	Green Bee-eater	<i>Merops orientalis</i>	pikkumehiläissyöjä															15	
4	Indian Grey Hornbill	<i>Ocyrceros birostris</i>	intiantoko	1				6				4			10				
1	Oriental Pied Hornbill	<i>Anthracoceros albirostris</i>	intiansarvinokka			1													
1	Great Hornbill	<i>Buceros bicornis</i>	keisarisarvinokka					1											
3	Great Barbet	<i>Megalaima virens</i>	kuningasseppä						2	10	10								
4	Brown-headed Barbet	<i>Megalaima zeylanica</i>	rusohuppuseppä									8		1	5	1			
2	Lineated Barbet	<i>Megalaima lineata</i>	marmoriseppä				30	20											
4	Blue-throated Barbet	<i>Megalaima asiatica</i>	turkoosiseppä		2	15		10			1								

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
6	Coppersmith Barbet	<i>Megalaima haemacephala</i>	kilkkuseppä			1	1	20				1	1		4				
1	Eurasian Wryneck	<i>Jynx torquilla</i>	käenpiika													1			
1	Rufous Woodpecker	<i>Celeus brachyurus</i>	aasiantöyhtötikka			1													
1	Brown-capped Pygmy Woodpecker	<i>Dendrocopos nanus</i>	ruskolakkitikka														1		
4	Grey-capped Pygmy Woodpecker	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	aasianpikkutikka		3	2	1	1											
2	Fulvous-breasted Woodpecker	<i>Dendrocopos macei</i>	aasiankirjotikka		2	2													
1	Rufous-bellied Woodpecker	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	ruskokirjotikka							2									
3	Brown-fronted Woodpecker	<i>Dendrocopos auriceps</i>	liekkiniskatikka						1	1	2								
1	Himalayan Woodpecker	<i>Dendrocopos himalayensis</i>	himalajankäpytikka								2								
4	Lesser Yellownape	<i>Picus chlorolophus</i>	liekkivihertikka		1	2	4	1											
4	Greater Yellownape	<i>Picus flavinucha</i>	kultaniskatikka			4	1		1		1								
2	Streak-throated Woodpecker	<i>Picus xanthopygaeus</i>	intianvihertikka			2	2												
3	Grey-headed Woodpecker	<i>Picus canus</i>	harmaapäätikka		1	2	1												
4	Himalayan Flameback	<i>Dinopium shorii</i>	isotulitöyhtö			4	7	4			1								
4	Black-rumped / Lesser Flameback	<i>Dinopium benghalense</i>	intiantulitöyhtö												2	1	7	1	
3	Common Woodshrike	<i>Tephrodornis pondicerianus</i>	metsäkäpinkäinen			7	10	2											
2	Bar-winged Flycatcher-shrike	<i>Hemipus picatus</i>	sieppokäpinkäinen				30	15											
2	Common Iora	<i>Aegithina tiphia</i>	jora			10		3											
2	Small Minivet	<i>Pericrocotus cinnamomeus</i>	pikkuminivetti					7									5		
1	Long-tailed Minivet	<i>Pericrocotus ethologus</i>	liekkiminivetti					8											
4	Scarlet Minivet	<i>Pericrocotus flammeus</i>	pilkkaminivetti			10	30	2		1									
2	Isabelline Shrike	<i>Lanius isabellinus</i>	punapyrstölepinkäinen										1			3			
2	Bay-backed Shrike	<i>Lanius vittatus</i>	intianpikkulepinkäinen												1		1		
12	Long-tailed Shrike	<i>Lanius schach</i>	ruskoperälepinkäinen		1	7	6	10	1		1		1	1	1	2	2	5	
3	Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	etelänisolepinkäinen									1				1		2	
1	Lesser Racket-tailed Drongo	<i>Dicrurus remifer</i>	pikkuviiridrongo				2												
10	Black Drongo	<i>Dicrurus macrocercus</i>	mustadrongo	15			1	5				30	50	15	30	50	20	15	
1	Ashy Drongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	tuhkadrongo													3			
3	White-bellied Drongo	<i>Dicrurus caerulescens</i>	valkovatsadrongo			1											20	5	
4	Bronzed Drongo	<i>Dicrurus aeneus</i>	pronssidrongo			10		2	3		10								
1	(Indian) Golden Oriole	<i>Oriolus (oriolus) kundoo</i>	kuhankeittäjä												1				
3	Black-hooded Oriole	<i>Oriolus xanthornus</i>	huppukuhankeittäjä			5	5	3											
3	Maroon Oriole	<i>Oriolus trailii</i>	kastanjakuhankeittäjä			1	5	3											
2	Yellow-bellied Fantail	<i>Rhipidura hypoxantha</i>	keltavatsamonarkki		5	1													
3	White-throated Fantail	<i>Rhipidura albicollis</i>	harmaavatsamonarkki		5	3		1											
2	White-browed Fantail	<i>Rhipidura aureola</i>	valko-otsamonarkki														6	1	
1	Asian Paradise-flycatcher	<i>Terpsiphone paradisi</i>	paratiisimonarkki												2				
2	Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	närhi							3	3								
2	Black-headed Jay	<i>Garrulus lanceolatus</i>	himalajannärhi							5	10								
5	Red-billed Blue Magpie	<i>Urocissa erythrorhyncha</i>	loistoharakka		3	1			8	7	9								

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
12	Rufous Treepie	<i>Dendrocitta vagabunda</i>	huppuviidakkoharakka	3		5	5	4				5	4	4	15	1	70	30	1
1	Grey Treepie	<i>Dendrocitta formosae</i>	naamioviidakkoharakka								2								
15	Large-billed Crow	<i>Corvus macrorhynchos</i>	paksunokkavaris	10	10	5	10	50	20	10	x	x	x	x	10	x	50	x	
9	House Crow	<i>Corvus splendens</i>	intianvaris	x								x	x	x	50	x	x	x	x
7	Great Tit	<i>Parus major</i>	talitiainen		7	15	5	5	1								3	5	
3	Green-backed Tit	<i>Parus monticolus</i>	vihertalitiainen						30	15	10								
4	Black-lored Tit	<i>Parus xanthogenys</i>	intianharjatiainen		3	5			10	2									
2	Coal Tit / Spot-winged Tit	<i>Parus ater melanolophus</i>	kuusitiainen						30	30									
2	Yellow-browed Tit	<i>Sylviparus modestus</i>	kerttutiainen						5	3									
3	Black-throated Tit	<i>Aegithalos concinnus</i>	harlekiinipyrstötiainen						50	75	10								
7	Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	pikkutörmäpääsky		30	70	100	50					100+		50		10		
1	Sand Martin	<i>Riparia riparia</i>	törmäpääsky										2						
1	Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	kalliopääsky							50									
3	Dusky Crag-Martin	<i>Ptyonoprogne concolor</i>	aasiankalliopääsky													2	30	10	
2	Nepal House Martin	<i>Delichon nipalense</i>	nepalindräystäspääsky							30	10								
2	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>	jouhipääsky	1									20						
8	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	haarapääsky	50		20	20	10	5	15	3		10						
7	Red-rumped Swallow	<i>Hirundo daurica</i>	ruostepääsky			10		5	15	30		2	30				1		
2	Indian Bushlark	<i>Mirafra erythroptera</i>	intianpensaskiuru													10		1	
4	Greater Short-toed Lark	<i>Calandrella brachydactyla</i>	lyhytvarvaskiuru			2	2						2			100			
2	Ashy-crowned Sparrow-Lark	<i>Eremopterix griseus</i>	intianvarpuskiuru										2			15			
2	Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	töyhtökiuru										2			30			
4	Oriental Skylark	<i>Alauda gulgula</i>	aasiankiuru				2	3					1			5			
1	Bimaculated Lark	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	ylänkökiuru			4													
7	Himalayan Bulbul	<i>Pyconotus leucogenys</i>	valkoposkibulbuli		30	50	30	30	30	15	10								
2	White-eared Bulbul	<i>Pycnonotus leucotis</i>	tiaisbulbuli												10	10			
1	Black-crested Bulbul	<i>Pycnonotus melanicterus</i>	töyhtöhuppubulbuli					10											
4	Red-whiskered Bulbul	<i>Pycnonotus jocosus</i>	punaposkibulbuli			100	50	30	5										
14	Red-vented Bulbul	<i>Pycnonotus cafer</i>	punaperäbulbuli		10	100	100	50	10	2	5	20	5	15	30	30	20	20	
1	Mountain Bulbul	<i>Ixos maclellandii</i>	vuoriviirubulbuli						1										
2	Ashy Bulbul	<i>Hemixos flavala</i>	kultasiipibulbuli			15	2												
4	Black Bulbul	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	punanokkabulbuli		3	5				4	5								
3	Striated Prinia	<i>Prinia crinigera</i>	viirupriinia		1				1	2									
4	Grey-breasted Prinia	<i>Prinia hodgsonii</i>	savupriinia		3			2			20						5		
1	Yellow-bellied Prinia	<i>Prinia flaviventris</i>	keltapriinia			4													
5	Ashy Prinia	<i>Prinia socialis</i>	sinipriinia			6	2					2	1		10				
7	Plain Prinia	<i>Prinia inornata</i>	intiantuhkapriinia			1						1	1		5	15	3	5	
2	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	heinäkerttu			2				2									
9	Common Tailorbird	<i>Orthotomus sutorius</i>	pitkäpyrstöräätäli			10	1			1		2	5		10	2	2	4	
1	Striated Grassbird	<i>Megalurus palustris</i>	isokaislakerttunen			1													

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
1	Brown-flanked Bush-warbler	<i>Cettia fortipes</i>	pensasilkkikerttunen							1									
1	Clamorous Reed Warbler	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	papyruskerttunen												2				
2	Chestnut-headed Tesia	<i>Tesia castaneocoronata</i>	keltapittakerttunen				1				4								
4	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	tiltaltti		2										10		20	5	
2	Buff-barred Warbler	<i>Phylloscopus pulcher</i>	himalajanuunilintu						15	15									
5	Lemon-rumped Warbler	<i>Phylloscopus chloronotus</i>	tiibetinuunilintu		5			1	5	5	5								
13	Hume's Leaf Warbler	<i>Phylloscopus humei</i>	kashmirinuunilintu		10	15	5	10	1			5	5	7	15	2	15	30	1
8	Greenish Warbler	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	idänuunilintu					3				3	3	3	15	2	5	8	
2	Black-faced Warbler	<i>Abroscopus schisticeps</i>	naamiolehväkerttu						50	5									
7	Grey-hooded Warbler	<i>Seicercus xanthoschistos</i>	himalajansieppokerttu		20	30	15	20	20	10	10								
2	Whistler's Warbler	<i>Seicercus whistleri</i>	kashmirinsieppokerttu		1		1												
7	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia curruca</i>	hernekerttu							2		2	5	1	5	5		1	
1	Puff-throated Babbler	<i>Pellorneum ruficeps</i>	rastasviidakkotimali					2											
2	Chestnut-capped Babbler	<i>Timalia pileata</i>	bambutimali				10	5											
5	Black-chinned Babbler	<i>Stachyris pyrrhops</i>	pakistanintimali			5	1	3		1	6								
4	Rusty-cheeked Scimitar-Babbler	<i>Pomatorhinus erythrogenys</i>	punakylkitimali			1	5	5		2									
4	Common Babbler	<i>Turdoides caudata</i>	pensasitimali										5		2	2	3		
7	Large Grey Babbler	<i>Turdoides malcolmi</i>	isopensasitimali									40	20	12	10	20	30	40	
14	Jungle Babbler	<i>Turdoides striata</i>	metsäpensastimali	10	15	30	60	30	5			x	x	x	100+	50	x	x	20
2	White-throated Laughingthrush	<i>Garrulax albogularis</i>	himalajannaurutimali						10		30								
4	White-crested Laughingthrush	<i>Garrulax leucolophus</i>	valkotöyhtötimali		8	h	3	3											
2	Striated Laughingthrush	<i>Garrulax striatus</i>	viirutöyhtötimali							2	1								
1	Rufous-chinned Laughingthrush	<i>Garrulax rufogularis</i>	oranssikurkkutimali								2								
3	Streaked Laughingthrush	<i>Garrulax lineatus</i>	pikkunaurutimali						20	30	10								
2	Chestnut-crowned Laughingthrush	<i>Garrulax erythrocephalus</i>	kultasiipitimali						2	2									
2	Red-billed Leiothrix	<i>Leiothrix lutea</i>	tulirintatimali			10					5								
2	White-browed Shrike Babbler	<i>Pteruthius flaviscapis</i>	lepinkäistimali							6	4								
3	Rufous Sibia	<i>Heterophasia capistrata</i>	himalajanpyrstötimali						10	40	10								
2	Whiskered Yuhina	<i>Yuhina flavicollis</i>	viiksijuhina						1	4									
1	White-bellied Erpornis	<i>Erpornis zantholeuca</i>	kultaperätimali			2													
2	Yellow-eyed Babbler	<i>Chrysomma sinense</i>	kultasiimätimali													2	15		
4	Brown Dipper	<i>Cinclus pallasii</i>	aasiankoskikara		1	2		1			2								
9	Oriental White-eye	<i>Zosterops palpebrosus</i>	aasianrilli		20	30		15	5	20	10	5					50	20	
5	Chestnut-bellied Nuthatch	<i>Sitta castanea</i>	aasiannakkeli		2	5	4	2			2								
4	White-tailed Nuthatch	<i>Sitta himalayensis</i>	himalajannakkeli		1	2			5	2									
3	Velvet-fronted Nuthatch	<i>Sitta frontalis</i>	mustaotsanakkeli			15	5	5											
1	Wallcreeper	<i>Tichodroma muraria</i>	kalliokiipijä		3														
3	Bar-tailed Treecreeper	<i>Certhia himalayana</i>	raitapyrstökiipijä		sp				2		sp								
1	Jungle Myna	<i>Acridotheres fuscus</i>	viidakkomaina				15												
9	Bank Myna	<i>Acridotheres ginginianus</i>	intianmaina	x								x	x	x	x	x	x	x	x

Pohjois-Intia 2015

	English common name	Scientific name	Finnish name	20.11.	21.11.	22.11.	23.11.	24.11.	25.11.	26.11.	27.11.	28.11.	29.11.	30.11.	1.12.	2.12.	3.12.	4.12.	5.12.
14	Common Myna	<i>Acridotheres tristis</i>	pihamaina	x	50	50	x	x	10			x	x	x	x	x	x	x	x
7	Asian Pied Starling	<i>Sturnus contra</i>	kyläkottarainen	15								30	20	20	30	20		4	
6	Brahminy Starling	<i>Sturnus pagodarum</i>	bramiinikottarainen				4					30	30	5	100+	50			
3	Rosy Starling	<i>Sturnus roseus</i>	punakottarainen										5		2	150			
7	Blue Whistling Thrush	<i>Myophonus caeruleus</i>	sinijokirastas		13	20	10	10	5	8	5								
1	Tickell's Thrush	<i>Turdus unicolor</i>	intianrastas												1				
1	Dusky Thrush	<i>Turdus eunomus</i>	ruostesiipirastas							1									
1	Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	kulorastas							3									
5	Bluethroat	<i>Luscinia svecica</i>	sinirinta										5		10	3	2	1	
1	Siberian Rubythroat	<i>Luscinia calliope</i>	rubiiisatakieli												1				
1	Orange-flanked Bush Robin	<i>Tarsiger (cyanurus) rufilatus</i>	sinipyrstö						3										
8	Oriental Magpie Robin	<i>Copsychus saularis</i>	harakkatasku		2		1	1				3			15	7	3	5	
7	Indian Robin	<i>Saxicoloides fulicatus</i>	intiantasku									2	10	3	10	20	10	20	
5	Plumbeous Water Redstart	<i>Rhyacornis fuliginosa</i>	jokileppälintu		76	30	20	5			5								
3	White-capped (Water) Redstart	<i>Chaimarrornis leucocephalus</i>	virtaleppälintu		58	10					2								
3	Blue-capped Redstart	<i>Phoenicurus caeruleocephala</i>	kivikkoleppälintu						5	15	4								
5	Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	mustaleppälintu			1						2			7		1	3	
2	Blue-fronted Redstart	<i>Phoenicurus frontalis</i>	louhikkoleppälintu						4	3									
4	Spotted Forktail	<i>Enicurus maculatus</i>	pitsihaarapyrstö		4				2	1	4								
10	Siberian Stonechat	<i>Saxicola maurus</i>	sepeltasku			20	10	5	3			5	3		1	3	2	1	
3	Pied Bushchat	<i>Saxicola caprata</i>	nokitasku									1			2			2	
7	Grey Bushchat	<i>Saxicola ferreus</i>	harmaatasku		5	3	3	2	3	3	4								
1	Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	aavikkotasku													8			
1	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellinus</i>	arotasku													3			
1	Variable Wheatear	<i>Oenanthe picata</i>	louhikkotasku													1			
5	Brown (Indian) Rock-Chat	<i>Cercomela fusca</i>	pihatasku	3								4	2	2		2			
2	Blue Rock Thrush	<i>Monticola solitarius</i>	sinirastas		1								1						
1	Chestnut-bellied Rock Thrush	<i>Monticola rufiventris</i>	isokivikkorastas								3								
6	Red-throated Flycatcher	<i>Ficedula parva</i>	pikkusieppo									5	2	5	15		5	2	
2	Taiga Flycatcher	<i>Ficedula albicilla</i>	idänpikkusieppo		1		2												
3	Slaty-blue Flycatcher	<i>Ficedula tricolor</i>	sinipikkusieppo			1	4	5											
1	Tickell's Blue Flycatcher	<i>Cyornis tickelliae</i>	puistosinisieppo															2	
5	Grey-headed Canary Flycatcher	<i>Culicicapa ceylonensis</i>	viitasieppo		5	5	1	3							1				
2	Rufous-bellied Niltava	<i>Niltava sundara</i>	hopealakkisieppo		1	1													
2	Small Niltava	<i>Niltava macgrigoriae</i>	pikkusinisieppo			1		5											
6	Purple Sunbird	<i>Nectarinia asiatica</i>	purppuramedestäjä									1	3			1	2	7	1
1	Green-tailed Sunbird	<i>Aethopyga nipalensis</i>	sateenkaarimedestäjä						1										
1	Fire-tailed Sunbird	<i>Aethopyga ignicauda</i>	tulipyrstömedestäjä							1									
2	Crimson Sunbird	<i>Aethopyga siparaja</i>	karmiinimedestäjä		2	1													
9	House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	varpunen	2					1	30	x	x	x		30	10		20	

Pohjois-Intia 2015

[illegible]

Pohjois-Intia 2015

[illegible]