

Ugandan lintumatka 3.3. —18.3.2018

Juha Honkala




African Finfoot, koiras, Lake Mburo. Kuva: Juha Honkala

Kon-Tiki Toursin lintumatka Ugandaan tarjosi matkalaisille hienon valikoiman lintuja, nisäkkäitä, erilaisia luontotyyppejä, ihmisiä ja hyvää ruokaa! Noin 2 300 kilometrin kierroksellamme tutustuimme kosteikkoihin (mm. Mabamba Swamp), erilaisiin savannimaisemiin (Murchison NP, Queen Elizabeth National Park, Lake Mburo National Park) ja sademetsiin (Kibale National Park, Bwindi National Park). Ugandan linnusto on hyvin monimuotoinen: pinta-alaltaan 2/3 Suomen kokoisessa maassa on tavattu noin 1 071 lajia – näistä onnistuimme havaitsemaan kahden viikon matkallamme miltei puolet, eli 523 lajia. Niitä sykehdyttävimpiä lintuja oli runsaasti, sillä miltei joka päivä näimme jonkin toivotun harvinaisuuden tai muuten vaan kiinnostavan lajin. Ja olihan niitä, tässä muutama: African Finfoot, Rufous-bellied Heron, Shoebill, Handsome Francolin, Red-chested Flufftail, Barred Long-tailed Cuckoo, Black Coucal, African Wood Owl, Verreaux's Eagle-Owl, Standard-winged Nightjar, Chocolate-backed Kingfisher, White-headed Wood Hoopoe, Western Green Tinkerbird, Crested Barbet, Green-breasted Pitta, Joyful Greenbul, Red-throated Alethe, Abyssinian (Olive) Thrush, Mocking Cliff Chat, Ruaha Chat, Grauer's Swamp Warbler, Cinnamon Bracken Warbler, Evergreen Forest Warbler, Uganda Woodland Warbler, Red-faced Crombec, Banded Prinia, Black-faced Rufous Warbler, Long-tailed Cisticola, Foxy Cisticola, Rwenzori Apalis, Rwenzori Batis,

Mountain Illadopsis, African Hill Babbler, Regal Sunbird, Pygmy Sunbird, Mountain Black Boubou, Stuhlmann's Starling, Strange Weaver ja White-collared Oliveback...

Ja sitten niitä nisäkkäitä – on vaan niin hienoa olla samassa paikassa kuin elefantti, virtahepo, impala, gorilla, kirahvi, seepra, leopardi, leijona, mangusti... ne ovat sitä suurta ja myyttistä Afrikkaa, jotka tekevät konkreettiseksi sen, että täällä ollaan, saman taivaan alla.

Kahden viikon Ugandan kierros sellaisena kuin me sen teimme, on vaativa koitos. Päivät olivat pitkiä ja ajomatkat raskaita. Kuitenkin halusimme olla maastossa niin paljon kuin mahdollista. Kaiken sai toimimaan hienosti oppaamme ja tukemme, kerrassaan hieno ihminen Stephen Baboineki, jonka kanssa oli ilo matkata. Hän sai päivittäisrutiinit toimimaan ja oli monin tavoin kullan arvoinen! Kiitokset Prime Safaris firmalle, jonka leivissä Stephen työskentelee. Lämpimät kiitokset myös erinomaisille paikallisoppailemme Raymond (Budongo), Gerard (Kibale NP), Matthew Twongyeirwe (Bwindi NP) ja Prossy eli Proscovia Nanyombi (Mpanga forest). Kontiki Tours lintumatkaan osallistuivat Börje Helander, Hannu Maula, Marita Maula, Andreas Uppstu ja tämän kirjoittaja, matkanjohtaja Juha Honkala.



Matkareittimme pääpiirteissään. Ajokilometrejä kertyi yhteensä noin 2 300. Kunkin matkapäivän ajokilometrit on mainittu edempänä olevassa päiväkirjassa.



Stephen, Goliath Heron ja automme Niilin deltalla. Kuva: Juha Honkala

Ohjelmamme päivästä päivään

3.3.2018 Lennot Helsinki-Vantaa – Amsterdam – Entebbe
4.3.2018 Entebbe – Mabamba Swamp – Kafu, Kabalega Resort Hotel
5.3.2018 Kafu, Kabalega Resort – Budongo, Royal Mile – Murchison National Park
6.3.2018 Murchison National Park
7.3.2018 Murchison National Park – Butiaban harjanne – Hoima
8.3.2018 Hoima – Kibale National Park
9.3.2018 Kibale National Park
10.3.2018 Kibale NP – Queen Elizabeth National Park
11.3.2018 Queen Elizabeth National Park
12.3.2018 Queen Elizabeth National Park – Bwindi, Buhoma
13.3.2018 Bwindi National Park, Buhoma
14.3.2018 Bwindi – The Neck – Ruhija
15.3.2018 Ruhija, Mubwindi Swamp
16.3.2018 Ruhija – Lake Mburo National Park
17.3.2018 Lake Mburo – Kagu Swamp – Mpanga forest – Entebbe – Amsterdam
18.3.2018 Saapuminen Helsinkiin aamupäivällä

3.3.2018 Helsinki-Vantaa – Amsterdam - Entebbe

Aamulento KLM: llä Amsterdamin kautta Entebbeen on aina vähän jännittävä asia, sillä vaihtoaikaa oli nytkin aikataulun mukaan tasan yksi tunti. Ehdimmekö jatkolennolle, ehtivätkö matkatavarat myös? No, tällä kertaa lentoamme avitti polaaripyörre, jonka suihkuvirtaukset lentokorkeudessaamme tuuppasivat meidät Amsterdamiin 20 minuuttia etuajassa. Marssimme kuitenkin hiki hatussa läpi ruuhkaisen jättiterminaalin vain todetaksemme, että kohtuullisen hyvin ehdittiin. Teimme välilaskun Kigaliin, Ruandaan ja Entebbeen saavuimme aikataulun mukaisesti klo 22.35. Viisumin (50 US\$) maksoimme maahan tullessa käteisellä ja Ugandan shillinkejä ostimme lentoaseman rahanvaihtopisteistä hintaan 1 € = 4 500 shillinkiä.

Lentoasemalla meitä olivat vastassa kolmen hengen delegaatio organisaattorimme Prime Safaris firman toimistolta. Ottivat meidät sydämellisesti vastaan, hauskaa! Tulevien kahden viikomme tärkein henkilö, lintuopas ja autonkuljettaja ja yleinen jokapaikanhöylä Stephen Baboineki lastasi laukukumme Toyota Land Cruiserin perään ja niin hurautimme muutaman minuutin ajomatkan päähän Airport View-hotelliin ensimmäiseksi yöksi. Nukkumaan päästiin klo 01 aikoihin.

4.3.2018 Entebbe – Mabamba Swamp – Kafu, Kabalega Resort Hotel, 318 km

Istuimme aamiaispöytään klo 6 aikoihin, eli tunnin verran ennen auringonnousua. Kolme varttia myöhemmin istuimme autossa menossa kohti kenkänokkapaikkaa eli Mabamba Swampia. Taivas oli paksussa pilvessä ja aamu valkeni hitaasti, mutta reittimme sivutessa Victoria-järven rantoja alkoi retkilajeja putoilla – ei harvinaisuuksia, mutta ihan mukavasti eksoottista tunnelmaa kohottivat ensimmäinen Woodland Kingfisher ja Grey Crowned Crane. Menomatkan paras laji oli tien varressa istunut nuori Sooty Falcon, jonka näimme erinomaisesti. Mabamban venerannassa oli pakko kompata hiukan pensaikkomaisemaa ennen kuin maltoimme lähteä veneilemään. Marico Sunbird, Black-headed Gonolek, Swamp Flycatcher ja Lesser Striped Swallow muiden muassa piristivät kummasti!

Nousimme kahteen perämoottorilla varustettuun kapoiseen veneeseen ja lähdimme peräkanaa etenemään luhtaan raivatussa kanavassa. Ei tainnut kuluu varttituntia kauempaa, kun veneemme kippari paikallisti matkan päästä luhdalla seisoskelevan kenkänokan. Jännitys laukesi! Odotetun Ugandan ihmelinnun löytyminen säväytti kummasti ja vaikka aamu oli harmaa ja valo vähissä, emme voineet olla tähtäilemättä tuota harmaata jättihaikaraa kameroinemme. Kosteikon muita lintuja olivat mm.



Kenkänokka! Hieno lintu. Kuva: Juha Honkala

Long-tailed Lapwing, pikkusirrit, tyllit ja usein hankalasti nähtävä Lesser Jacana. Nyt näimme sen hienosti, mutta arkana lintuna se piti huolen siitä, että kuvamme taisivat jäädä vaatimattomiksi. Loistoyllätyksenä näimme lennossa kaksi Rufous-bellied Heronia – aamun yllättävin lintutapahtuma! Haimme Papyrus Gonolekista näköhavaintoa, mutta sateen tuntu taisi pitää linnut piilossa ja havaitsimme vain yhden ääntelevän. Paluumatkalla etummaisena veneen matkaajat kuittasivat African Marsh Harrierin, jota takaveneen kulkijat saivatkin sitten odottaa lajilistalleen melkein kaksi viikkoa, mutta onneksi sekin odotus aikanaan palkittiin.

Huomattavan osan päivästä ajaa jurnutimme hitaasti ohi Kampalan – liikennettä riitti – ja vasta iltapäivän puolella olimme rauhallisella maaseudulla. Masindia lähestyessämme teimme muutaman tienvarsipysähdysten ja ne palkittiin lukuisilla uusilla lajeilla. Varsinaisiksi arvolajeiksi osoittautuivat Pale Flycatcher, Grey-headed Bushshrike ja Pygmy Sunbird, sillä niistä emme tehneet matkan aikana lisähavaintoja. Illan jo pimentyessä saavuimme oikein mukavaan majataloomme Kabalega Resort Hotel’iin. Retkilajit: 136

5.3.2018 Kafu, Kabalega Resort – Budongo, Royal Mile – Murchison National Park, 277 km

Ajelimme hitaasti kohti Budongon metsää. Ei ollut kiire, sillä metsässä linnut ovat aktiivisia pitkälle päivään. Niinpä pysähtelimme siellä täällä pitkin maaseutua, osapuilleen aina kun jotakin jännää auton ikkunasta näkyi. Ensimmäinen Brown Snake-Eagle istua jähmötti paikallaan keskellä puuta, mutta kyllähän se sykähdytti, upea lintu. Marsh Tschagra nähtiin hienosti aika kuivassa pensaikossa, samasta paikasta kaivettiin esiin hienosti nähty Moustached Grass Warbler, joka on melko yleinen lintu, mutta suomiorniahan ruskeat hysyt kiinnostaa aina! Retkemme kannalta arvolinnuiksi osoittautuivat ne 20 Black-bellied Firefinchiä, jotka aamusella ruokailivat tienvarsilla, sillä havaintomme lajista loppuivat tähän aamuun.

Budongon suojeltuun metsään tullessamme tapasimme sovitusti Raymondin, joka toimi tälläkin matkalla paikallisoppaanamme Royal Mile-nimisellä tienpätkällä, jossa vietimme seuraavat 6 tuntia. Heti Royal Milen portilla Ross’s Turacot pitivät mekkalaa ja lensivät ylitsemme ja saman tien perään White-thighed Hornbillit tekivät suunnilleen samoin. Hienosti alkoi! Ja niin se myös jatkui, yhtenä hienojen lintujen ilontulituksena (jos tällainen kuvaus sallitaan...): Narina Trogon, Chocolate-backed Kingfisher, African Dwarf Kingfisher, White-throated Greenbul, Uganda Woodland Warbler, Grey Longbill, Ituri Batis ja Jameson’s Wattle-eye muiden muassa saivat niskajänteemme koetukselle Royal Milella. Kyllä, täällä puut ovat korkeita ja moni lintu viihtyi ylhäällä. Lounasaikaan, oltuamme 3,5 tuntia Royal Milella, tulim katsoneeksi GPS-laitteesta kulkemamme matkan: 900 metriä, eli varsin rauhallinen oli etenemisvauhtimme.

Iltapäivällä ajoimme kaukaa idän puolelta Murchisonin kansallispuistoon, välttämällä ruuhkaisen lautan. Tällä reitillä pääsimme Niilin yli siltaa pitkin. Juuri ennen siltaa kiikaroimme kuohuvana kohisevalle joelle. Isoilla vesikivillä istui pari Rock Pratincolea ja ilmatilassa lensi muutama alppitervapääsky, loistavaa! Illan hämärtyessä ajoimme kansallispuiston pohjoisreunaa myötäillen ja ihmettelimme runsaina näkyviä Abdim’s Stork parvia. Olivat yöpymään menossa ja ehkä kaiken kaikkiaan muutolla, palailemassa eteläisen Afrikan pesimäseuduille. Illan hämärtyessä pääsimme viihtyisään majataloomme Heritage Safari Lodge. Illallisen jälkeen majatalon harvalukuiselle turistijoukkoille järjestettiin tanssi- ja rumpuesitys, joka oli

tunnelmaltaan ja volyymiltaan sen verran vahva, että siirryimme pitämään iltahuutoa 20 metriä sivuun, ulkopuolelle, jotta saimme tuon oman tärkeän ohjelmanumeromme suoritetuksi haluamallamme tavalla. Päivän lajit: 113, retkilajit yhteensä 215.

6.3.2018 Murchison National Park, 159 km

Ajoimme kansallispuiston portille kello seitsemäksi, jolloin puisto avautui. Aivan portin edessä oli hyvännäköinen pieni kosteikko, jossa toisinaan on mahdollista nähdä Lesser Gallinule. Nyt lintu ei ollut paikalla tai näkyvissä, mutta kaikenlaista muuta oli aamuruuhkaksi asti. Abyssinian Ground Hornbill-pariskunta oli pesärakennustunnelmissa – pesäpuuna oli kuusimetrisen palmupötkkelön nokka, johon linnut kantoivat pesämateriaalia. Sääli, että oli vielä hämärää ja oli olevinaan jonkunlainen kiirekin, sillä näistä linnuista olisi saanut ajan kanssa upeita kuvia! Muita mukavia lajeja kosteikolla ja sen tuntumassa olivat Knob-billed Duck, Saddle-billed Stork ja matkamme toinen Shoebill eli kenkänokka. Hiukka piti kiirettä suunnatessamme Niilin rantaan, sillä olimme varanneet veneristeilyn kohti delta-aluetta. Tarkkasilmäinen venekuskimme tiesi ja tunsu rantalintujen paikat ja niinpä pääsimme mukavasti kuvausetäisyyksille isoa joukkoa rantalintuja. Retkilajiemme listaa veneajelumme ei kuitenkaan kartuttanut, mutta olihan se upeaa nähdä kuutisenkymmentä Grey Crowned Cranea lähietäisyydeltä! Päivän mittaan ajoimme isohkon silmukan savannimaisemassa nähden huiman määrän upeita isoja nisäkkäitä: kirahveja, elefanteja, buffaloita ja erilaisia antiloopeja ja apinoita sekä sakaalin. Leijona ei ole erityisen runsas Murchisonin kansallispuistossa, joten lepäilevän koirasleijonan näkeminen kuvauksellisesti oli ilahduttava asia. Kun vielä leopardi löytyi lepäilemästä ison puun poikkioksalta tuntui siltä, että meitä hemmotellaan. Lintupuolella suomalaismieliä lämmittävät aina lepinkäiset ja taskut: eipä siis ollut hassumpaa, että arotaskun lisäksi



Grey Crowned Crane, Ugandan kansallislintu, Murchison National Park. Kuva: Juha Honkala

saimme kirjata lajilistaamme punapää- ja pikkulepinkäisen lisäksi myös ruostepäälepinkäisen. Yöpyminen Heritage Safari Lodge. Päivän lajit: 126, retkilajit yhteensä 272.

Grey Crowned Crane, Ugandan kansallislintu. Kuva: Juha Honkala

7.3.2018 Murchison National Park – Butiaban harjanne – Hoima, 163 km

Olimme autossa ja menossa eteenpäin ennen auringonnousua. Aamuhämärissä olimme kuulleet Long-tailed Nightjarin majatalomme takaa, joten kehrääjät olivat kovasti mielissä lähtiessämme ajelemaan eteenpäin. Emme päässeet kilometriäkään, kun automme valoista lennähti kehrääjä ja pian toinen, ja sitten ne istuivatkin rinnakkain ajoradalla: kaksi Standard-winged Nightjaria, koiras ja naaras! Upea alku päivälle! Mutta mistä ihmeestä tuolle puoliautiolle tienpätkälle siunaantui juuri sillä minuutilla iso kuorma-auto? No, se ajaa jyrtytti meitä vastaan säikäyttäen kehrääjät tiehensä. Jäimme kuvitta ja jatkoimme etelän suuntaan, kohti Niilin ylityspaikkaa, jonne piti ehtiä klo seitsemäksi, aamun ensimmäiselle lautalle Paraan lauttarantaan. Swamp Nightjar kuitattiin retkilajeihin vielä ennen päivälintuja. Lauttarannassa näimme matkamme ainoat Wire-tailed Swallow't ja ensimmäiset Yellow-throated Leaflovet. Aamupäivän käytimme Niilin eteläpuolella puustoisessa ja kumpuilevassa savannimaisemassa, pysähdellen siellä täällä. Klaas's Cuckoo, Cardinal Woodpecker, Brown-backed Woodpecker, Buff-bellied Warbler, Eastern Olivaceous Warbler ja Crested Francolin kuitattiin listoille.



African Wattled Lapwing. Kuva: Juha Honkala

Puolen päivän jälkeen saavuimme Butiaban harjanteelle (Butiaba escarpment), jossa lounastimme auton vieressä, puun alla varjossa. Lounaspaketti on mainio keksintö, sillä Ugandassa tienvarsiruokaloita on turha etsiskellä isompien valtateiden ulkopuolelta. Ja nyt olimme selkeästi maaseudulla. Aurinko paahtoi kuumasti ja voitelimme itsemme suojavaiteilla ennen pieniä kävelyretkiä. Lounaspaikkamme oli lupaavan oloisen rotkon tuntumassa, ja lintujakin liikkui hieman, mutta oli kyllä selvästi kuuma

ja siksi hiljaista. African Firefinch ja Cinnamon-breasted Bunting löydettiin. Hieman myöhemmin Stephen kuuli jostakin kaukaa Brubrun äänen. Varttinunnin atrapoinnilla lintu saatiin liikkeelle kuumuudesta huolimatta ja kaikki näkivät sen lopulta loistavasti. Tien varresta kävimme etsimässä nuotin mukaiselta paikalta Vitelline Masked Weaverin ja sitten palasimme vielä rotkolle. Melkein välittömästi löytyi odottamamme laji Mocking Cliff Chat. Saimme katsella pariskuntaa kaikessa rauhassa hyvän aikaa. Tämän jälkeen nousimme ylös rinteeseen ja etenimme jonkunlaisessa linjassa tien suuntaisesti. Ylimpänä kulkenut Andreas ajoi ilmaan Quailfinch-pariskunnan ja näki pikaisesti Foxy Cisticolan! Hyvät lajit – onneksi Hannu ehti näkemään paikan, johon Quailfinchit laskeutuivat, joten saimme ne pian kaikki kiikariin. Foxy Cisticola juoksutti meitä, sillä varovainenkin atrapointi tuntui ajavan linnun pois päin. Ylhäällä kukkulalla saimme kuitenkin kosketuksen lintuun ja näimmekin pian kaksi Foxy Cisticolaa – loisto homma! Iltapäivän lopulla saavuimme mahdollottoman mukavaan Hoima Cultural Lodgeen, joka tuntui keitaalta hikisen päivän jälkeen. Lodgen pihalla oli mukavasti pihalintuja, joiden katselemisessa vierähti jäljellä ollut valoisa aika. Päivän lajit: 129, retkilajit yhteensä 309.

8.3.2018 Hoima – Kibale National Park, 216 km

Tie Hoiman kaupungista Fort Pontaliin olikin suurimmaksi osaksi tuoreeltaan päällystetty! Ryhmällemme luvatusa afrikkalaisesta perusrynkyytyksestä jäi nyt huomattava osa kokematta. Kukaan ei kuitenkaan näyttänyt asian johdosta kovin pettyneeltä. Onneksi viimeiset 1,5 tuntia olivat sitä itseään ja tie oli ns. alkuperäisessä kunnossa! Lintustopit maaseutumaisemassa tuottivat Winding Cisticolan ja Holub's Golden Weaverin sekä Yellow-bellied Waxbillin ja Brown Babblerin. Lounastimme vasta klo 14 aikoihin Fort Pontalissa jonka jälkeen käänsimme automme nokan tulosuuntaan. Ajoimme Kibalen kansallispuiston tutkimusasemalle, varttitunnin ajomatkan päähän kaupungista ja käytimme täällä iltapäivämme pari valoisaa tuntia, osin sadetta pidellen, mutta kuitenkin linturikkaasta iltapäivästä nauttien. Kaikenlaista liikkui tutkimusaseman puistomaisessa ympäristössä: Willcock's Honeyguide, Speckle-breasted Woodpecker, Joyful Greenbul, Slender-billed Greenbul, Lowland Masked Apalis ja Lühder's Bushshrike



Willcock's Honeyguide. Kuva: Hannu Maula

saatiin muiden muassa mukavasti katseluetaisyydelle. Harmi, että illan komein lintu Crowned Eagle joi äänihavainnon varaan: kaksi lintu huuteli toisilleen pitkään, mutta ne olivat harmillisesti metsän harjanteen takana. Päivän päätteeksi ajoimme kahden seuraavan yömmе majataloon Isunga Lodgeen, joka osoittautui erinomaisen viehättäväksi paikaksi. Ja kuten monessa muussakin ugandalaisessa majatalossa, tarjoiitiin täälläkin meille kolmen ruokalajin illallinen. Ja jälleen kerran meillä oli Nile Special-olutta ruokajuomana. Päivän lajit: 103, retkilajit yhteensä 342.

9.3.2018 Kibale National Park, 45 km

Tänään yrittäisimme Pittaa. Aamu alkoi sekavissa merkeissä: matkanjohtaja oli nukkunut huonosti johtuen vatsaongelmista ja saapui myöhässä aamiaiselle. Kaikkien yöunet olivat jääneet lyhyiksi. Lähdön hetkellä Stepheniä ei näkynyt missään, mutta paljastui, että hän olikin odottanut meitä autolla ja oli jättänyt myöskin vatsavaivaisena aamiaisen väliin. Stephen ajoi tarpeettoman kovaa sovittuun paikkaan, josta meidän oli tarkoitus poimia mukaan Pitta-oppaamme Gerard. Gerardia ei näkynyt missään. Odoteltiin ja odoteltiin. Koetettiin pysytellä rauhallisina. Aivan kuin taivas alkaisi jo vaalenemaan... Gerard ilmestyi jostain, ja melkein jo lähdimme Pitta-metsään, kun pitikin vielä hoitaa paperiasioita. Nimet kirjaan ja passinumerot, oltiinhan kansallispuistossa. No, liikkeelle päästiin kuitenkin! Ajoimme muutaman kilometrin ja jalkauduimme metsään. Kuljimme Gerardin perässä otsalamppujen valossa. Metsässä oli vielä aivan pimeää, mutta simpanssit heräilivät ja kiljuivat ylhäällä puissa. Niitä oli paljon. Gerardilta olimme kuulleet, että Pitän soidinta ei ollut kuulunut aikoihin. Hiljattain oli kuitenkin satanut hiukan, joten kuiva kausi oli ohi, ja olisi mahdollista, että kuulisimme soidinta. Ja jos emme soidinäänen avulla onnistuisi paikallistamaan Pittaa, koettaisimme etsiä sen maasta, linnun laskeuduttua ruokailemaan. Ihan hyvä toimintasuunnitelma. Asetuimme sopivaan paikkaan odottelemaan ja koetimme olla aivan ääneti. Red-chested Owlet äänteli, hyvä! Seisoimme kärsivällisesti ja Pitän soidinääni kuului kahdesti, eikä edes kovin läheltä. Sen jälkeen ei mitään. Toimintasuunnitelma eteni seuraavaan vaiheeseen: Gerard ja Stephen lähtivät etsimään Pittaa

metsän pohjalta ja me muut jäimme paikoillemme odottamaan etsinnän tuloksia. Odotellessa kuuntelimme metsän lintuja ja simpansseja: Yellow-billed Barbet, Red-tailed Bristlebill, Green Crombec, Scaly-breasted Illadopsis ja Brown Illadopsis tulivat havaituiksi. Ehkäpä tunnin seisoskelun jälkeen Gerard ilmaantui: Pitta ruokaili lähistöllä! Lähdimme ripeään ja niin äänettömään marssiin kuin mahdollista, eikä matkaa ollutkaan kuin satakunta metriä: Green-breasted Pitta ruokaili maan rajassa, edeten aika vauhdilla. Näimme sen onneksi kaikki varsin nopeasti, joten tunnelma vapautui. Huh, mikä helpotus! Seuraavan 15 minuutin aikana näimme Pitan vielä kahteen otteeseen, mutta sitten se vain katosi. Gerard ja Stephen koettivat paikallistaa sitä vielä puolen tunnin ajan, mutta tuloksetta. Päätimme, että tämä oli nyt tässä. Ei kuvia, mutta kuitenkin hyvin nähty Green-breasted Pitta! Kevein mielin lähdimme hämyisestä metsästä ja teimme kävelylenkin sekundääripensaikon reunoja kierellen. Great Blue Turacot näyttäytyivät hienosti, mutta aamun todellinen yllätyslaji löytyi vaatimattomasta pensaasta: kaksi White-collared Olivebackia ruokaili kaikessa rauhassa ja saimme katsella niitä yllin kyllin! Gerard oli ihmeissään, sillä hän sai eliksen. Loistoaamu siis meille kaikille! Päivä olikin jo puolessa, joten siirryimme lounastauolle ihan Bigodi Swampin tuntumaan, pienen ravintolan terassille.



White-collared Oliveback, todellinen yllätyslaji! Kuva: Juha Honkala

Iltapäivän ohjelmamme olisi Bigodi Swampin kävely ja sen jälkeen Kibalen metsälajien havainnointia päätien varren tähytyspaikoilta. Olimme juuri aikeissa lähteä Bigodi Swampille alueen paikallisopas Rogerin kanssa, kun taivaalta alkoi tulla vettä erittäin runsaasti. Onneksemme saimme seuraavan tunnin ajan pidellä sadetta katoksen alla. Sateen tauottua lähdimme parin kilometrin kierrokselle kosteikolla. Mukavana yllätyslajina näimme loistavasti White-tailed Ant Thrushin ja pian tämän jälkeen yritimme White-spotted Flufftailia, jonka ääntelyä kuului märästä ryteiköstä. Ehkä kaikkien yllätykseksi lintu tallusteli editsemme pimeään pensaikon alla, mutta mainiosti nähtävissä. Tästä riemastuneina jatkoimme matkaa. Itse kosteikon yli oli rakennettu pitkospuut. Avovettä ei ollut, oli vain tuulessa huojuvaa papyrusta, monta metriä korkeaa. Koetimme hetken atrapilla houkutella White-winged Warbleria ja kuulimme linnun, mutta näkemisestä ei puhuttakaan. Taivas oli paksussa pilvessä ja valon määrä ihmeen vähäinen, tuntui siltä, että alueelta oli päästävä pikaisesti eteenpäin. Kun Roger oli hyvästeltä, matkamuistofiguurit ostettu ja apinat kuvattu, pääsi ryhmämme jatkamaan matkaa. Pilvimassakin oheni sopivasti metsäalueelle tullessamme! Cassin's Flycatcher löytyi nopeasti pieneltä vesikiveltä ja pian tämän jälkeen isoista puista löytyi pari Black Bee-eateria. Blue-throated Roller, Buff-spotted Woodpecker ja Grey Parrot sopivat myös mukavasti illan tunnelmaan! Päivän lajit: 92, retkilajit yhteensä 369.

10.3.2018 Kibale NP – Queen Elizabeth National Park, 116 km

Jätimme aamiaisen jälkeen jäähyväiset Isunga Lodgelle ja ajoimme vielä pariksi aamutunniksi Kibalen kansallispuistoa halkovan tien varteen, sillä täällä oli vielä mahdollisuuksia metsälajeihin. Eliot's Woodpecker, Velvet-mantled Drongo, Sabine's Spinetail ja Green Sunbird tulivat havaituiksi, mutta Crowned Eaglen suhteen jouduimme pettymään. Oli jatkettava matkaa. Lounasaikaan oli kuuma. Hannun matkamittatri näytti + 33 astetta. Lounastimme Kasesen kaupungissa ja jatkoimme tietä etelään Queen Elizabethin kansallispuistoon. Pysähdyimme Queen's Pavilionin näköalapaikalla ja haroimme kaukoputkilla järvelle, jossa näytti olevan runsaasti lintuja, mutta lämpöväreily oli aivan hirvittävä ja ainoastaan lennossa

ollut Great White Pelican saatiin tunnistettua lajilleen. Stephen käytti ajan ryhmämme havainnointiajan hyväksemme ja kirjautti meidät sisään tulleiksi puistoon. Kazinga Channelin pysähdyksellä näimme Papyrus Gonolekin hienosti sekä satoja Chlidonias-suvun tiiroja, joista valtaosa oli valkosiipitiiroja. Kävimme jättämässä matkatavaramme Pumba Safari Cottages-nimiseen majataloon, joka vaikutti ystävälliseltä, siistiltä ja juuri sopivalta tarpeisiimme. Ja vielä oli päivää jäljellä – ehdimme hyvin ajelemaan rauhallisesti, safariasennossa, pensaikkoisella savannilla Macarabamban tiellä (Jacana Safari Lodgelle johtava erinomainen tie). Lintuja oli runsaasti ja pysähtelimme tämän tästä. Black Cuckoo, alalajia *gabonensis* nähtiin varsin mukavasti ja kostealla ruohomaalla ruokaili 70 Red-billed Quelean parvi, Red-collared Widowbird oli runsaslukuinen ja Brown Twinspot kuultiin. Päivän lajit: 111, retkilajit yhteensä 382.




Valkosiipitiiraja ja kuovisirrejä, Kazinga Channel. Kuva: Juha Honkala

11.3.2018 Queen Elizabeth National Park, 126 km

Vietimme aamutunnin tien varressa, Kazinga Channelin sillan eteläpuolella katsellen rantaruovikon lintuja. Näimme pikkuhaikaran ja löysimme Papyrus Gonolekin pesän, mutta arvolajeja saisisimme odottaa iltaan. Läheisestä Katungurun kylästä kävimme bongaamassa Lesser Masked Weaverin ja sitten jatkoimme kansallispuistoon. Ajatuksena oli aamun tunteina kiertää kraaterijärvien kierros, jolloin näkisimme savannilajistoa. Itse järveltä ei ollut odotettavissa mitään erikoista, sillä Lesser Flamingot ovat järvillä eri aikaan vuodesta. Nopeasti selvisi, että aamu oli kolea ja t-paidassa matkaan lähteneet palelivat, mutta auton kattoa pidettiin auki, eli safari-asennossa – ylhäältä kun näki paremmin. Aamun lintuja olivat mm. Red-necked Francolin (Spurfowl), Crested Francolin, Lappet-faced Vulture ja Ayres's Hawk-Eagle – mutta matkamme ainoa Copper Sunbird jäi Andreasin yksin havaitsemaksi. Jacobin Cuckoo ja Eurasian Cuckoo nähtiin hyvin – varmuuden vuoksi pyrimme aina valokuvaamaan käet, jotta hyvin samannäköiset African Cuckoo ja Eurasian Cuckoo saataisiin varmasti tunnistettua lajilleen oikein. Päätimme maastoajo-osuuden eiliselle näköalapaikalle. Aamun koleudesta johtuen näkyvyyttä haittaavaa lämpöväreilyä ei ollut, ja järvellä ruokailevia lintuja kyettiin kaukoputkella määrittämään. Järveltä saatiin kaukoputkella irrotettua mm. pikku-uikku ja lampiviklo (yhdessä valkoviklon kanssa) sekä joukko isompia lintuja, kuten African Spoonbill. Palatessamme päätieta Katungurun suuntaan löytyi tienvarresta viimeinkin joukko korppikotkia, joita olimme odottaneet näkevämme jo Murchison NP:ssä. Korppikotkat olivat melko lähellä, joten saimme katsoa niitä mukavalta etäisyydeltä. Uusia lajeja olivat White-backed, White-headed -, Rüppell's – ja Hooded Vulture sekä lähistöllä nähty Beadouin's Snake-Eagle.

Katungurusta käännyimme lounaaseen. Tarkoituksena oli ajaa Mweyan niemelle, jossa lounastaisimme ennen Kazinga Channelin veneristeilyä. Ajoimmekin vähin pysähdyksin perille Tembo Canteeniin, jossa tilasimme lounaat. Tembon pihassa oli mukavasti lintuja. Marabuja oli puolen tusinaa pihalintuina. Aika synkän oloista porukkaa, vaan hauskaa oli niitä valokuvata. Marabun mielen liikkeistä

kertonee jotakin se, että kahden kutojakoiraan nahistellessa pihanurmella keskenään, katsoi eräs marabuista hetkensä tulleen ja koetti hotkaista riitapukarit suihin. Onnekseen kutojat huomasivat vaaran ja ehtivät lennähtää tiehensä. Kun lounasannoksemme tuotiin, piiritti meidät välittömästi neljä marabua. Ne olivat siinä selän takana, parin metrin päässä, väijyen tilaisuuttaan. Olihan se jännittävää, ja oikeastaan aika häijyn tuntuista, kun moinen likanokka näyttää valmiilta taistelemaan annoksesta. Mutta ei kaikki vielä tässä. Seuraava lounasporukka oli paikallistanut meidät. Seepramangustien perhekunta lähestyi meitä loikkien, suuntasi pöytämme alle ja laittoi maaten siihen jalkojemme juureen. Ihmeellisen rentoa porukkaa! Ja ehkä noin 700 kertaa mukavampia ruokavieraita kuin marabut. Annoimmekin mangusteille kalanruotoja sun muita perkeitä ja ne näyttivät maistuvan. Hauskoja otuksia! Tosin yksi niistä iski neulanterävät hampaansa pikkubarpaaseeni – vissiin se näytti äyriäiseltä tai muulta syötävältä. Mangusteja olisi ollut hauska seurata pidempään, mutta klo 15 läheni uhkaavasti. Sillä kellon lyömällä kun nousimme Kazinga Channelin risteilyalukseen.



Lounasvieraana marabu, valmiina hotkaisemaan lautasen tyhjäksi. Kuva: Juha Honkala

Kazinga Channelin veneristeily on suosittu ohjelmanumero kansallispuistossa vierailevien keskuudessa. Niinpä aluksemme oli varsin täynnä tavallista turistia, ja jouduimme lisäksi jäämään alakannelle, yläkannen ollessa jo täynnä. Epäilyksiä risteilyn mielekkyydestä tahtoi herätä... - vaan onneksi epäilykset kaikkosivat pian. Aluksen kapteeni tiesi kuinka rantalinnut näytetään ja ajovauhtikin oli sopivan rauhallinen. Aluksella matkaavilla kaiken tasoilla kamerankuluttajilla oli varmasti runsaasti mahdollisuuksia mukavien kuvien ottamiseen. Ja lintuja olikin runsaasti ja määritysetäisyydellä: satoja valkosiipitiiroja, niilinhanhia, kuovisirrejä, karikukkoja, suokukkoja, rantasipejä, Water Thick-knee, Grey-hooded Gull, selkälokkeja (yhteensä 260 ja joukossa kaksi Suomessa värirengastettua). Lisäksi kanavan rannalla oli runsaasti virtahepoja, kob-antilooppeja, buffaloita ja paviaaneja.

Iltapäivän lopulla ajelimme rauhallisesti Mweyan niemeltä kohti majapaikkaamme. Matkalla onnistuimme näkemään Verreaux's Eagle-Owlin ja White-tailed Larkin, loistavaa! Pysähdyimme vielä Kazinga Channelin sillan eteläpuolella ja kuittasimme rantakosteikolta Lesser Swamp Warblerin ja Carruther's Cisticolan. Päivän lajit: 149, retkilajit yhteensä 414.

12.3.2018 Queen Elizabeth National Park – Bwindi, Buhoma, 140 km

Aamulla ajoimme Ishasa-nimisen alueen läpi Kihihin pikkukaupunkiin jossa lounastimme. Maan tapa on syödä majatalosta saadut lounaspaketit ravintolassa, josta tilataan vain juomat. Mutta ei mennä asioiden edelle, näimme lintuja Ishasan savannialueella ihan kivasti: White-winged Widowbird, African Crake, Southern Red Bishop, Senegal Lapwing ja muuttohaukka. Aamun sykehdyttävimmät lajit olivat kuitenkin Black Coucal, joka nähtiin hienosti kaukoputkella ja josta saatiin kuvatkin, sekä yllättäen löytynyt Broad-winged Warbler (uusi nimi on Fan-tailed Grassbird). Kyseisen lajin ääntä soitin edellisvuoden matkalla kyllästymiseen asti, tuloksetta. Myös tänä aamuna olin soitellut atrappia monissa paikoissa, tuloksetta. Mutta sitten oli onni myötä. Olimme pysähtyneet jotakin kaukaista petolintua katsomaan, kun Stephen kuuli linnun laulavan. Laulu oli odottamaani huomattavasti vaimeampi, se ei mitenkään erikoisesti noussut esiin äänimaisemasta, vaikka laulaja oli alle 100 m päässä. Soitin varovasti atrappia ja laulaja tuli lähemmäs parinsa kanssa. Loistojuttu! Linnut katselivat meitä aikansa pensaan nokasta, totesivat meidät pian epäkiinnostaviksi ja jatkoivat touhujaan tahollaan.



Crested Francolin, Queen Elizabeth NP. Kuva: Juha Honkala


Nisäkkäistä näimme elefanttien lisäksi maailman nopeimmaksi antiloopiksi mainittuja topi-antilooppeja. Ne tuijottivat meitä totisen näköisinä eivätkä näyttäneet mitenkään erityisen virtaviivaisilta ja solakoilta. Kaiken kaikkiaan kostealla ruohosavannilla oli paikoin hyvin runsaasti pikkulintuja (weavers, firefinches, waxbills jne), joiden määrittämiseen meillä ei ollut riittävästi aikaa.

Iltapäivällä saavuimme Buhomaan ja asetuimme Buhoma Community Guesthouseen. Meitä oli vastassa Matthew, jonka kanssa katselimme Bwindin lintuja edelliselläkin matkalla. Matthewn tapaaminen oli iloinen ja positiivinen yllätys,

sillä hän on loistava paikallisopas. Majatalomme oli aivan kansallispuiston portilla ja sen ravintolan terassilta on loistava näkymä metsäiseen laaksoon. Käytimmekin tihkusateisesta iltapäivästä pari tuntia terassilla rentoutumiseen ja lähilintujen tarkkailuun. Sateen lakattua lähdimme kevyelle iltakävelyllä puiston portin sisäpuolelle. Uusia lajeja tuli iltapäivän aikana mukavasti, mm. Cape Wagtail, Honeyguide Greenbul, Grey-winged Robin-Chat, White-eyed Slaty Flycatcher, Northern Double-collared Sunbird ja Thick-billed Seedeater. Päivän lajit: 131, retkilajit yhteensä 432.

13.3.2018 Bwindi National Park, Buhoma, 5 km

Aamiaisen jälkeen lähdimme majatalostamme jalkaisin kohti Cascade Loop-trailia (noin 1 300 m merenpinnan yläpuolella). Aamu oli viileä, +16 C ja pilvinen. Matthewn apupoika Nick seurasi vanavedessämme, kuten myös kaksi puiston aseellista vartijaa. Mahdollisuus, että kimppuumme olisi käynyt vimmastunut gorilla tai elefanti lienee ollut lähinnä teoreettinen, mutta säännöt ovat sääntöjä, ilman vartijaa kansallispuiston poluille ei turistilla ole asiaa. Etenemisvauhimme polulla oli hidas, vaikka lintuja tuntui olevan jotenkin niukasti. Parvia emme juuri havainneet ja lauluaktiivisuus oli aika lailla



African Wood Owl, 2 kpl, Buhoma, Bwindi. Kuva: Juha Honkala

olematon. Enteiliköhän lintujen käytös tulevaa sadetta? White-headed Wood-Hoopoe, Bar-tailed Trogon, Stuhlmann's Starling, Red-tailed Bristlebill ja Montane Oriole sentään nähtiin. Red-chested Alethea saimme katsoa oikein kunnolla, mutta Blue-shouldered Robin-Chat oli varsin piileskelevä ja näköhavainnot siitä jäivät lyhyiksi. Söimme lounasta Cascade Loopin alussa maassa istuskellen ja tämän jälkeen jätimme Börjen ja Nickin risteyspaikkaan vahtiin. Kapusimme edelleen ylämäkeen vain todetaksemme metsän äänettömyyden. White-bellied Robin-Chat nähtiin, mutta ei juuri muuta. Palasimme Börjen ja Nickin vahtipaikalle ja lähdimme paluumatkalle taivaan synkistyessä hetki hetkeltä. Grey-headed Sunbird nähtiin kohtuullisen hyvin juuri ennen sadetta. Nyt ei ollut muuta tehtävissä kuin marssia sateenvarjon alla kohti Buhoma Community Guesthousea. Kuuma kahvi maistui perille päästyä!

Sateen loputtua klo 16 lähdimme kylälle. Matthew tiesi eräässä suljetussa puutarhassa olevan African Wood-Owlin ja Red-chested Flufftailin. Nuori nainen päästi meidät sisälle ja marssimme puutarhan hämääjän kolkkaan. Ylhäällä puussa päivehti kaksi pöllöä – oikein hienoa! Koetimme kuvat niitä hankalissa valaistusolosuhteissa jonkun aikaa ennen kuin siirryimme puutarhan toiseen reunaan. Täällä koitimme atrapin avulla tavoittaa paikassa toisinaan havaitun Red-chested Flufftailin, mutta lintua ei näkynyt ei kuulunut. Chubb's Cisticola sen sijaan lauloi innokkaasti. Totesimme päivän uurastuksen riittävän ja lähdimme vetäytymään kohti tavanomaista ilta-ohjelmaamme eli illallista ja lintulistan päivittämistä. Päivän lajit: 88, retkilajit yhteensä 451.

14.3.2018 Bwindi – The Neck – Ruhija, 80 km

Saimme Buhomasta lähdettyämme heti pari onnistumisen kokemusta. Kävimme yrittämässä Red-chested Flufftailia pienellä maaseutukosteikolla päätieltä kilometrin verran sivummalle koukaten. Kosteikko oli matalakasvuinen notkelma peltojen välissä. Raivasin pienen avoimen alueen saraikkoon ja laitoin Flufftailin houkutusäänen hiljalleen soimaan. Lintu vastasi saman tien. Näytti jo siltä, että näköhavaintoa ei saataisi, mutta noutaessani soitinta pois, pötki saraikosta pakoon kaksi Red-chested Flufftailia kaikkien riemuksi. Seuraavaksi kokeilimme African Wryneckiä eli maanosan omaa käenpiikaa. Pysyttelimme edelleen maaseutumaisemassa, jota siellä täällä elävöittivät pystyyn jätetyt isommat puut. Erään viljelyksen kohdalla jalkauduimme ja Matthewn pyynnöstä soitin atrappia. Kuin taikauskusta punakurkkuinen käenpiika asettui laulamaan puun latvaan, noin 150 metrin päähän. Katselimme lintua kymmenisen minuuttia kaukoputkilla – oli selvää, että se ei tulisi lähemmäs, sillä laskeutumiseen sopivia puita ei ollut lähellämme, emmekä me halunneet laskeutua rinnettä alas. Tyydyimme tilanteeseen!

Matkattaessa maanteitse Bwindin kansallispuiston yläosiin Ruhijaan, yli 2 000 m korkeudelle, on kierrettävä kansallispuiston ulkopuolitse. Tultaessa seuraavan kerran kansallispuistoon, ollaan Neckiksi kutsutulla alueella, noin 1 700 m korkeudella. Metsä täällä on aavistuksen matalampaa kuin Buhoman alueella ja puut ovat epifyyttien peittämiä. Hienoa metsää! Eteemme tulleita lintuja The Neckin muutamalla metsäpysähdyksellä ja joenylityksellä olivat mm. Shelley's Greenbul, Mountain Wagtail, White-browed Crombec ja Many-coloured Bush-Shrike.



Mountain Wagtail, The Neck. Kuva: Juha Honkala

Saavuimme Ruhijaan iltapäivän puolella ja asetuimme Gorilla Mist Camp nimiseen majataloon kylän laidalle. Näkymät täältä 2 350 metrin korkeudelta Ruandan ja Kongon vuorille olivat upeat. Nautimme lounaspakettimme majatalon terassilla kaikkea mahdollista kiikaroiden. Pihalintuina meillä olivat mm. Chubb's Cisticola, Variable Sunbird, Baglaffeht Weaver ja Streaky Seedeater. Ilmatilassa lensivät Scarce Swift ja kotoinen räystäspääsky. Klo 16 aikoihin ajoimme pikkumatkan ja kokeilimme tienvarressa onneamme. Handsome Francolin näkyi mukavasti, Mountain Black Boubou näkyi ja kuului ja samoin Chestnut-throated Apalis ja Kandt's Waxbill. Seuraavaksi suuntasimme Community eli School trailille, jonne ilta-aurinko mukavasti paistoi. Lintuja oli hyvin näkyvissä miltei koko ajan, ja käytännössä olimme viimeisen tunnin ajan noin 100 metrin pätkällä tätä pikkutietä. Grey Cuckooshrike, Mountain Greenbul,

Yellow-streaked Greenbul, mustapääkerttu, Red-faced Woodland Warbler, Grauer's Warbler, Mountain Masked Apalis, Chinspot Batis ja Doherty's Bushshrike olivat illan uusien lajien joukossa. Aikamoista menoa siis! Illallisen jälkeen lähdimme vielä ajelulle, sillä tarkoituksenamme oli yrittää Ruwenzori Nightjaria. Kävimme katsomassa erästä Matthew'n tietämää vakiopaikkaa (ei mitään) ja tämän jälkeen ajelimme tuloksetta 15 km pikkuteillä. Mahdollinen selitys sille, ettei lintua näkynyt oli kylmäkö sää: tienpinnan ollessa yhtä kylmä kuin maanpinta ympäristössä se ei houkuttele kehrääjää lepäämään eikä myöskään vedä hyönteisiä puoleensa. Pitkästä päivästä johtuen jätimme lajilistan tekemisen seuraavaan päivään. Päivän lajit: 87, retkilajit yhteensä 482.

15.3.2018 Ruhija, Mubwindi Swamp, 16 km

Päivä käytettiin metsäretkeilyyn Ruhijan alueella. Kohteenamme oli Mubwindi Swamp, jonne johtava polku tiedettiin raskaskulkuiseksi. Börje jätti flunssasyistä tämän rankaksi arvoidun patikan väliin ja kävi Stephenin kanssa kevyemmällä vaihtoehtoretkellä. Klo 7.45 pääsimme silmukkapolun alkupäähän. Taivalluksemme alkoi mukavasti Ruwenzori Apaliksella, joita sekä näkyi että kuului. Mountain Illadopsis, Strange Weaver ja Doherty's Bush-Shrike saatiin myös kiikaritarkasteluun. Archer's Ground Robin osoittautui superkähmyksi, näimme sen ylittävän polun lentäen ja that's it. Polku laskeutui monin paikoin jyrkähkön oloisesti, mutta se ei ollut ennen sadetta minkäänlainen ongelma tervejalkaisille ja normaalikuntoisille. Aamupäivän lopulla alkanut kova sade veti kuitenkin mielteliääksi. Tarvoimme liukastellen eteenpäin eräänlaiselle näköalapaikalle, jossa oli pari raihnaista penkkiä. Tämä oli paikka, jossa oikeaan vuodenaikaan ja sopivissa olosuhteissa olisi mahdollista nähdä African Green Broadbill. Vaan nyt ei ollut se päivä. Kyhjötimme sateenvarjojemme alla ja nassutimme hiljaisina eväät ajan kuluksi. Tämän jälkeen odotimme lisää sateen loppumista. Puolitoista tuntia se kesti. Jatkoimme alamäkeen kohti suota, joka tuntui olevan aika kaukana. Matkalla näimme gorillalaskijoita, jotka olivat suorittamassa väestönlaskentaa. Edellisellä kerralla vuonna 2002 gorilloja oli Bwindin metsässä noin 360. Nyt odotetaan hiukan suurempaa lukua, kuulemma.

Ennen suonreunaa näimme Dwarf Honeyguiden ja Yellow-eyed Black Flycatcherin. Mubwindi



Ruwenzori Batis, Mubwindi Swamp. Kuva: Juha Honkala

Swamp näytti avosuolta, jonka vallitseva kasvillisuus on korkeaksi kasvavaa saraa. Välissä oli rimpipintoja ja reunoilta se oli upottava, se tuli kokeiltua. Projektilajimme oli Grauer's Swamp Warbler, jonka näimmekin aluksi pikku vilahduksina saraikossa, mutta ajan myötä uudelleen ja uudelleen ja oikeastaan aika kivasti. Aluksi lintu näytti lähes lentotaidottomalta, mutta innostuessaan se näytti pääsevän ainakin kolmen metrin korkeuteen! Yllätykseksemme näimme samoilta jalansijoilta suon reunapuissa viihtyvän Ruwenzori Batis'in. Erinomaista!

Paluumatka tuntui loputtoman pitkältä. Nousua korkeussuunnassa suolta ylös tielle oli 300 metriä ja tottumattomalle tuli hommassa hiki. Paluumatkalla meitä ilahduttivat Cinnamon Bracken Warbler ja Evergreen Forest Warbler – nämä molemmat kähmylinnut myös näimme. Tuntui hyvältä. Kun vielä erällä hengähdyspysähdyksellä nähtiin Waller's Starling voitiin olla oikein tyytyväisiä urakan suorittamiseen. Auton saavutimme klo 18 ja pääsimme siirtymään majataloomme ansaituilta tuntuvien virvokkeiden ääreen. Börje ja Stephen olivat kuitanneet omalta ekskursioltaan White-starred Robinin, Ruwenzori Apaliksensa ja gorillan! Kyllä, gorilla oli ylittänyt tien kaverusten nenän edestä. Suokävelijöiden joukko oli iloinen Börjen puolesta, sillä meitä kaikkia harmitti, että hän ei päässyt patikoimaan, vaan tulipahan kompensatiota oikein kunnolla! Päivän lajit: 65, retkilajit yhteensä 496.

16.3.2018 Ruhija – Lake Mburo National Park, 270 km

Hannun tekemän virallisen lämpötilamittauksen mukaan Gorilla Mist Campin huonelämpötila oli aamutuimaan + 13 C. Onneksi meillä oli kuumavesipullot ja huopia ym. nukkumavälinettä riittävästi, joten yöt sujuivat ihan kelvollisesti. Mutta ei tuntunut yhtään hassumalta ajatus, että vuorelta alaspäin mentäessä lämpötila kohoaisi. Lähdimme kohti Kabale-Kisoro maantietä ja pysähtelimme siellä täällä mennessämme. Tapasimme mm. yhteistyöhalukkaita Handsome Francolineja, ja pelottoman Abyssinian Olive Thrushin, Western Green Tinkerbirdin sekä Kandt's Waxbillin, jolla Börje sai nyt paikattua reiän lajilistassaan, sekä eräällä stopilla Yellow-crowned Bishopin. Kabale-Kisoro maantien yhytetyämme päätimme mennä yrittämään Ruaha Chat'tia. Tiedon mukaan seuraavassa kylässä oikealle käännyttyä, kutakuinkin keskellä kylää, oli Ruaha Chat nähty useampana vuonna. Stephen oli hiukan ihmeissään, sillä laji oli hänelle vieras, eikä hänellä ollut tietoa linnusta eikä paikasta. No, matkaa oli vain kolme kilometriä ja hujauksessa jalkauduimmekin maantien laitaan. Hyvän näköiseltä kostealta niityltä löytyi saman tien Grassland Pipit. Ja hetken päästä selkämme takaa talon katolta löytyi Ruaha Chat-naaras. Lintu oleskeli vaatimattoman rakennuksen pihapiirissä ja sitä tarkkaillessamme, ilmaantui paikalle kaksi koirasta, jotka



aloittivat aikamoisen soidinesityksen kivimuurin päällä. Loistavaa! Saman talon pihapiirissä istuskeli myös kaksi Rock Martinia, joten kylää voitiin pitää aika mainiona. Mainittakoon, että Ruaha Chat on hiljattain splitattu maasto-oppaassamme kuvatusta White-headed Chatista. Lajin päälevinneysalue on Tansaniassa.

Ruaha Chat, koiras ja naaras. Kuva: Juha Honkala

Matkallamme kohti Lake Mburoa pysähdyimme erään laajan papyrusta kasvavan kosteikon laidalla parissa paikassa, projektilajina oli Papyrus Yellow Warbler. Oli keskipäivä ja aika kuuma, tuulen heilutellessa papyrusruovikkoa. Soitin atrappia, katselimme ja kuuntelimme. African Marsh Harrier lensi ylitsemme. Paikkaa vaihdettuamme lennähti jostakin pieni keltainen lintu lähipuun latvaan muutamaksi sekunniksi. Andreas ehti ottamaan linnusta dokumenttikuvan, ennen kuin lintu lähti jonnekin. Se katosi. Ikävän nopea tilanne! Myöhemmin kuvaa huolella tutkien selvisi, että havaittu laji olikin Dark-capped Yellow Warbler.

Iltapäivän keskivaiheilla ehdimme viimein Lake Mburon kansallispuistoon. Maisema oli pensaikkoista ja puustoista savannia, jota elävöittivät seeprat, buffalot ja paviaanit. Ajoimme vähin pysähdyksin järven rantaan asti. Tarkoituksena oli lähteä veneilemään. Kapteenilla oli hiukan vaikeuksia ajankulun hahmottamisen kanssa, ja klo 16 tarkoitettu lähtö viivästyi puoli tuntia. Vaan kapteeni paikkasi epätasällisuuttään veneen ruorissa mainiosti: tarkkasilmäisenä ja järven lintujen suosikkipaikat ja

tapaamisajat tuntien veneilimme järven rantoja myötäillen ja virtahevot turvallisen kaukaa kiertäen. Pikkuhaikara poseerasi meille lähietäisyydeltä, rantaviivassa käveleskeli metsävikloja ja African Fish Eaglesta saatiin vielä lisää kivaa kuvaa pehmeässä iltavalossa. African Finfootia saatiin hakea aivan järven etäisimmästä perukasta asti, mutta suureksi iloksemme varjoisasta rantavyöhykkeestä niitä löydettiin yhteensä kolme yksilöä. Ilta ehti jo tummua, kun viimein saavuimme majatalomme Eagles Nestin pihaan. Tulotie majatalolle olikin ehkä yksi jyrkimmistä koskaan näkemistäni. Stephenillä oli täysi työ saada auto pihaan. Eagles Nestissä majoituimme erikoisissa telttahuoneissa, joiden yhteyteen oli rakennettu kullekin teltalle oma kylpyhuone! Ihan hauska ratkaisu. Täällä sai ainakin raikasta safari-ilmaa riittävästi ja yön äänet olivat kuultavissa. Päivän lajit: 109, retkilajit yhteensä 507.



Spot-flanked Barbet, Lake Mburo NP. Kuva: Juha Honkala

17.3.2018 Lake Mburo – Kagu Swamp – Mpanga forest – Entebbe, 292 km

Ennen auringonnousua kuulimme majatalon pihaan Freckled Nightjarin, söimme aamiaisen ja nostimme laukut autoon. Lähdimme liikkeelle ja lyhyen ajon jälkeen Stephen plokkasi ajaessaan lentävän Green-winged Pytilian, joka laskeutui hetkeksi pensaikkoon. Hatunnoston arvoinen suoritus! Ajoimme kansallispuistoon, melko lähelle järveä, pienelle kukkulalle nousevalle sivutielle. Ensin löytyi Southern Black Flycatcher ja Yellow-breasted Apalis, sitten Crested Barbet-pariskunta ja hetkistä myöhemmin Long-tailed Cisticola. Tien varressa meitä katseli utelias Dwarf Mongoose, mukavan pörröisen näköinen karvaotus, mutta sielultaan luultavasti täysi peto. Viimeinen aamumme Ugandassa alkoi vedellä viimeisiään, vaan vielä



Dwarf Mongoose, Lake Mburo NP. Kuva: Hannu Maula

ehdimme näkemään pikkukiljukotkan, Red-faced Crombecin ja White-winged Tit-parin. Matkallamme Entebbeen ohitimme Kagu Swampin, laajan kosteikkoalueen, jonka avovesialueilla oli runsaasti vesilintuja vuoden takaisella käynnilläni. Nyt en ollut uskoa silmiäni saapuessamme alueelle: vettä oli mitättömässä lammessa muutaman aarin verran, ympäristö kasvoi korkeata ja sankkaa ruokoa. Katsoimme kymmenessä minuutissa tarpeeksemme ja lajilistaan lisättiin vain Hottentot Teal. Kagu Swamp oli pahasti kuivunut.



Iltapäivän edetessä laskeskelimme, että ehtisimme tekemään vielä jotakin. Stephenin mielestä Mpanga forest olisi mielekäs kohde, sillä se oli aivan ajoreittimme varrella. Tarvittiinkin vain reilun kilometrin koukkaus sivuun ja olimme Mpangan parkkipaikalla. Onneksemme paikan lintuasiantuntija ja -opas Prossy (koko nimeltään Proscovia Nanyombi) sattui olemaan parahiksi paikalla! Stephen jätti meidät Prossyn haltuun ja meni itse Börjen seuraksi autolle. Börje oli vielä sen verran uupunut, että jätti iltapäiväkävelyn väliin. Totesimme Prossylle, että meillä on tunti aikaa, katsellaan mitä ehditään. Mpangan metsä on suojeltu ja sen puut ovat huiman korkeita. Upea paikka. Ja klo 16 aikaan aluksi pelottavan hiljainen. Mpanga on hyvä paikka nähdä Weyn's Weaver, mutta Prossy kertoi, ettei lintuja ole näkynyt pariin viikkoon. No, tallustelimme metsään ja pikku hiljaa löytyi kaikenlaista: Narina Trogon nähtiin, samoin Red-shouldered Cuckoo-Shrike ja Yellow-mantled Weaver. Piileskelevä Fraser's Rufous Thrush saatiin myös houkuteltua näkösalelle – niitä olimme kuulleet matkamme metsäkohteissa useita, mutta vasta viimeisenä päivänä pääsimme näköyhteyteen. Sääli, että meillä ei ollut enempää aikaa tähän paikkaan! Oli pakko kiittää Prossya ja sanoa näkemiin, ja niin jatkoimme Entebbeen. Kävimme Airport View Hotelissa 45 minuutin siistiytymispysähdyksellä: suihku, tavaroiden järjestely ja lentovaatteet ylle. Ryhmämme toiminnot olivat kahdessa viikossa hioutuneet äärimmäisen tehokkaiksi. Hotellin respan neiti ei ollut käsittää vierailumme lyhyttä kesto! Ja niin ajoimme Victoria Mall-ostoskeskukseen illalliselle. Meitä tulivat tervehtimään tavattoman ystävälliset Samuel ja Cate Makanga Prime Safaris firmasta – heidän käsialaansa oli majoitustemme valinta. Ja neidän olivat onnistuneet. Seuraavaksi ajaa hurautimme Entebben lentoasemalle ja hyvästelimme Stephenin. KLM:n lentomme lähti klo 23 aikoihin Amsterdamiin. Kotoisiin maisemiin laskeuduimme seuraavana aamuna klo 10 tietämissä. Päivän lajit: 119, retkilajit yhteensä 523.



Ryhmämme Budongo forestissa, lounastauon jälkeen. Vasemmalta oikealle Andreas, Juha, Börje, Stephen, Hannu ja Marita.



Ylhäällä leijona, Murchison NP ja Lilac-breasted Roller, Lake Mburo NP. Keskellä Yellow-billed Oxpecker virtahevon selässä, Murchison NP. Alhaalla sakaali, Murchison NP. Kuvat: Juha Honkala



Ylhäällä vasemmalla Variable Sunbird ja Chubb's Cisticola, Ruhija, kuvat Juha Honkala. Alhaalla norsu, Queen Elizabeth NP. Kuva: Hannu Maula.



Yläkuvassa selkälökkejä, etualalla Grey-hooded Gull, kuvan keskellä *Larus (fuscus) barabensis*. Keskirivin kuvissa Banded Mongoose, kyseinen mangusti puri kirjoittajaa varpaaseen! Keskellä oikealla Golden-breasted Bunting. Alla White-browed Coucal. Kuvat: Juha Honkala



Yllä leopardi, Murchison NP. Alla vasemmalla African Green Pigeon, Queen Elizabeth NP. Oikealla Blue-naped Mousebird, Kagu Swamp. Kuvat: Juha Honkala

Matkamme lajilista

Lajilista seuraa käyttämämme maasto-oppaan **Birds of East Africa** (Stevenson & Fanshawe, 2002) lajijärjestystä, mutta muutama lajinimi on listaan nykyaikaistettu: Beaudouin's Snake Eagle on saanut lajistuksen teoksen ilmestymisen jälkeen, kirjan Red-necked Spurfowl on listassamme nyt Red-necked Francolin, Broad-winged Warblerin uusi nimi on Fan-tailed Grassbird, Yellow-backed Weaver on listaan nimetty nykyaikaisemmin Black-headed Weaveriksi. Teoksesta puuttuu kokonaan mm. House Sparrow (tulokaslaji). Lajitaulukon plate-sarake viittaa maasto-oppaan kuvataulunumerointiin.



Entebbe – Kafu – Murchison Murchison Hoima – Kibale Kibale NP – Queen Queen Bwindi NP, Bwindi – The Ruhija, Ruhija – Lake Mburo Lake Mburo – Mpanga forest – Entebbe
Mabamba Budongo, National NP – Butiaba– National Park National Park Queen Elizabeth National Park Queen Elizabeth NP– Bwindi Buhoma Neck – Ruhija Mubwindi Swamp

plate			4.3.2018	5.3.2018	6.3.2018	7.3.2018	8.3.2018	9.3.2018	10.3.2018	11.3.2018	12.3.2018	13.3.2018	14.3.2018	15.3.2018	16.3.2018	17.3.2018
1	Common Ostrich	<i>Struthio camelus</i>														
7	Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>								3						
7	Great White Pelican	<i>Pelecanus onocrotalus</i>							1	1						
7	Pink-backed Pelican	<i>Pelecanus rufescens</i>	20		4	4			3	60						
8	Reed Cormorant	<i>Microcarbo africanus</i>	20		20	600			9	60						
8	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	1						100						
8	African Darter	<i>Anhinga rufa</i>		1	10											
8	African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>													2k1n	
9	Little Bittern	<i>Ixobrychus minutus</i>	1							1					1k	
9	Black-crowned Night Heron	<i>Nycticorax nycticorax</i>		1												
10	Striated Heron	<i>Butorides striata</i>			1										5	
10	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>			20					3					2	
10	Rufous-bellied Heron	<i>Ardeola rufiventris</i>	2													
10	Western Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	30	10	200	50				2					150	300
11	Great Egret	<i>Ardea alba</i>			5					3						
11	Intermediate Egret	<i>Ardea intermedia</i>	1	10	5											1
11	Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	2		5					10					1	
12	Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	1		8					40						
12	Black-headed Heron	<i>Ardea melanocephala</i>	20	20	3	1		3	25	1		2			30	2
12	Goliath Heron	<i>Ardea goliath</i>			5		10		1							
12	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	20		5	1				3						
13	Yellow-billed Stork	<i>Mycteria ibis</i>		1	1				40	50						5
13	White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>		2												
13	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>	10						1	30	13	1			5	2
14	African Openbill	<i>Anastomus lamelligerus</i>	6	1												
14	Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>	40	300	50	70	1		2	2						
14	Woolly-necked Stork	<i>Ciconia episcopus</i>		6	2										3	3
15	Saddle-billed Stork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	4	2	3					1						
15	Marabou Stork	<i>Leptoptilos crumenifer</i>	400		10	25	20		15	25	2	3			15	50
15	Shoebill	<i>Balaeniceps rex</i>	1		1											
16	African Sacred Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	15	20	60				1	10	1				12	40
16	Hadada Ibis	<i>Bostrychia hagedash</i>	30		25	2	2	5	6	20	2		2	3	10	10
17	African Spoonbill	<i>Platalea alba</i>								15					1	
18	Spur-winged Goose	<i>Plectropterus gambensis</i>	1		20											
18	Knob-billed Duck	<i>Sarkidiornis melanotos</i>			10											
18	Egyptian Goose	<i>Alopochen aegyptiaca</i>			30	4				200	3					
19	White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>			70											15
20	Hottentot Teal	<i>Anas hottentota</i>														3
21	Yellow-billed Duck	<i>Anas undulata</i>	20													10
24	Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>		2					2	1	2					1
24	Yellow-billed Kite	<i>Milvus aegyptius</i>	10	30	30	250	20	1	20	30	10				5	20



Ugandan lintumatka 2018

Ugandan lintumatka 2018



Ugandan Iintumatka 2018

Entebbe – Mabamba Swamp – Kafu
Kafu – Budongo, Royal Mile – Murchison NP
Murchison National Park
Murchison NP – Butiaba– Hoima
Hoima – Kibale National Park
Kibale National Park
Kibale NP – Queen Elizabeth National Park
Queen Elizabeth National Park
Queen Elizabeth NP– Bwindi
Bwindi NP, Buhoma
Bwindi – The Neck – Ruhija
Ruhija, Mubwindi Swamp
Ruhija – Lake Mburo
Lake Mburo – Mpanga forest – Entebbe

49	Heuglin's Francolin	<i>Pternistis icterorhynchus</i>			1											
50	Crested Francolin	<i>Dendroperdix sephaena</i>								10					Ä	
50	Red-necked Spurfowl	<i>Pternistis afer</i>								6	6				2	3
52	White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>				ä2		1,Ä3	Ä							
52	Red-chested Flufftail	<i>Sarothrura rufa</i>										1k1				
53	African Crane	<i>Crex egregia</i>									1					
54	Black Crane	<i>Amaurornis flavirostra</i>	6		10					5	1			1		
54	African Swampphen	<i>Porphyrio madagascariensis</i>			1											1
55	Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	1													2
55	Lesser Jacana	<i>Microparra capensis</i>	1													
55	African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>	25		20					4	2				1	1
56	Grey Crowned Crane	<i>Balearica regulorum</i>	2		65		2 ä					2	4		10	10
58	Black-bellied Bustard	<i>Lissotis melanogaster</i>			2					1k						1k
59	Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>			4					15						
59	Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>								4						
60	Senegal Thick-knee	<i>Burhinus senegalensis</i>			2											
60	Water Thick-knee	<i>Burhinus vermiculatus</i>								20	3				8	
62	Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>		2												
63	Long-toed Lapwing	<i>Vanellus crassirostris</i>	15		10											
63	Spur-winged Lapwing	<i>Vanellus spinosus</i>	1		30					40						
63	African Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>			1					3					6	2
64	Senegal Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>									30					
65	Three-banded Plover	<i>Charadrius tricollaris</i>								3						
66	Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	6		25					10						
67	Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>			1					15						
68	Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>													3	
68	Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	10		15					10	2					
68	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>			4					15					3	
69	Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>			3					1						
69	Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>								10						
69	Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>			1					20						
70	Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	2		6					15						
71	Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>								2						
71	Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>								10						
73	Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	1		1											
75	Grey-headed Gull	<i>Larus cirrocephalus</i>			1					6						
76	Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>			1					260						
78	Gull-billed Tern	<i>Gelochelidon nilotica</i>			1					10						
81	Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>			10				10							
81	White-winged Tern	<i>Chlidonias leucopterus</i>			10				100	100						
83	Bruce's Green Pigeon	<i>Treron waalia</i>		2												
83	African Green Pigeon	<i>Treron calvus</i>	10						22		1			3		1



Ugandan lintumatka 2018

Ugandan lintumatka 2018



Ugandan lintumatka 2018

Ugandan lintumatka 2018



Ugandan lintumatka 2018

Ugandan lintumatka 2018



Ugandan lintumatka 2018

Entebbe –
Mabamba
Swamp –
Kafu

Kafu –
Budongo,
Royal Mile
Murchison
NP

Murchison
National
Park

Murchiso
NP –
Butiaba–
Hoima

Hoima –
Kibale
National
Park

Kibale
National
Park

Kibale NP –
Queen
Elizabeth
National

Queen Elizabeth National Park

Queen Elizabeth NP- Bwino

Bwindi NP
Buhoma

Bwindi –
Neck –
Ruhia

e Ruhija,
Mubwindi
Swamp

Ruhija –
Lake Mb

Lake Mburo
– Mpanga
forest –
Entebbe

147	Wire-tailed Swallow	<i>Hirundo smithii</i>				2											
148	White-headed Saw-wing	<i>Psolidoprocne albiceps</i>						2	8	1							
148	Black Saw-wing	<i>Psolidoprocne pristoptera</i>						4		1		10	25	5	2		
149	Western Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>		1	10	1			10	50	40				10	1	
149	Cape Wagtail	<i>Motacilla capensis</i>									1			1			
149	Mountain Wagtail	<i>Motacilla clara</i>											1				
149	African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>		5		2	1	3	1	4	15	10	3	5		10	6
151	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>		5			1				15	50				2	2
152	Grassland Pipit	<i>Anthus cinnamomeus</i>														1	
155	Grey Cuckooshrike	<i>Coracina caesia</i>											2	4			
155	Black Cuckooshrike	<i>Campephaga flava</i>				1k	1k										
155	Red-shouldered Cuckooshrike	<i>Campephaga phoenicea</i>															1n
155	Petit's Cuckooshrike	<i>Campephaga petiti</i>									2k1n	1k		1k			
155	Western Nicator	<i>Nicator chloris</i>			2				1	1							
156	Dark-capped Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>		50	30	30	60	50	50	150	70	30	10	25	20	15	50
156	Mountain Greenbul	<i>Andropadus nigriceps kikuyensis</i>											5	5			
156	Slender-billed Greenbul	<i>Andropadus gracilirostris</i>						2					1				
156	Little Greenbul	<i>Andropadus virens</i>	ã1		3			2	5	3		5	5	1			Ä
156	Yellow-whiskered Greenbul	<i>Andropadus latirostris</i>			1							1,ã1	2	5			
157	Shelley's Greenbul	<i>Andropadus masukuensis</i>											1				
157	Yellow-streaked Greenbul	<i>Phyllastrephus flavostriatus</i>											2	1			
159	Little Grey Greenbul	<i>Andropadus gracilis</i>											1				
159	Cameroon Sombre Greenbul	<i>Eurillas curvirostris</i>			3				1	3		5					
159	Toro Olive Greenbul	<i>Phyllastrephus hypochloris</i>										Ä					Ä
161	Joyful Greenbul	<i>Chlorocichla laetissima</i>						5									
161	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactylus</i>							ã1				1,Ä1				
161	Red-tailed Greenbul	<i>Criniger calurus</i>											1				Ä
162	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>										2					
162	Spotted Greenbul	<i>Ixonotus guttatus</i>			10												
162	Yellow-throated Leaflove	<i>Chlorocichla flavicollis</i>					5	2	ã1				1	2			
162	White-throated Greenbul	<i>Phyllastrephus albigularis</i>			2												
163	White-starred Robin	<i>Pogonocichla stellata</i>													1		
163	Forest Robin	<i>Stiphrornis erythrothorax</i>			1,ã4												
165	Fire-crested Alethe	<i>Alethe diademata</i>			2												
165	Red-throated Alethe	<i>Pseudaethe poliophrys</i>											1		1		
165	Brown-chested Alethe	<i>Pseudaethe poliocephala</i>							1								
166	Blue-shouldered Robin-Chat	<i>Cossypha cyanocampter</i>											1				
166	White-browed Robin-Chat	<i>Cossypha heuglini</i>			1					1				Ä1			
166	Snowy-crowned Robin-Chat	<i>Cossypha niveicapilla</i>						2			2	1					
167	White-bellied Robin-Chat	<i>Cossyphicula roberti</i>											1Ä				
167	Archer's Ground Robin	<i>Cossypha archeri</i>												Ä3	1Ä,Ä3		
167	Grey-winged Robin-Chat	<i>Cossypha polioptera</i>										1	1				

KON-TIKI



Ugandan Iintumatka 2018

Entebbe – Mabamba Swamp – Kafu Kafu – Budongo, Royal Mile – Murchison NP Murchison National Park Murchison NP – Butiaba– Hoima Hoima – Kibale National Park Kibale National Park Kibale NP – Queen Elizabeth National Park Queen Elizabeth National Park Queen Elizabeth NP– Bwindi Bwindi NP, Buhoma Bwindi – The Neck – Ruhija Ruhija, Mubwindi Swamp Ruhija – Lake Mburo Lake Mburo – Mpanga forest – Entebbe

168	African Thrush	<i>Turdus pelios</i>	5		1	2	5	10	3	3	2				1	1
168	Abyssinian (Olive) Thrush	<i>Turdus abyssinicus</i>													2	
170	Red-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus rufus</i>	Ä1													
170	White-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus poensis</i>						1				1			Ä	
170	Fraser's Rufous Thrush	<i>Stizorhina fraseri</i>						Ä3	Ä2			Ä1			2Ä	
172	Mocking Cliff Chat	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>			1k1n											
172	Sooty Chat	<i>Myrmecocichla nigra</i>	2				3		5		6					2
172	Ruaha Chat	<i>Myrmecocichla collaris</i>													2k1n	
173	Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	2	2	4	1			1		1				1	
173	African Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>					1								1	
174	Northern Wheatear	<i>Oenanthe oenanthe</i>			20	5	1									
174	Isabelline Wheatear	<i>Oenanthe isabellina</i>			1											
176	Brown-backed Scrub Robin	<i>Cercotrichas hartlaubi</i>	1	2		2		1	1	3	1					
177	Spotted Morning Thrush	<i>Cichladusa guttata</i>	Ä1		6	10										
178	Lesser Swamp Warbler	<i>Acrocephalus gracilirostris</i>								3						
179	Eurasian Reed Warbler	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1,Ä1		1	Ä1				10						
180	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>													Ä3	
180	White-winged Swamp Warbler	<i>Bradypterus carpalis</i>						Ä1		Ä2						
181	Grauer's Swamp Warbler	<i>Bradypterus graueri</i>													2Ä	
181	Cinnamon Bracken Warbler	<i>Bradypterus cinnamomeus</i>													2Ä	
181	Evergreen Forest Warbler	<i>Bradypterus lopezi</i>													2Ä	
182	Eastern Olivaceous Warbler	<i>Iduna pallida</i>				3			1							
183	Buff-bellied Warbler	<i>Phyllolais pulchella</i>				6										
183	Eurasian Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>											1k1n			
184	Willow Warbler	<i>Phylloscopus trochilus</i>	1			3	2	1	1Ä		2					2
184	Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		4			6	1,Ä1								
185	Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>		2		Ä1	Ä1	Ä		Ä1	Ä2					Ä2
185	Red-faced Woodland Warbler	<i>Phylloscopus laetus</i>										2	5	2		
185	Uganda Woodland Warbler	<i>Phylloscopus budongoensis</i>		3												
186	Grey Longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>	Ä2													
186	Northern Crombec	<i>Sylvietta brachyura</i>			1											
186	Red-faced Crombec	<i>Sylvietta whytii</i>														1
186	Green Crombec	<i>Sylvietta virens</i>					1,Ä3	1,Ä3		2						
186	Lemon-bellied Crombec	<i>Sylvietta denti</i>		1												
186	White-browed Crombec	<i>Sylvietta leucophrys</i>											2	1		
188	Rufous-crowned Eremomela	<i>Eremomela badiceps</i>		1												
189	Black-faced Rufous Warbler	<i>Bathmocercus rufus</i>										1k1n,Ä4				
190	Moustached Grass Warbler	<i>Melocichla mentalis</i>	Ä1	2		1			6		5					
190	Fan-tailed Grassbird	<i>Schoenicola brevirostris</i>									2					
190	Grauer's Warbler	<i>Graueria vittata</i>											Ä1	Ä1		
191	Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>								Ä3	5					
192	Croaking Cisticola	<i>Cisticola natalensis</i>	1						3		1					



Ugandan lintumatka 2018

Ugandan lintumatka 2018

KON-TIKI



Ugandan Iintumatka 2018

Entebbe –
Mabamba
Swamp –
KafuKafu –
Budongo,
Royal Mile –
Murchison
NPMurchison
National
ParkMurchison
NP –
Butiaba–
HoimaHoima –
Kibale
National
ParkKibale
National
ParkKibale NP –
Queen
Elizabeth
National
ParkQueen
Elizabeth
National
ParkQueen
Elizabeth
NP– BwindiBwindi NP,
BuhomaBwindi – The
Neck –
RuhijaRuhija,
Mubwindi
SwampRuhija –
Lake MburoLake Mburo
– Mpanga
forest –
Entebbe

209	Brown-throated Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>				2	Ä1	1,Ä1			1k1n	4			
209	Jameson's Wattle-eye	<i>Platysteira jamesoni</i>		Ä1											
210	African Shrike-flycatcher	<i>Megabyas flammulatus</i>						1n	1						
210	Black-and-white Shrike-flycatcher	<i>Bias musicus</i>				1k1n	1k			1k1n	1k1n				
210	Rwenzori Batis	<i>Batis diops</i>											1		
212	Red-bellied Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>		5		1		1							
212	African Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>	3							3	3				
212	Silverbird	<i>Empidonis semipartitus</i>			4	1									
213	African Blue Flycatcher	<i>Elminia longicauda</i>					1	1,Ä1							
213	White-tailed Blue Flycatcher	<i>Elminia albicauda</i>				2		1		2		2	2		
214	Chestnut-capped Flycatcher	<i>Erythrocercus mcallii</i>		15											
215	Scaly-breasted Illadopsis	<i>Illadopsis albipectus</i>						Ä2							
215	Brown Illadopsis	<i>Illadopsis fulvescens</i>						Ä2							
215	Mountain Illadopsis	<i>Illadopsis pyrrhoptera</i>											2		
215	African Hill Babbler	<i>Pseudoalcippe abyssinica</i>										Ä	3Ä		
216	Black-lored Babbler	<i>Turdoides sharpei</i>			2				5					1	
216	Brown Babbler	<i>Turdoides plebejus</i>					1								
216	Arrow-marked Babbler	<i>Turdoides jardineii</i>				1			6						
218	White-shouldered Tit	<i>Melaniparus guineensis</i>		1											
218	White-winged Tit	<i>Melaniparus leucomelas</i>							ä1	ä1					2
218	Dusky Tit	<i>Melaniparus funereus</i>								2	20	20			
219	Stripe-breasted Tit	<i>Melaniparus fasciiventer</i>										4	2		
220	African Yellow White-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>	10			10	4	20	5	10	10	15	10		
221	Bronzy Sunbird	<i>Nectarinia kilimensis</i>					1			1k	1k1n			1n	1k
222	Green-headed Sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>						1n		1k1n	3	1k			
222	Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>				1k									
223	Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>					5	4							
223	Northern Double-collared Sunbird	<i>Cinnyris reichenowi</i>								10	5	5	5		
224	Regal Sunbird	<i>Cinnyris regius</i>										5	1k		
225	Green Sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>							1k1n		3				
225	Green-throated Sunbird	<i>Chalcomitra rubescens</i>	2			1n									
226	Grey-headed Sunbird	<i>Deleornis axillaris</i>									1				
226	Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>		1											
226	Olive Sunbird	<i>Cyanomitra olivacea</i>									1				1
226	Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>							1n						
227	Marico Sunbird	<i>Cinnyris mariquensis</i>	3			2									1k
228	Scarlet-chested Sunbird	<i>Chalcomitra senegalensis</i>	2		1k	2	1				1k				
228	Beautiful Sunbird	<i>Cinnyris pulchellus</i>			2	3									
228	Red-chested Sunbird	<i>Cinnyris erythrocercus</i>	3						1k					2	
229	Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>		1k1n			2				6	3			
229	Pygmy Sunbird	<i>Hedydipna platura</i>	1k Ä												
229	Variable Sunbird	<i>Cinnyris venustus</i>										1k1n			



Ugandan Iintumatka 2018

Entebbe – Kafu – Murchison Murchison Hoima – Kibale Kibale NP – Queen Queen Bwindi NP, Bwindi – The Ruhija, Ruhija – Lake Mburo Lake Mburo – Mpanga forest – Entebbe

Mabamba – Budongo, National NP – Butiaba– Hoima National Park National Park Queen Elizabeth NP– Bwindi Queen Elizabeth NP– Bwindi Buhoma Neck – Ruhija Mubwindi Swamp

230	Western Violet-backed Sunbird	<i>Anthreptes longuemarei</i>				1k												30
231	Northern Fiscal	<i>Lanius humeralis</i>					3		3			2	1					5
232	Mackinnon's Fiscal	<i>Lanius mackinnoni</i>						1k					1					
232	Grey-backed Fiscal	<i>Lanius excubitoroides</i>	2		3	3			1	15	3	2					10	
232	Woodchat Shrike	<i>Lanius senator</i>			2													
233	Yellow-billed Shrike	<i>Corvinella corvina</i>																
233	Red-backed Shrike	<i>Lanius collurio</i>			2													
233	Red-tailed Shrike	<i>Lanius phoenicuroides</i>			1													
234	Lühder's Bushshrike	<i>Laniarius luehderi</i>					2				2	2	1k					
234	Tropical Boubou	<i>Laniarius aethiopicus</i>							1	3								Ä
234	Papyrus Gonolek	<i>Laniarius mufumbiri</i>	Ä1						1	3								
234	Black-headed Gonolek	<i>Laniarius erythrogaster</i>	7		10	30					6						Ä	
235	Mountain Black Boubou	<i>Laniarius poensis</i>											1	1				
235	Brubru	<i>Nilaus afer</i>				1				Ä1								
236	Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>	3		3	1							1	3				
236	Pink-footed Puffback	<i>Dryoscopus angolensis</i>									1k2n	4	2					
237	Marsh Tchagra	<i>Bocagia minuta</i>		1														
237	Brown-crowned Tchagra	<i>Tchagra australis</i>				Ä1	2											
237	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>	1			6												
238	Grey-headed Bushshrike	<i>Malaconotus blanchoti</i>	2															
238	Lagden's Bushshrike	<i>Malaconotus lagdeni</i>													Ä			
238	Sulphur-breasted Bushshrike	<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>	ä1		1	5			1,Ä1	Ä4	1Ä						Ä2	
239	Many-colored Bushshrike	<i>Chlorophoneus multicolor</i>											1Ä					
239	Bocage's Bushshrike	<i>Chlorophoneus bocagei</i>					2 ä1				5	5						
239	Doherty's Bushshrike	<i>Telophorus dohertyi</i>											Ä	1Ä				
241	Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>	3						5	10	10						1	10
241	Velvet-mantled Drongo	<i>Dicrurus modestus</i>							2									
241	Piapiac	<i>Ptilostomus afer</i>	30		250	40												
242	Pied Crow	<i>Corvus albus</i>	20	5		10	5	3	10	5	3		25	5	200			8
242	White-necked Raven	<i>Corvus albicollis</i>											2					
243	Western Black-headed Oriole	<i>Oriolus brachyrynchus</i>		1,Ä1				1	1									
243	Montane Oriole	<i>Oriolus percivali</i>										1,Ä1		1,Ä1				
243	African Black-headed Oriole	<i>Oriolus larvatus</i>																3
244	Eurasian Golden Oriole	<i>Oriolus oriolus</i>				1k											1n	
244	African Golden Oriole	<i>Oriolus auratus</i>															1k	
244	Yellow-billed Oxpecker	<i>Buphagus africanus</i>			40					25	6							
245	Stuhlmann's Starling	<i>Poeoptera stuhlmanni</i>										3						
246	Waller's Starling	<i>Onychognathus walleri</i>												2				
247	Greater Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chalybaeus</i>	3														1	
247	Lesser Blue-eared Starling	<i>Lamprotornis chloropterus</i>	30			1												
248	Purple-headed Starling	<i>Hylopsar purpureiceps</i>					4	2										
248	Splendid Starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>	10	1		10	15	10				1						



Ugandan lintumatka 2018

Ugandan lintumatka 2018

KON-TIKI



Ugandan lintumatka 2018

Entebbe – Kafu – Murchison Murchison Hoima – Kibale Kibale NP – Queen Queen Bwindi NP, Bwindi – The Ruhija, Ruhija – Lake Mburo
Mabamba Budongo, National NP – Kibale National National Elizabeth Elizabeth Buhoma Neck – Mubwindi Lake Mburo – Mpanga
Swamp – Royal Mile – Park Butiaba– National Park Elizabeth National NP– Bwindi Ruhija Swamp forest –
Kafu Murchison NP Hoima Park National Park Park Park Park

275	Black-bellied Firefinch	<i>Lagonosticta rara</i>		20												
275	Red-billed Firefinch	<i>Lagonosticta senegala</i>	3		1	1				20						
275	African Firefinch	<i>Lagonosticta rubricata</i>				5			1							
276	Yellow-bellied Waxbill	<i>Coccoxygia quartinia</i>				1										
276	Fawn-breasted Waxbill	<i>Estrilda paludicola</i>		30		5	2	5		30						
276	Common Waxbill	<i>Estrilda astrild</i>						5								
277	Black-crowned Waxbill	<i>Estrilda nonnula</i>				15										
277	Kandt's Waxbill	<i>Estrilda kandti (atricapilla)</i>									10			3		
277	Black-faced Waxbill	<i>Estrilda erythronotos</i>			20											
278	Quailfinch	<i>Ortygospiza atricollis</i>			2											
279	Bronze Mannikin	<i>Lonchura cucullata</i>	50		10	30	60			10				10	15	
279	Black-and-white Mannikin	<i>Lonchura bicolor</i>				10										
280	Village Indigobird	<i>Vidua chalybeata</i>	2			1	1k									
280	Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>	3		2n		7			70						
282	Yellow-fronted Canary	<i>Serinus mozambica</i>	3			2	10		5					1		
282	Brimstone Canary	<i>Serinus sulphurata</i>		2										1		
282	Thick-billed Seedeater	<i>Serinus burtoni</i>							1			1				
283	Western Citril	<i>Serinus frontalis</i>			1				2							
284	Streaky Seedeater	<i>Serinus striolata</i>									8					
285	Cinnamon-breasted Bunting	<i>Emberiza tahapisi</i>			4				1							
286	Golden-breasted Bunting	<i>Emberiza flaviventris</i>								1	1	2				
		päivän lajisumma	136	113	126	129	103	92	111	149	131	88	87	65	109	119